




C. Bartholini
ANATOMICA

11.26





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
688/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
688/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
688/A

688/A

[Wittenberg]


1611


(not 1640)


Bechtold Rab
active c 1605-15


Andreas
Rüdinger
active c 1611-12

IV. 6. 22 B









4.2600
CASP. BARTHOLINI
Philosophi & Medici
ANATOMICÆ
INSTITUTIONES
CORPORIS HUMANI

utriusq; sexus
HISTORIAM &
DECLARATIONEM
Exhibentes cum plurimis novis
OBSERVATIONIBUS &
OPINIONIBUS
Nec non illustriorum quæ in
ANTHROPOLOGIA
occurrunt, controversiarum decisionibus,
Cum Indice, Capitulis & rerum locupletissimo.


NOSCE
TEIPSUM.



MEMENTO
MORI.



ANNO ∞ 1661.
Apud Bechtoldum Raaben Bibliopolam.



Continentur in hoc opere

PROOEMIUM de Anatomia in genere,
De corporis Divisionibus varijs, & De
Partibus similaribus atque dissimilaribus
in genere.

LIBER I.

De infimo ventre; seu ABDOMINE.

LIBER II.

De Media Cavitate; seu THORACE.

LIBER III.

De suprema Cavitate; seu CAPITE.

LIBER IV.

De Artubus, seu MANIBUS & PEDIBUS.

LIBELLVS I.

De VENIS.

LIBELLVS II.

De ARTERIIS.

LIBELLVS III.

De NERVIS.

LIBELLVS IV.

De OSSIBUS, CARTILAGINIBUS & LI-
GAMENTIS.





*Genere, Ingenio,
Litteris & Virtute*

ILLUSTRI & verè nobili viro,
OLIGERO ROSÆCRANZIO,
Domino de Rosenholm,
Scabije, &c.

Domino & fautori magno

S. P.

CASP. BARTHOLINUS.

PEccare mihi viderer,
Generosissime OLIGER,
si non tandem alto rupto
silentio, ego qui virtuti tuæ
plurimum tribuo, mentis
nuncio calamo te com-
pellarem: sidus illud Cimbriæ; raræque
& eruditæ nobilitatis exemplum. Ete-
nim, ob dotes eximias, quas rerum pa-
rens Natura alijs invidisse, in te omnes
quasi prodiga videtur effudisse; in tui as-
morem atque admirationem ivi à puero:
neque adultiori mutavit animus; sed au-
xit: scitior his in oris factus humanitatis,
pietatis, & doctrinæ rarissimæ; quibus o-
mnibus alijs Musarum atque Gratiarum

.) (2 slu-

Prefatio.

alumnis præluxisti. Non est quod auri-
bus tuis dem aliquid, aut gratiæ. Sine
verborum fūco atque ambitu, quia hæc
in ore sunt & auribus omnium, ipso pe-
ctore loquor. Sermo est cum Theolo-
gis! Suum te illi prædicant, & publica
specimina in hac palæstrâ non tyronis,
non vulgariter docti, sed Doctoris à te
edita proferunt. Cum Jurisperitis si de
te sermo incidit, suum te proclamant:
ijsdemque cum sacri studij Magistris
utuntur argumentis. Philosophi te
totum sibi proprium vendicant: & hu-
jus etiam possessionis publica exstant
testamina quamplurima. Ego, qui A-
pollineæ militiæ sacramentum dixi, ei-
jurejurando me obligavi, in Apollinis
choro locum tibi datum cum aliis con-
tendo. Nam, uti varij Musarum filij, qui
à te doctiores redierunt, suggessere; non
modò Medicam (sicut reliquarum fas-
cultatum) Bibliothecam instructissimam
in usum studij tui comparatam
possides: sed & cum Dioscoride herba-
rius plantas colligis, intelligis, & cum
Melampo pharmaca tuis pro necessita-
te

Prefatio.

te propinare, morbisque salutaria reme-
dia opponere gnarus es. Videtur itaq;
natura, dum alijs novercatur satis, tibi
benigna mater contulisse omnia, quæ in
humanum ingenium cadere possunt.
Sed certè industriâ, sed vigilijs, sed labo-
ribus (quibus omnia vendere mortali-
bus Dijs solent) ea quæ sivist, acquisivist;
non satis esse ratus avis omni tam belli
quàm pacis eximiâ dignitate gloriosè
perfunctis editum esse, Patre vero regno-
rum Daniæ, Norvvegiæ, &c. Septemtri-
onalium olim quadrumviro & Prore-
ge: quin potius à nativitate & in cunis
rectè statuens habitum nullum & virtus
tem comparari, verum crebris exercitijs
& indefesso ingenij molimine, curâ atq;
studio, ut vera nobilitas nulla nostra sit,
nisi propriis partas; reliqua non nobis,
sed avis vel atavis accepta ferenda. Sed
filium in laudes tuas non solvo ampli-
us: tum quia ego impar, tum ne adulari
me Momus perhibeat. Eapropter, in-
quam, quasi astro quopiam inclinante,
in tui amorem ivi à puero, qui adeò ma-
gnis auctibus modò augetur, ut intus se

):(3 conti-

Prefatio.

continere ulterius nequies foras prorumpat, & hanc Epistolam manibus extorqueat. Eam vero ad te mittere religio est absque comite aliquo munere; eoque, uti pro viribus patitur penu meum, chartaceo: quale præ aureo tibi arridere fas scio. Atq; hoc quidem in gratitudinis *τεμπνέειον*, ob singularem illam tibi ingenitam humanitatem; quâ litteratos omnes non invitus beas, & me quoq; de facie ignotum (de fama enim ignotus tibi esse non possum) adamasti, sponteque inclientelam suscepisti. An tantum valui, ut à te amari meruerim? Ex solo potius genij tui benigni ductu atque instinctu factum interpretor. Quâ benignitate jam fretus, scripta hæc mea nomine tuo, Vir inter optimos Nobilissime, inter nobilissimos optime, inter utrosque doctissime, nobilitare sustinui. Et jam plenissimo gradu ad te eunt; à cuius splendore, splendorem illa possint mutuari, ut astrum aliquod nebulosum à fulgido illo Sole. Ea si in manus tuas vultu sereno & annuente, me verò in animum penitus admiseris, defunctum mere ex sententiâ abs me gestâ arbitrabor; feliciorẽq; me judicabo.

Quam si me liquidus fortunæ rivus inaurerẽ.
Diu vive & vale; mihiq; favere perge.



Ad benivolum Lectorem meum.

PRÆLOQUIUM.



*Non animatus eram, mi
LECTOR, in lucem hasce Institu-
tiones efferre, privatis audito-
rum meorum usibus dicatas.
Nam egrè fortassis hi ferent, ma-
gno labore & industriâ à se exceptas atq; in
chartam conjectas Lectiones, modo publico cu-
jusvis bono divulgari, novasq; varias observa-
tiones & opiniones offerri omnibus, quæ ipsis
pridem loco novi beneficij. Sed vicerunt hos alij:
immo hi seipsos. Etenim in viris eruditis, Phi-
losophia Medicinæq; proceribus, urgent plurimi
per litteras, suadent per amicorum voces vicari-
as, adeoq; persuadent editionem. Fraudare me
putant juventutem, si publico hanc operam in-
video. Quibus respondere possent edita ab ijs, qui
in famâ multâ sunt, Anatomicis Institutiones.
Verum, ut hi post alios scripsere: ita etiam nunc in
secula ire aliorum lucubrationes oportere rege-
runt, ob utilitatem publicam rei litterariæ, quæ
ex plurium sententijs & observationibus au-
gmentum capit. Res enim ætas, usus, semper ali-
quid apportant novi. Vicerunt ergo horum mo-*

):(4

nil 1,

Prefatio.

rita, vicit bonum publicum, vicerunt ipsi haue-
pauci, qui calamo ex dictantis ore excepere. Vti
enim fieri adsolet in dictationib. harum regio-
num Academijs usitatis: non pauca irrepunt his
vel illis inter scribendum sphalmata: alij non
assequuntur omnia: neq. omnibus, ob meam, quæ
interrupit menses aliquot ægritudinem chroni-
cam, continuatio lectionum obtigit; quo tempore
ita suadentibus hujus vel illius occasionib., non-
nulli Academia valedixerunt. Et hi præcipuè ro-
gant, instant, urgent ob usum compendiarium
publicationem. Nec minus calcographus nolent-
is volentis manibus prece pretioq. extorquet.
Vincor. Cateros tamen pœnitere non potest, quib.
continuuatio obtigit nauata opera. Nam quæ
hîc verbotenus proponuntur illi in animalibus, a-
nimalium partibus, picturis impressis, & manu
scitè eductis edocti sunt. Qui hîc summam ad-
feruntur controversiarum cumuli, illis uberius
ex legentis discursibus incidenter factis enucle-
ati sunt. Vincor itaq. inquam, & præsertim pu-
blicâ ab utilitate, cui velificari decretissimum
semper fuit. Tu, mi Lector, si quæ non arrideant,
quia contra communes autorum sententias pro-
feruntur; cogitabis & illis autoribus non vitio-
versum antecessores reliquisse. Vbi enim oculi &
manus

Prefatio.

manus fidem faciunt, Autorū posthabentur decreta. Interim censura doctiorum, praesertim Anatomici pulveris Magistrorum, & inter alios dictaturam gerentium, libens me meumq; hunc foetum subijcio. Inprimis vestra, qui laudem in hac harena quaesivistis, FELIX PLATERE, & CASP. BAVHINE, Professores Basileenses celeberrimi: quippe quorum & scripta quae exant Anatomica elaboratissima me informaverunt; & diserta lingua, à quibus olim Basilea non insigni absq; fructu pependi; & tua manu-ductio, Nobiliss. & Clariss. Casp. Buhine: qui quēadmodum linguā, calamo, cultro olim me hac in arte erudire, & insuper ut filium semper amare voluisti; ita etiam nunc à te dissitum non animo (hac enim optimā nostri parte sumus longē conjunctissimi) sed corpore, eodem animo instruere per litteras hanc graveris. Vos enim binos scio, spreteis autorum etiam ipsius Galeni, ubi oculi aliter fidem faciunt, autoritatibus, rupe veritatis innixos fundamenta ex natura petere; quod ex scriptis vestris vel cecutienti dispalescit. A Teutonum bigā Anatomica, ad Italicam jam pridem ad immortalitatem hujus artis alis e vectam me converto: Magnos videlicet illos humani corporis dissectores & scrutatores; HI-
) (S ERO-

Praefatio.

ERONT MVM FABRICIVM AB A QVAPEN-
DENTE Patavini Gymnasij Anatomicum or-
dinarium & percelebrem; ac IVLIVM CASSERI-
VM PLACENTINVM, ibidē chirurgiae Professores
rem publicū, atq; Anatomicū laboriosissimū V. vos
immatura haec ad iudicij vestri Anatomici Solem
optimē percoquere potestis. Ad te, inquā, me con-
verto, FABRICI, venerande senex, Patavine
Æsculapi, quē ego chirurgorum Deum & Regem
vocare soleo, Anatomiae vero instauratorē non po-
stremum: ita vestigijs antecessorū tuorum V. Galij
& Fallopii insisteris, ut tempore saltē, neutiquā e-
ruditione experiētiāq; te h; posteriorē probes.
Quod si sorte à praxi tuā omissior in hoc opusculū
incideris, laudēq; oculorum ei operā dederis; de-
prehendes discursūs tuos publicos, quos Patavij
numquā absq; delectatione, addē & fructu, auri-
bus usurpavi, ad hominem Danum non inanes
redijse. Vbi ab aliorum dist. ss. opinionibus (sicuti
à veritate quā autoribus pendere mavis) ibi
tuam quoq; prout ex ore tuo & cōversatione per-
cipere licuit, sententiā, lubens addo citog; neq; ta-
men, quod alij facit, are non sunt veriti, tamquā
meam mihi vendico. Quae verò mea sunt, meoq;
labore inventa, lubens tuo iudicio dexterrimo
submitto. Et tuo quoque carissime & clarissime
CAS.

Prefatio.

CASSERI, quo adeò familiariter usus sum cotidie, ut fratrum loco nos invicem haberemus. Facies ergo hoc, quod posco, pro amicitia nostra, quæ inviolata semper manebit, facies pro bono publico; cuius etiã gratia, quæ in Anatomicis præstitisti, quantum quidem ex te cognoveram, huic operi inferere volui. Institutum enim fuit præcipua cõgerere, quæ vel ex aliorum scriptis vel ore, vel proprio labore & inventione comparare potis fui. Et, Deum Fidemq; testor, ob publicum bonũ. Cui utinam omnes plusquàm propria ostentationi, vanaq; gloriola velificarentur! Caterum neq; vestre sententiæ acrimoniam in postremis habitam volo, Anatomici reliqui in Italia præclarissimi: IVLI LASOLINE, Neapoli; FLAMINI ROTA, Bononia; & IOHANNES FABER, Roma. Facturos enim vos quoq; quod superiores rogatos volui, certò mihi polliceor, ob insignem illam, & numquam nõ mihi deprecandam benivolentiã, humanitati isq; omnia officia, quib; vobiscum cum essem, prolixè me cumulastis: tu cum primis, LASOLINE celeberrimè unacum Mario Schipano, Philosopho & Medico insigni; qui in Academiã Neapolitanã vobiscum Bartholinum liberaliter detinere, ut sectiones humanorum Corporum instituerem, voluistis

Praefatio.

Voluistis, Sed aliud tum animus suadebat, aliud
iter, quod in Siciliam ingrediendum fuerat; ali-
ud etiā scena, cui servio in hoc theatro, meaq; con-
ditiones, quas quidem omnes praesens vobis ego
aperire non sustinui. Attamen non sine aculeo dis-
cessi à vobis avulsus quasi anima à corpore. O vos
amoris & venerum ita plenos! De quo eximio a-
moris & favoris genere, uti tunc gratias egi has
buiq; insignes, ita modo easdē repeto, vestramq;
gratā mente benignitatē agnosco. Easdē ob caus-
sas, idem quod superiores, rogo peritissimos
Anatomicos: IOHANNEM IESSENI-
VM, Sereniss. Regis Vng. Medicum, & PE-
TRVM PAVV, Lugdunensium in
Batavia Anatomicum & Botanicum publi-
cum. Quos, quia clarum insigne benivolentia in
me ediderunt, ille quidem Praga, hic Lugduni
Batavorum dum degerem, hoc etiam officij ge-
nus mihi benignè collaturos nullus dubito Tan-
dem, ut adhuc in hac stili lineā haream, prestan-
tissimum Pinæum chirurgum Parisiensem pu-
blicum & praeclarum, & quoscunq; alios quacunq;
mundi Europaei melioris in plaga partim amicos
& notos, partim famā saltem cognitos, obsecro;
ut, si in plusculis peccatum est, fauendo sugge-
rant, moneantq;, aut censoriā animadversione no-
tando

Praefatio.

zando corrigant. Ego enim utroq; adfectu utar
unum in finē: corrigendi & discendi, adeoq; do-
cendi. Dabitur hoc, si quid est, si qui estis memores
vestrae meaq; conditionis, vestrae aequitati, meaq;
aetati; quae nondum omnia invenire permisit;
nec peregrinationes, quibus haecenus addictus
fui, ociose singula pensitare. Et nemo unquam ita
ingenio aut memoria potuit, ut omnia intelli-
geret, colligeret. Quae pra me fero; cum delicti
culpam modestè agnoscendo non minus honoris
adquiratur, quàm laudis famā gloriosè demer-
endo. Interim Sophoclaum istud pro me usurpo:

— — — εἰ δ' ἐγὼ νέεσθαι

Οὐ τὸν χρόνον χρεὶν, μάλλον ἢ τὰργα σκοπεῖν.

Quo cum convenit illud Menandri:

Μὴ τὸ βλέψῃς, εἰ νεώτερος λέγω,

Ἀλλ' εἰ Φεργουῶντος τὸς λόγους ἀνδρὸς ἔρω.

Zoilos & Momos improbos, quos defuturos nun-
quam dubitavi, contemno: y enim non nisi indo-
cti, rupices, petrones: & tamen ne nudi ab inge-
nio videantur, nullaq; scientiae fulturā subnixi,
quidvis arrodunt & adlatrant. Hic virtutis co-
mes est individuus, Invidia. Quamobrem nunc
ad te Lector, qui candidus, redeo; Methodumq;
quam sequutus, declaro. In parte quacumq; expli-
candā prodest quidē ejus structurā seu fabri-
cam ritè primum aperire; deinde verò actionē,
andē

Praefatio.

eandem usum. Quam quidem methodum primis capitulis non aliam ab ea causam usurpavi, nisi ut juniores & discipulos hunc ordinem edoceri, similiter ipsi totum opus pro placito disponderent. Quia vero hac Methodus cogit nos saepe multa verba repetere, & prolixitati incumbere; deinde vero non omnis pars actionem habet, neque semper accurate adeo distinguuntur Actio & Usus: malui in toto reliquo opere cum alijs Anatomicis brevitate causam, cujus apprimè studiosus esse cupio, facere. Maxima namque pars scientiarum brevitate capimur. Et praestat rectum quam longum currere. Itaque primo partis fabricam dilucidare lubido fuit, ejus situm, magnitudinem, numerum, figuram, superficiem, connexionem, foramina, meatus, cavitates, membranas, vasa, particulas, &c. recensendo: deinde v. usus omnes. Vbi opus fuit partis causas explicavi: efficientem, materiam, formam, & finem. Alicubi partes definiui nonnullas: ut eodem modo discipulos cujuscunque nullo negotio definitionem contexerent. Illa enim semper adhibere & repetere quae quisvis de facili praestiterit hominis est non tantum ocio & charitatis abundantis & abutentis sed etiam aliorum ingenij diffidentis, atque superstitiosè ad gloriolam etiam compertissima inculcantis, ut Chalcidius in principio

Praefatio.

principio Timej dicebat. Partiū verò omniū ex-
ctam satis plenāq; exhibeo explicationem, nō ta-
mē quasi omnia, sed quasi praecipua dixerim. Ob-
via pleraq; & minuta dici praestat, quā scribi:
immo ostendi quā dici. In cōtroversis gravio-
ribus, quid apud alios, ut Vesalium, Columbū, Lau-
rentium desideretur (quāquam & hīdem radio
ingenij spissā vetustatis caliginē e vincere conatī
sunt, ideoq; suā laude, si cum antiquis cōtendātur,
non spoliandi) summam sparsim adnotatum est.
Atq; ita id operis, quod diuturnis per varias
Europae orbis Academiās peregrinationibus, ma-
gnis sumtibus, studijs & vigilijs continuis, non
raro cū vita periculo & discrimine edoctus sum,
publico bono non inuidebo: nē fraudetur juven-
tus, si diutiūs supprimo, & occulto Euclionis novi
instar hanc lare secreto aulā. Quin calidē potius
in lucem efferam: quò cū alios per me proficere
videbo, rectē ego, qui natus mihi ipsi non sum,
profecisse intellegar. His ergo frūere, mi Lector:
& si accepta fore cognovero: largus ero in pluri-
bus hujus generis non minūs raris, modo relli-
quum via vitāq; Deus meus prospera verit, pu-
blicandis, si verē probaveris: catus cautusq;
in supprimendis, si justē damnave-
ris. Vale.

Viro clarissimo &
excellentissimo,

DN. CASPARO BARTHOLINO,
Philosophiæ & Medicinæ
DOCTORI,

Favitori & amico meo perpetim
honorando.

Laudatur, populos alio sub Sole calentes
Qui videt, & variâ cognitione redit.
Laudatur, Sophiæ qui scandit in abdita, rerum
Eruat ut Causas, quæ latuere prius.
Laudatur, medicæ qui concitus arte Machaon
Eximere è Stygiâ corpora nâve potest.
Laudatur, magnete suo, cui Gratia mores
Illinit, ut cunctos moribus alliciat.
Laus sua cuiq; datur: sed BARTHOLINE tibi omnis,
Namq; animo hæc insunt omnia clara tuo.

Janus Heermannus, P. L,



CASP.

CASP. BARTHOLINI D.

INSTITUTIO

INES ANATOMICAE, SEU
partium Corporis humani u-
triusq; sexus Historia & De-
claratio.

PROOEMIUM.

Anthropologia seu doctri-
na de homine vulgò & rectè
tamen in geminas dispescitur
partes: *Anatomiam*, quæ de
corpore ejusque partibus a-
git, & *ψυχολογίαν*, quæ de anima.

Anatomia
subjectum
Cur potissimum de humano corpore in Anatomia agatur
Anatomia itaq; ut ad hanc nos accinga-
mus, quatenus pars Physicæ est, subjectum
habet Corpus animalis cujuscunque, terre-
stris, aquatilis, volatilis &c. non tantum hu-
manum. Verum humani corporis structu-
ram potiss. rimari solemus. 1. Ob perfectio-
nem maximam, quæ regula est imperfecti-
onis. Quia animalia varia innumera fere
sunt, ut ijs secâdis & rimandis humana ætas
his sæculis non sufficiat. 3. Ob usum incre-
dibilem ad neminem non redundantem,
qui seipsum & proprium ædificium perno-

A

scere

scire cupit, tum ut sanitatem melius tueri
& ægrotudines profligare possit: neque quicquam
quam Physicus esse aut dici potest, nisi ha-
ante omnes doctrinæ Physicæ partes artem
ad unguem calleat.

*Divisio to-
tius corpo-
ris.*

Porro, quia ob varias actiones corpus hu-
manum non ex una & simili parte constat
verum pluribus: ideo sciendum, corpus to-
tum dividi, (tamquam quantitativum seu
integrale) in continentia, contenta & im-
petum facientia, hoc est, in partes solidas
humores & spiritus. Atque laxa hac ratio-
ne, partes dicentur omnes, quæ quantitate
habent, & totum complent atq; integran-
etiam ungues, pili, adeps, medulla. Strictius
verò & propriè pars dicitur, quæ formâ toti
tius participat & vita, estq; tantum solidum
Vnde non malè partem definit Fernelius

Pars quid.

corpus toti cohærens, communiq; vita cõ-
junctum, & ad functionem vel usum commo-
paratum. Galeno verò pars est corpus toti
quadantenus conjunctum, & aliqua ex parte
te propriam habens circumscriptionem.

*Partis pro-
pria acce-
ptio quæ.*

Nos summatim dicimus: partem pro-
priè esse,
1. Quæ vivit, nutritur, nec aliam nutrit. Ita
excludimus spiritus, humores &c. Item
adipem, quæ quandoque ab ita partis nu-
trimentum.

2. Quæ solida est.

3. Quæ

Proœmium.

3

3. Quæ propriam habet circumscriptionem. Contrarium in adipe est, quæ terminatur figura partium circumjacentium.

4. Quæ toti continua.

5. Comparata ad functionem vel usum.

Ut verò intelligatur, quid significant hic actio & usus, breviter explicandum. *Actio*

io vel *functio* alicujus partis potest esse vel *Quid per*
privata vel publica. E. G. Cutis habet *actionem*
actionem privatam per se, ut alimenti attractio- *actionem*
em, retentionem, &c. habet v. etiam publi- *partis in-*
telligatur.
am, pro toto animali, videlicet dignotio-
em qualitatam tactilium. Sic actio epatis
est sanguificatio, testium seminis elabora-
tio, mammarum lactificatio.

Usus cujuslibet partis ex tribus potissimum fontibus hauritur, & sunt,

Quid per
usum.

1. Propria ejus *temperies*: hoc est, Symmetria quatuor qualitatum. E. G. Cutis quoad qualitates primas est temperata, queritur in quem usum? Resp. Ut dignoscat omnes qualitates tangibiles.

2. Quæ temperiem consequuntur, & sunt secundæ qualitates: duricies, mollicies, crassities, tenuitas, densitas, raritas &c.

3. Quæ necessario accidunt, ut magnitudo, numerus, meatus vel cavitas, figura, conformatio, connexio, situs, superficies. Verum nos in hisce institutionibus in gratiam discipulorum cum alijs Anatomicis, raro accuratius

A 2

curatum

curatum hoc discrimen inter actionem & usum servabimus, præsertim ad evitandam tædiosam variarum rerum repetitionem.

Antequàm verò ad partes divisionis seu differentias accedamus, tenenda summa quæstionis istius, quænam pars prius generetur. Sciendum secundùm Hippocratem

Que pars corporis prius generetur. partes omnes simul formari & discriminari, quemadmodum in circulo nec principium nec finis est, sed omnia simul principium atq; finis. At non omnes partes simul perficiuntur & exornantur. Verum 1. venæ umbilicalis. 2. Epar, postea Cor (quod Aristoteli primo generari voluit, Epar vero Galenus tandem cerebrum. Umbilicalis ergo venæ primò perficitur & absolvitur ratione amplificationis sanguineæ, non ratione primæ constitutionis ex semine. Alij verò dicunt ex semine esse partium quasi stamen, ex sanguine subtegmen, putantes duo esse principia materialia partium corporis: semen & sanguinem. Quam sententiam refutavimus & abundè explicavimus in Problematis nostris Philosophicis Exercit. 2. probl. 2. & Exerc. 1. probl. 1.

Atque ita vasa ante viscera ratione perfectionis gigni dicuntur. Et meritò. Aliàs enim viscera nutriri non possent absq; instrumento hoc proportionato; vena, per quam

Proœmium.

5

*Cur vasa
ante visce-
ra gigni
debuerint.*

quam sanguis ad alendum defertur. Quem-
modum enim ex nucleo vel semine in
terram misso, primò descendit in terram
adix oblonga, postea aliæ radices se dif-
fundunt in latitudinem ad superficiem ter-
re, ex quibus postea truncus & rami: sic ex
mine in uterum commisso primò oritur
vena umbilicalis, sanguinem excipiens ex
lacenta uterinâ, ex quâ umbilicali oritur
vena portæ cum suis radicibus.

Nunc ad divisiones seu differentias par-
tum accedemus, quæ variæ esse possunt.

Latè sumendo *partes* nonnulli dividunt, *Partes*
quædam sint *necessitatis*, quemadmodum *quotupli-*
or, epar, cerebrum, pulmo, ventriculus. *ces.*

quædam *commoditatis*, & vel *magna*, ut ocu-
& testes, vel *minoris*, ut ungues: quædam
natus, ut coma & barba.

Sed nos dividimus partes præcipuè ra-
tione finis, vel ratione materiæ.

Ratione finis dignioris aliæ sunt *principes*,
aliæ minùs principales & *ministrae*.

Principes sunt epar, cor, cerebrum (addūt *Partes*
ij testiculos) quæ aliarum partium prin- *principa-*
cipia sunt. Vt, ex cerebro nervi oriuntur *les.*
(communi sententiâ) ex corde arteriæ, ex e-
ate venæ.

Intelligendum autem principium non
radicationis seu originis; nam ita semen o- *Principiū*
animum partium est principium, sed dispen- *radicatio-*
sationis *nus.*

A 3

Principiū
dispensatio-
nis.

sationis & distributionis, hoc est, quod à se
emittit aliquod instrumentum, vim & com-
munem materiam. Sic à corde tanquam
principio dispensationis oriuntur arteriæ
quia hæ à corde virtutem suscipiunt, ibiq[ue]
initium habere videntur. Ita de venis &
nervis intellige cum suis principijs. Ita al-
iis ossibus oriuntur cartilagines, item liga-
menta.

Ministræ vel sunt necessariae vel non.

Partes mi-
nistræ.

Necessariæ sunt, sine quibus animal ve-
non vivit, vel malè vivit. Sic inservit pul-
mo cordi; intestina ventriculo; ventriculus
epati & lieni; epati vesicula felle; porus b-
larius, & vesica urinaria; cerebro sensuum
instrumenta omnia.

Non necessaria, ut caro simplex &c.

Ratione materiæ proximæ partes al-
sunt simplices, homogeneæ sive similares,
aliæ compositæ, heterogeneæ seu dissim-
lares.

Similaris pars est, quæ in similes sibi pa-
tes dividitur, ita, ut omnes particulæ ejus-
dem sint cum toto substantiæ, ut quælibet
pars carnis est caro &c.

Tales partes similes ab alijs plures,

Pars simi-
laris quid
& quotu-
plex.

alijs pauciores recensentur.
Aristoteles varijs in locis has numerat
Sanguinem, pituitam, bilem, saniem, sem-
lac, fel, pinguedinem, medullam, carnem

venis

venas, arterias, nervos, fibras, membranas,
cutim, ossa, cartilagine, pilos, unguis, cor-
nua, pennas.

Averroes ex his quasdam omittit, & ad-
dit melancheliam, spiritus, masculū, chor-
dam, ligamentum, axungiam.

Galenus varijs in locis has habet: os, car-
tilaginem, venam, arteriam, nervum, mem-
branam seu panniculum, fibram, tendinē,
ligamentum, unguem, cutim, pinguedinē,
medullam, humorem vitreum & cristalli-
num, carnem musculorū & viscerū cū pro-
pria substantia cerebri, ventriculi, intesti-
norum, uteri.

Archangelus omnes hactenus ab alijs
dictas retinet, & addit spiritus triplices, 4
humores alimentarios, item excrementi-
tios, ut urinam in vesica, bilē flavam felleæ
vesicæ, pituitam excrementitiam, & omnia
omnium coctionum excrementa, cuticu-
lam, & internam cavitatum interiorum.
Addit adhuc alias similes non vulgatas
17. propriam nimirum substantiam (remo-
tis alijs partibus similaribus, venis, arterijs
&c.) cerebri, linguæ, pulmonis, cordis, je-
coris, vesicæ biliaræ, lienis, ventriculi, inte-
stinorum, renū, ureterū, vesicæ urinariæ, ute-
ri, penis, testium, musculorum, glandularū.
Sed frustra, ceu nova hæc adducit. Sub car-
ne enim continentur ferē omnia. Nam

A 4

Hippo-

Caro quo-
duplex.

Hippocrati & Galeno alia est caro musculorum, alia viscerum, alia glandularum. E alibi Galenus triplicem proponit carnem. 1. in musculo, quæ veteribus tantum carum vocatur. 2. *παγεγχυμα* in Jecore, corde, rene, &c. 3. tandem in ventriculo, vesica, venis.

Unde quadruplex colligi potest Caro. 1. Musculosa, quæ Galeno sæpè Caro fibrosa dicitur, estq; mollis & rubicunda, & propriè Caro dicitur. Atque Hippocrati sæpè Caro, idem quod musculus. 2. Viscerosa, vel viscerum. Erasistrato parenchyma seu affusio sanguinis, Galeno similis & simplex Caro, quæ Viscerum vasa firmat, spacia inania replet, & actionem edit. 3. Membranosa, vel cujusque partis membranosa, carnosa substantia, ut in œsophago, ventriculo, intestinis, utero, vesica. 4. Glandulosa, vel glandularum, quæ est. 1. pro vasorum divisionibus firmandis. 2. pro humoribus superfluis quia spongiosæ & raræ sunt glandulæ, imbibendis. Vnde vulgò dicuntur emunctoria: Capitis quidem, quæ in collo sunt. Cordis, quæ sub axillis: epatis, quæ in inguinibus. 3. pro partibus humectandis ad faciliorem motum, vel aliàs ad prohibendam siccitatem. Tales sunt ad linguam, laringem, in oculorum angulis &c.

Sed partes similes decem numerantur

Proœmium.

os, cartilago, ligamētum, membrana, fibra,
nervus, arteria, vena, caro, cutis.

Ex ijs quædam sunt ad sensum tantum
similares, ut venæ, arteriæ, nervi (addunt a- *Partiū Re-*
lij musculū) alię simpliciter similes sunt. *miliarium*
Venas, arterias, nervos, musculos, non esse *numerus*
reverā simplices recte docuit Aristoteles.
Nam musculus constat carne, fibris, tendi-
ne. Nervi ex durā piaq; matre & medullā.
Arteriæ ex duplici differente tunicā: venæ
ex tunicā, (fibris etiam secundum alios) &
ostiolis sive valvulis. Simpliciter & verè
similes sunt os, cartilago, ligamentum,
membrana, fibra, caro, cutis.

Hic notandum partes has omnes dici
vulgò vel spermaticas, vel sanguineas, vel
mixtas.

Spermaticæ, quæ ex semine factæ, & sunt *Pars sper-*
octo priores enumeratæ, quæ si dissecētur, *matica*
non regenerantur, nec vere uniri queunt, sed *quid.*
callo medio junguntur ob inopiam mate- *Sanguinea*
riæ & virtutis electricis, quæ post confor- *quid.*
mationem partium sopitur.

Sanguineæ seu carnosæ partes contra re-
generantur, quia ex sanguine factæ putan-
tur, ut caro.

Mista pars est cutis, de qua postea, lib. 1.
cap. 2.

Etenim semen & sanguis communiter
statuuntur duo principia generalia gene-

A

ratio

rationis nostræ, ita, ut in semine sit principium materiale paucissimum, effectivum plurimum. In sanguine materiale plurimum, efficiens verò imbecillius. Ex semine prima partium rudimenta & filamenta tanquam stamina constitui dicuntur; ex sanguinis adfluxu subtegmen. Sed quidnam reverà statuendum sit contra vulgatam hanc opinionem, docuimus in Problem. Philosophicis & Medicis.

*Pars dissimilis
quid.
Organice partes*

Partes compositæ seu dissimiles sunt, quæ in partes dissimiles plures dividi possunt, ut manus non secari potest in alias manus; sed in ossa, musculos, venas, &c. Dissimiles Philosopho dicuntur *membra*: alias partes organicæ vulgò dicuntur, seu instrumentales.

In quovis autem organo quatuor, ut plurimum sunt partium genera, E. G. in oculo
1. est pars, per quam fit actio nempe visio, ut humor crystallinus.

2. Sine qua non fit, ut nervus opticus.

3. Per quam melius fit, ut tunicæ & musculi oculorum.

4. Per quam conservatur actio, ut palpebræ, &c.

Quia verò magis vel minus compositæ sunt dissimiles, dividuntur in 4. gradus seu ordines.

Sunt

1. Sunt similes ad sensum, ut musculus, vena, arteria.

2. Ex his constant & reliquis similaribus, ut digitus.

3. Ex secundis componuntur, ut, manus, pes, &c.

4. Ex tertijs, ut brachium.

Tandem in maxima sua membra *dividitur corpus*, alijs in caput, thoracē, ventrem & vesicam, alijs, ut Aristoteli, Ruffo & Oribasio in Caput, collum, thoracem (sub quo etiam imum ventrem complexi sunt) Manus & Crura. Sed rectius alijs *in ventres & artus*.

Ventres sunt insignes cavitates, in quibus *Commodis* nobile aliquod est viscus: & quemadmodū *simia divitria* sunt principalia membra, sic *tres vētres*: *sic totius Infimus* vulgò abdomen epar cōtinet & par- *corporis huius* tes naturales. *Medius* seu thorax cor & par- *manus* tes vitales. *Supremus* seu caput cerebrum & partes animales. *Artus*, qui melioris vitæ causa sunt dati, *sunt manus & pedes*.

Atque ita quatuor libros faciemus: 1. De ventre imo. 2. de cavitate media. 3. de *Divisio ta-* *premâ* sive capite, Quartum de artu- *tius huius* *bus*. His respondebunt quatuor alij li- *operis in 4* *belli*: Primus, de venis, quæ ab Epate *libros & 4* *in* cavitate imâ oriuntur. Secundus, de *Libellos* *arterijs*, quæ à Corde prodeunt in ca- *vitare media*. Tertius, de nervis, qui à *Cere-*

cerebro prodire communiter statuuntur.
4. De ossibus, quæ maximam partem in artubus reperiuntur: & sicuti ossa conjuncta compagem cōstituūt, quasi totum aliquod corpus: sic etiam venæ, arteriæ & nervi.

Aliam divisionē Corporis repperire licet apud Fernelium, cujus tamen usus non est nisi in Medicina. Dividit Corpus in regiones publicas & privatas. Privatas vocat, Cerebrum, pulmones, renes, uterum, &c. Publicas seu communes facit tres, in totū corpus extensas. 1. habet venam portæ, & partes omnes, quibus ejus rami prospiciūt. 2. Incipit à radicibus cavæ & terminatur in tenues venas, ante quam in capillares definant. 3. habet musculos, ossa & corporis molem definentem in cutim.

Primam regionem purgamus per intestina, secundam per vias urinarias, tertiam per cutis spiracula.

LIBER

LIBER I.

De Infimo Ventre.



Methodo sectionis hic venter præmittitur, cuius anatomie omnium primò instituitur, ut citius removeatur sentina excrementorum, & putredo à toto cadavere exulet.

Ratio op-
dinis.

Cur secti-
onis initiū
fiat ab imo
ventre.

Est autem totum id, quod intus dia-
phragmate à thorace distinguitur; circum-
scribitur a. cartilagine ensiformi, ossibus
pubis, & coxendicis, lumborum vertebrae,
& utrinq; costis.

Imus ven-
ter quid.

Pars ejus anterior dicitur *epigastrium*, *A-
rabibus myrach*. Et hujus quidem, pars supe-
rior *hypochondrium* dicitur, quod dextrum
vel sinistrum, aliàs *Φρένες* & præcordia.

Media regio *umbilicalis* dicitur, cuius duas
partes laterales vocat Aristoteles *λαγῶνας* Imi vētrō
à laxitate, Galenus *κενεῶνας*, inania. partes, &

Inferior, quæ est ab umbilico ad pubem earum 'ap-
dicitur *hypogastrium*, imus venter latinis, & *pellationes*
aqualiculus, hujus partes laterales *ilia* di-
cuntur, in femoris verò flexu ad pubem
inguina: *pubes* autem pars est supra puden-
da proxima, quæ lanugine seu pilis tegitur

Pars

Pars infimi ventris posterior vel est superior, quæ lumbos constituit, vel inferior, quæ nates.

Cæterum constat hic venter ex partibus integumentibus & tectis, hoc est exterioribus & interioribus.

Partes communes in hoc primo libro examinanda. Vestientes seu continentes (quas abdomines in propriè vocant) vel communes sunt; ut cuticula, cutis, pinguedo cum suâ membrana; panniculus carnosus, & tunica cuiusvis musculo propria, vel

Propriæ, sunt quæ musculi abdominis & Peritonæum.

Partes interiores seu contentæ vel ad nutritionem faciunt, vel ad procreationem. Ad nutritionem, vel ad χύλωσιν quocunque modo faciunt, ut ventriculus, omentum, pancreas, intestina cum mesenterio: vel ad αἱμάτωσιν quovis modo, ut venæ meseraicæ, venæ portæ cum radicibus, cava cum radicibus, epas, vesica biliaria, porus bilarius, lien cum vase brevi & hæmorrhoidibus, renes, capsulæ atrabiliaræ, ureteres, vesica.

Ad generationem quæ faciunt, vel sunt viriles vel muliebres. Viriles, ut vasa spermatica, corpora varicosa seu parastata, testes, vasa deferentia, prostata, vesicæ seminales, penis &c. Muliebres, ut vasa spermatica, corpus varicosum & testes, vasa ejaculatoria, uterus cum suis partibus &c. Cui

verò

verò in utero est homo, alia adhuc consideranda sunt, ut vasa umbilicalia, tunicae foetum involventes, &c. de quibus suo loco.

CAPUT PRIMUM.

De Cuticula.

Cuticula Græcè *Andepuís* alijs summa vel ultima cutis, item cutis efflorescentia, cutis operculum &c. est pelligula; vitæ sensusq; expers, tenuis, densa, exsanguis, è vaporibus oleosis, crassis & viscidis a frigiditate externa condensatis ad regendam cutim.

*Cuticula
quid.*

Materia ex qua cuticulæ non est semen, nã
1. non est pars corporis. 2. non nutritur, 3. pars spermatica ablata non regeneratur; at cuticula facillè deperditur affricu vel attritu, aut per vesiculas ab igne, aqua fervente, &c.

Neque ex sanguine materia est, nam 1. Omnes venæ in vel intra cutim terminantur.
2. Non habet fibras spermaticas, ex quibus omnis pars sanguinea firmamentum habet.
3. In morbis diuturnis & tæbe sæpe crassescit.
4. Incisa vel dilacerata non emittit sanguinem.
5. Non rubet &c.

Materia

cuticulæ

an semen.

An san-

guis.

An excre-

Neque ex excrementis alicujus coctionis materiam habet cuticula. Non ex primæ

mentū co-

ctionis.

primæ

primæ coctionis excrementis aut secundæ,
quia ex facibus urina, vel bile, quomodo
fieret? neq; ex tertiæ. Tertia enim coctio
triplex habet excrementum, 1. halituosum
& tenue, quod exspirat. 2. tenue quidem
sed magis solidum, aqueum, ut sunt icho-
res, humores serosi, qui acrimonia & acer-
bitate potius impedirent generationem cuti-
culæ, aut natam eroderent. 3. Crassum, te-
nacios, strigmentorum instar adhærens,
quod exsiccari & in cuticulam verti putat
Archangelus & Laurentius, & monstrant
ex sordibus, quæ expedum plantis in bal-
neo abraduntur. Atqui hoc modo in bal-
neis cuticula decederet.

*Refutatur
Archange-
lus & Lau-
rentius.
Vera mate-
ria Cuti-
cula.*

Ergo materia est aliud excrementum, nem-
pe vapor oleosus, crassus, lentus, & hu-
midus (nam ex ficcis halitibus fit pilus)
ex cute & membris, subditis. Sic vide-
mus in pulte cuticulam superius fieri ex
vaporibus ascendentibus & per frigus con-
densatis.

Genita verò est cuticula partim in utero
cum cute, partim extra. Intra: nam 1. sic et
iam rudimenta & initia adsunt dētium, pi-
lorum, unguium, in fœtu. 2. absque cuius
cuticula, maderet cutis, & exsudaret humo-
rum dolore, ut in intertrigine & phæ-
nigmis. 3. Experientia ostendit cuticulam
in abortu nonnihil conspicuam, & v
cujus

ajusdam humiditatis abradentis separari potest. Sed adhuc in utero est tenella, mollior, & inchoationem duntaxat accipit, quia ibi non tanta frigiditas est, sed minor, videlicet ex serosa humiditate factum ambiente. Verum extra uterum complementum accipit, & perfectiorem a frigidityte aeris, quæ magis condensat, exsiccaturq;.

EFFICIENS ergo remota & interna est calor internus, vaporem protrudens ad superficiem corporis, quemadmodum calore Solis fiunt exhalationes. Proxima externa est frigiditas alicujus corporis, ut aeris &c. cogens atq; densans. Sic vasis, fervidum lac, ferculaq; alia calida cuculam nanciscuntur. Vapor autem iste non terrestrior & viscosior est, eò solius quid inde generatur.

U s u s est tueri cutim. Propterea non nihil dura est, tenuissima tamen & perspirabilis, quemadmodum ceparum tunica pellucida, ne, si crassior esset, cutis non recte sentiret. Callosa tamen aliquando ab labores in pedibus & manibus.

Densa est & cute compactior. Vnde pustulae aquosæ cutim transeunt, non uticulam. Non tamen nimis densa, ne prohibeat corporis transpirationem.

B

Et

Et densa quidem est, non tantum ad tu-
das partes, subjectas verum etiam ne
minus effluxus fiat vaporis, sanguinis, si-
rituum & caloris. Nam est operculum
osculorum & extremitatum. val-
rum.

*Colore candido est, ideoq; frigida & sic
temperie & plane exsanguis.*

*Numerus etiam in accidentibus spec-
tur. Est autem numero uua, semel tan-
tum duplex inventa est, & quidem ab
qua pendente.*

*Connexio hæc est, ut ita actè cohereat
ti homine vivo, ac si continua esset.*

CAPVT II. DE CVTE.

Cutis quid **C**UTIS, Græcè *δέρμα* quasi *δέρω*
vinculum, est integumentum co-
poris commune, vel membrana tempo-
ra ex semine à propria facultate geni-
ta ut sit tactus instrumentum & ad sub-
starum partium tutelam.

Resutatur Dicitur *membrana*, quod intelligen-
Archange- non simpliciter, sed ut membrana sit
lus. juris & proprii temperamenti. Ma-
ergo simpliciter Piccolomineus voluit
cutim esse simpliciter membranam.

Cut

infantis enim crassior est, & habet substan-
tiam propriam, estq; temperata. Aliorū
sententia est,

MATERIAM esse semen & sanguinē
dobè invicem mista, ut cutis habeat me-
mbranam inter carnem & nervū. Vn-
Galenus ait, quod sit quasi nervus san-
guine præditus: nō ait simpliciter, ex car-
& nervo; sed cū particula quasi. Nam
membranę eam assimilat, quia alicubi
tendi potest, sentit exquisitè, albi-
t.

Aristoteles ex carne exsiccatā & sene- *Aristote-*
cente cutim constare voluit. Atqui cu- *les refutā-*
deglubitur facilè à subjectis partibus, *tur.*
inter carnem & cutim est pinguedo,
membrana, &c.

Alij ex extremitatibus vasorum dila-
tis, eò quod ubiq; vivat & sentiat, & in
eum vasorum extrema desinant: Verūm
hoc de omnibus partibus dici potest.

Alij ex nervis mollioribus in su-
perficie corporis expansis, concurrente
sanguinis additione: Verūm hæc opinio
eiusdem cum priori valoris est.

Ergo ex semine in quantitate mode-
rata accepto constat cutis; & pro amplia-
tione moderatum sanguinem accepit:
detur tamen superare semen. Nam *Materia*
Cutis

albicat cutis naturaliter: licet pro sub-
 stantiorum corporum & humorum com-
 variet. Nam qualis humor, talis color
 cute efflorescit. Sic Sanguinei rubens
 Ictericus flavescunt vel nigricant. Car-
 si subjacet, citius rubet: si pinguedo,
 bicat.

Ad semen respiciunt autores, quan-
 ajunt cutim vulneratam non coire. In
 tione sanguinis simile quid cuti fit, ci-
 trix: estq; ex carne exulta & quasi exte-
 cata.

*Cicatrix
 quid.*

Quamobrem cutis cum sit quasi
 membranosa (frigida & sicca) & carnis
 (calida & humida) substantia; tem-
 rata erit in omnibus qualitatibus primi-
 & secundis, ut recte judicet de omnibus

EFFICIENS est propria vis cutis
 neratrix, nempe cutifica, quemadmodum
 in osse est ossifica, in nervo nervifica
 vis illa exstruens partem similem
 versam à reliquis similaribus. Quo-
 do autem ex eadem materia seminali
 ficiat nervos, ossa &c. vis est occulta
 quasi divina.

ACTIO publica cutis & toti animalis
 cessaria est esse tactus instrumentum. Nec
 licet organa sensus omnia sint partes
 similes, tamen una similis est primi-

causa actionis, à toto organo edende.
 simpli gratia: manus est quidē organū
 tus; at maximē ea pars, cutis, quæ vo-
 manuum & pedum investit, quippē
 operatissima. Et quia cutis in quantita-
 us primis est temperata, ideo etiam
 secundis, ut mollicie, duricie, crassicie,
 nitate &c.

Insus cutis est, ut sit corporis regumene
 a, ideo.

Figuram accepit ita rotundam, longā,
 prout partes subiectæ requirunt,
 o etiam

ori sita est, & quia emunctoriū qua-
 corporis esse debet.

erforata est varijs in locis ad introitū
 exitum necessariorum. Sunt autem
 foramina alia conspicua, ut, ad os,
 es, nares &c. alia inconspicua & in-
 ibilia, ut pori, qui dant exitum excre-
 tis, fuligines excludunt, attrahunt
 m ambientem.

Pori cutis.

raffa est cutis, sed tenuior quā in a-
 nimalibus, *mollu* & exquisitē sentiēs,
 mollior & rarior in facie, pene &
 to; durior in cervice, cruribus, plan-
 edū, dorso: media in duricie & mol-
 est in digitorum apicibus. Sic quæ-
 cutis est crassissima, ut in Capite

B 3

(Telle

(teste Aristotele, quem falso citat Columbus) Quædam crassa, ut in collo; quædam tenuis, ut in lateribus, unde titillatio; quædam tenuior ut in volâ manu tenuissima in labijs.

Connexio. Quædam cutis à subiectis partibus facilè separatur, ut in ventre inferiore & medio, brachijs & cruribus. Alijs difficulter, ob membranam carnis, cui nectitur fibris & vasorum beneficio. In plantis pedum & volis manuum vix separatur, quibus connascitur ad firmiorem apprehensionem. Vix etiâ à cervice frontis & totius ferè faciei, maxillarum & labiorum, ob tendines & nistulos, maxime eum, qui latus dicitur, nistulos. Sic in fronte mobilis est, in reliquo corpore non item.

Cutis *vasa* communia accepit pro nutritione, vita & sensu. Venas cutis accepit duas per caput & collum à jugularibus, duas per brachia, thoraceo & dorsum, ab axillaribus. Ab inguinalibus duas, per infimum ventrem, lumbos & pedes. Sic & arterias & nervos recipit.

CAP

DE PINGVEDINE.

PINGUEDO est corpus simile vite
expers, ex sanguine unctuosum mem-
brarum frigiditate concreescens, ad to-
tus tutamen.

Pinguedo Græcè *πιμελή* à Gaza male
artitur adeps: Pinguedo enim est aërea, *Diserimen
inter pins
guedinem
& adipem.*
solida & humida, humidiorum animalium
calore facilius funditur, difficulter co-
gitur rursus, sed nec frangi potest, & mol-
lis, laxa & rara: Contrarium verò intelli-
gitur in sævo, quod promptè coit, solvitur
difficiliter &c.

Est autem pinguedo propriè loquen-
do, non pars, sed potius humor, nisi fortè
nà cum membranà consideratur, ut sæ-
pe fit à Galeno.

Ratio ordinis hæc est, quia pinguedo
homine est inter cutim & membranà
carnosam, in brutis membrana subij-
tur.

Pinguedine destituuntur partes, qui-
bus esse poterat inutilis, commodam cō-
plicationem & distentionē impediendo,
in cerebro, palpebræ, penis, scrotum,
& testium membranæ. Adest verò præci-
pue

B +

puè

puè in partibus quæ valentiùs moventur, durior, adipis instar, fibris & venulis intertexta, ut in vola manus, digitorum internis sedibus (nam ibi plures tendines, nervi & vasa, quæ humectari debent pedis plantâ, maximè calce. Mollior, in varijs partibus est, de quibus suo loco

MATERIA unanimiter statuitur sanguis, undè Aristoteles ait, quæ sanguine carent, nunquam habent adipem vel sebum: sed sanguis defæcatus, & absolutè coctus, neque adhuc omnis ejusmodi sanguis, sed qui tenuis est, aëreus & oleosus. Et cum pinguedo fit ex oleoso sanguine de calore multum deperditur, Vnde Aristoteles: Quæ à frigore condensantur ab ijs multum caloris exprimitur, & alibi: Materiæ naturales sunt tales, in quibus sunt loco.

*Pinguedo
sanguine
frigidior.
Sed moderate calida.*

Hinc adipis natura est paulò frigidior sanguine, interim calida est moderata. Nam

1. Foris imposita digerit, resolvit, digerit.
2. Est tenuior pars sanguinis & oleosior.
3. Ignem facilè concipit.
4. Intus auget calorem, quemadmodum omentum coctionem ventriculi, &c.

Alij volunt esse frigidam, quia Aristoteles ait: quæcunq; à frigido concrescunt & à calido solvuntur, frigida sunt. Atqui pinguedo à frigido concrescit.

R. Adeps est frigidus respectu caloris, quem antea habuit, dum sanguis erat. Sed ex eodem Aristotele discendū, quòd quæ frigore concreverunt, & facili calore resolvuntur, non multum caloris perdiderint.

EFFICIENS est *frigiditas membrarum*, (à quibus album calorem contrahit) non simplex sed respectiva, sufficiens tamen ad cogendum exsudantem partem oleosam sanguinis, quemadmodum & plumbum liquatum cogitur, mox ubi ab igne removetur, etiamsi in locū satis calidum, igne tamen frigidiorē effundatur. Et pinguedo à frigore concrescit, incerto quodam quasi gradu (nam non fit quodlibet ex quolibet) quamobrem non in quavis parte generatur pinguedo. Fieri autem pinguedinem ex frigiditate, Galenus & alij eruditi statuerunt, ita, ut quod in sanguine pingue, leve & tenue *Pinguedo* est, dum fit in calidioribus corporibus *quomodo* alimētum, in frigidioribus servetur, (un- *fiat.* *Pinguedi-* *nihil pingua*) & cum venæ extra se *nē fieri à* *trans-* *frigiditate* *probat.*

B 5

trans- frigiditate probatur.

transmittunt, incidēs in membranas cō-
crescit. Nam

1. Sanguis etiam hoc modo extra vasa
concrefcit, ob frigidi aëris accursum, li-
cet ob internam etiam frigiditatem.

2. Aristoteles ait, ex ijs quæ liquantur,
quæcunq; calore solvuntur, à frigore dē-
santur quemadmodum oleum.

3. Frigidiora sunt pinguiora, ut, castra-
ta, fœminæ, item quæ in terrâ diu latent
ociosa: sic hyeme omnia pinguiora
sunt.

*Vnde pin-
guedo in
omento.
Circâ cor.* 4. Non nisi locis frigidis ad nascitur
pinguedo: quemadmodum in membra-
nis: ita videmus omentum esse pingue ra-
tione membranosa substantiæ, tum etiã
ratione loci, à calidioribus visceribus re-
moti, quandoquidem intestinis incum-
bit, peritoneo subijcitur, & quia pluribus
venis & arterijs refertū est, multum pin-
guedinis colligit. Sic circa cor nascitur
adeps, nam ibi pericardium adest, frigida
& crassa membrana; deinde serosus hu-
mor in eo contentus; ex inferiore parte
Ala Oegryua seu flabellum, ex utroque
*Circâ re-
nes.* latere pulmones instar follium, media-
stinum, &c. Sic ad renes nascitur pin-
guedo, quia seroso abundant excremen-
to, spinæ adjacent, intestinis operiuntur.

5. Oper-

5. Operculum aque ferventi imminēs, vapores ad se sublato cogit, & in aquam vertit, ob frigiditatem. Nam fac aerem calidissimum ambire, tūm vapores operculo insidentes non densantur.

Alia opinio est, quod pinguedo sit à causa calida, eò quod materia ejus sit calida, & quod flammam facillè concipiat pinguedo, item, quod omnia in corpore fiāt per coctionem & calorem.

Opinio, fieri pinguedinem à caliditate.

Sed ex præcedentibus responsio liquet. Et nos nō intelligimus simpliciter frigiditatem, unde cruditas, sed debilem calorem.

Alij dicunt à membranæ densitate pinguedinem habere consistētiam, eò quod densi sit densare.

Opinio, fieri à densitate.

Resp. Frigid. est densare, & densitas est à frigore, neq; densi est densare, nisi esset qualitas prima activa, aut frigus sibi ascriberet.

2. Ita obijciunt: Operculo denso licet calidissimo occurrens vapor sublatus ex aqua fervente mutatur in aquam, aut in destillatione per alembicum, exhalatio è re subjecta, tum vitro dēso impeditur, reflexa in densiorem substantiam vertitur.

Sed responsio ex priorib. liquet; & deinde, qui ebullitione vapores attollūtur, si vate
ita

ita includantur, ut expirationi locus denegatus sit, novis vaporibus continenter succedentibus, ne fiat penetratio corporum, necesse est resumere priorem consistentiam: sed, si exitum habet, eunt in aquam, ob aërem frigidum ambientem, vitreum operculum. Hinc ut facilius & copiosius liquor emanet, illud subinde frigida destillatores refrigerant. Sic aëre foris frigidus vapores intus calidi ad fenestras in aquam abeunt; aëre foris calido non item.

3. Ajunt multa esse frigidissima, ut cerebrum, meninges &c. quæ pinguedinem non habent. Resp.

Istæ partes etiam sunt densæ.

U s u s 7. Instar vestis calefacere, calorem nativum fovere, suâ visciditate effluxum prohibendo, crassitie & densitate meatûs occludendo, ne frigus penetret; & æstate calorem inhibendo, quominus penetret.

2. In primis coctionem ventriculi juvare. Unde omentum excisum, flatus & ructus gignit, & pro bonâ coctione alia adhibere oportet, quæ ventriculum tegant.

3. Calidas & siccas partes, ut cor, oblinere & humectare.

4. Mo-

4. Motū faciliorem reddere, & partes
servare, ne exsiccentur nimis, distendā-
tur, aut rumpantur. Hinc cartilaginum
extremitates tuetur, articulos majorum
ossium, & quorundam ligamentorum
externā sede, item vasis ad cutim delatis
substernitur. Sic ob hanc causam pingue-
dinis copia in orbitā oculi, ne ob motum
continuum exsiccatio & ariditas quasi
sequatur. Et vena coronalis cordis mul-
ta pinguedine est munita, ut motui, &
magno, calori cordis obviam eatur.

5. Est instar pulvinaris & propugna-
culi, contra iētūs, contusiones, compres-
siones. Hinc clunibus, volis manuum &
pedū natura dedit copiosam pinguedinē.

6. In inediā vertitur in alimentum :
nam dulci & pingui nutrimur.

7. Spacia vacua implet inter muscu-
los, vasa & cutim, adeoque corpus reddit
æquale, album, molle, pulchrum, formo-
sum. Hinc tabidi & vetulæ deformes.

CAPVT IV.

DE MEMBRANIS IN GE-
nere, de membranā carnosā, & mem-
branā musculorum propriā.

Pinguedini in homine substernitur
MEMBRANA CARNOSA, quæ tamen
cuti

cuti proxima est in simiis, canibus, ouibus
 lius. De hac antequam agamus, Membrana
 na natura in genere cognoscenda.

MEMBRANAS veteres vocarunt
 ὑμῆρας, aliquando χιτῶνας tunicas; aliis
 quando, μνίσσας, aliquando operiment
 & tegumenta. Et latè Galeno atq; Anato
 micis tunica & membrana unū sunt, stri
 ctè & propriè iisdem

MEMBRANA est, quæ partem ambi
 corpulentiores, ut peritonæum, pleura
 periostrum, pericardium, & musculorum
 membranæ peculiare.

Differētia

inter mē-

branam tu-

nicam &

meningē.

Membra-

na quid.

TUNICA strictè & propriè vasis tri
 buitur, ut venis, arterijs, ureteribus, ut
 ro, vesicæ biliaræ & urinariæ, & ophage
 ventriculo, intestinis, testibus.

MENINGIS vox peculiariter cerebri
 membranis tribuitur.

Est autem membrana pars similis la
 ta, plana, alba, & dilatabilis, ex semini
 viscido & aquoso, à facultate propri
 membranifica genita, ut partes vestiend
 custodiat.

Forma est superficiei æqualitas, tenuitas,
 levitas (ne oneret) densitas, validitas
 ut dilatari possit.

Vsus est i. partes vestiendo custod
 re, ob duritiem & densitatē, & instrument
 tum tactus esse: nam membranarum opo
 partem

partes sentiunt. Et tanta necessitas est membranarum, ut natura quamlibet partem membranâ intexerit.

2. Ad robur partium conferre.

3. Ne frigore pars lædatur, & ne calor naturalis exhalet.

4. Ut partes partibus conjungat. Sic mesenterium intestina dorso connectit.

5. Vasorum ora claudere, ne humores effluant vel refluant. Ut fit in vesicâ ad ureterum implantationem, in cordis ventriculis per valvulas.

Est autem membrana alia crassior, alia tenuior.

Tenuis differt in tenuitate. Nam Pericranium costarum est tenuius, quam pleura, pericranium capitis quam pericranium, dura, quam pia mater, crassior est.

Crassa est membrana carnosâ quæ nec ipsa quidem æqualitatem servat. nam in collo crassior est. Sed de membranâ carnosâ jam audiemus.

PANNICULUS CARNOSUS seu MEMBRANA CARNOSA quibusdam musculus membraneus dicitur, alijs panniculus nervosus, adiposus &c. Carnosa dicitur, quia in quibusdâ locis ab it carne musculosam, & animalibus totam

cutim

Membrana
quotuplex

cutim hujus interventu moventibus videtur esse musculus; adeò carnosus fibris donatur, præsertim in collo, cujus motu muscas abigunt. In homine verò exco-
pra fronte est immobilis. Deinde in m-
dò natis carnem refert, ob sanguinis co-
piam, in adultis membranam, ob exsiccationem continuam. In homine al-
quo, si fiat exacta separatio, apparebit e-
constare ex quatuor membranis distin-
ctis.

U s u s 1. Munire partes vicinas, im-
totum corpus integere & defendere, unde
de apparet ejus *situs*, quod totum corpus
ambiat.

2. Pinguedinem continere, ne diffluat
aut à continuo musculorum motu
quiescat.

3. Vasa ad cutim abeuntia (quæ eunt
inter cutim & hanc membranam) fulci-
re. Nam

Connectitur cuti per plurimas venas
pauciores arterias, nervorum propaga-
nes, & fibras membraneas; membrana
verò musculorum subjectis, per fibras
tenuiores. Falsum ergò illud, absumi
per inediam pinguedine, cutim cum mu-
sculis non aliter coherere, quàm pilam
cum linteo quo obducitur. Dorso fo-

issimè adhærat, membranæ specie,
eò indè oriri dicitur; in hominis par- *Ortus mē-*
antere colli & fronte, à cute & *brana car,*
musculo lato vix separari potest; adeò *noſa.*
thæret, & musculus latum constitue-
putatur.

Superficies est lubrica, parte quâ mu-
ulos tangit ob lentum humorem mē-
anis oblini solitum, ne motus mu-
ulorum impediatur. Sensu est exquisi-
to; undè, si acri humore vellicetur, ri-
or fit.

MEMBRANA MUSCULORUM
PROPRIA, quam alij à perioſteo oriri vo-
unt, alij à musculorum nervosis fibris,
nuis, est, & annectitur musculo per
nuissima filamenta.

Vſus est 1. musculos vestire & ab aliis
parare.

2. Eidem sensum tactus communicare.

CAPVT V. DE MUSCVLIS IN genere.

MUSCULUS, Græcè *μῦς*, ac si murī
milis esset, dicitur; Latinis etiam la-
ertus ob similitudinem: licet certa fi-

G gura

gura musculis ob varietatem eorum: tribui nequeat.

Musculus quid. Musculus est pars organica, motus voluntarii instrumentum.

Nam sola hæc pars facultatis motricis influxum præcipere potest.

Organica est hæc pars, quia constat carne, parte tendinosa (& hæc duæ sunt musculi partes, quæ actionem ejus concernunt) venis alimentum advehentibus, arteriis calorem insitum custodiens, nervis sensum impertientibus, & maximè motum. Nam à cerebro per nervos vis motiva musculis datur.

Musculi partes tantum duæ. Dividimus musculos in partes geminas; carnosam & tendinosam. Tendinosam statuimus vel unitam vel disgregatam.

Tendinosa quotuplex. Unitæ est, ubi apparet tota pars tendinosa, alba, dura, sive in principio, sive in fine, sive in medio, sive in his omnibus.

Econtrà verò disgregata divisa est in multas minutas fibras, vix apparentes carne circumfusas; quæ tamen tendinosæ sunt.

brae inter carnosas observari possunt in
 octa carne suilla, galli indici &c. Sic in
 nonnullis musculis, præcipue verò cru-
 rum galli indici perspicue apparet tendi-
 nosum integrum & unitum à principio
 ad finem. Sic nonnunquam in homine ten-
 do statim ab exortu cum carne mistus,
 descendit. Alibi apparet tendinosum,
 unitum in fine, & disgregatum in princi-
 pio, ut in *Deltoides*, alibi in medio tendi-
 nosum, alibi nuspiam.

Tendinem autem statuimus cum *Tendo mus-
 culi quid.*
 quapendente esse corpus continuum à
 principio ad finem musculi, & esse qui-
 em corpus sui generis, natum ex semi-
 ne, tanquam principio generationis: at
 dispensationis principium est os, nam o-
 ritur ab osse, & in os inseritur. Non- *Eius prin-
 cipium.*
 nulli tamen musculi à cartilaginibus,
 nonnulli à tendinibus oriuntur, & in eos
 implantantur. Atque hinc rectè dici- *Tendo mus-
 culi de dicatur.*
 tur tendo, quod tendatur instar chordæ
 in arcu.

Alioquin dividitur musculus in prin-
 cipium, medium & finem.

C 2

Prin-

**Principiū
vel caput
musculi.**

Principium & caput musculi quādo tendinosum est, vocant Galenus & Anatomici ligamentum, illudque statuunt insensibile, item quod sit minus tendine seu fine musculi. Est autem principium in bona parte muscutorum tendinosum, rariū

Tendo dici carnosum, Et ex rei veritate loquendo potest de principium æquē vocari potest tendo at

que finis, cum ut plurimum tale sit principium, qualis finis, in substantia, in tenuitate, luciditate, albedine &c.

**Duo notan
do circa
principiū
musculi.**

Omnis autem musculus movere dicitur principiū suum versū, & omnis musculus habet nervum, qui inseritur, vel in caput, vel circa medium (& in alijs per superficiem musculi, in alijs per substantiam) ita, ut ubi nervus inseritur, ibi principium musculi sit: quā ceu Policleti regulam ponit Galenus & ait; si nervus insereretur in caudam, ibi fore principium

**Regula
Galen.**

Aliqui musculi duas nervorū propagines recipiunt, ut diaphragma; aliqui quinque, ut musculus temporalis.

Medium musculi, quod vocant ventrem seu corpus, ut plurimum tumer & carnosum est; paucis in medio tendo est, ut in musculo quodam, inferiorem maxillam aperiente, & secundo pari ossis hyo-

Fi

Finis seu cauda musculi aliis tendo dici-
tur, aliis chorda, item ἀπὸ νέυρωσις; estque *Finis mu-*
sculi unde
his modo teres, modò latus, modò lon-
gus, modò brevis; modò unus, modò plu-
res. *constet, Ga-*
Finis autem sive tendo putatur com-
muniter constare ex concursu fibrarum
ligamentorum & nervorum, tenuissima-
rum, paulatim in idem coalescentium.
Volunt enim nervum cum ad musculi
locum pervenit, in varias scissuras dividi,
et his obviam ire ligamentum, quod co-
eum modo findatur. Hinc statuunt,

1. Tendinem sentire secus quàm caput, *An caput*
quod volunt esse insensibile & immobi-
le. *musculi sit*
insensibile.

At falsum hoc; quoniam principium
musculi tendinosum, quando pungitur, æq;
convulsiones gignuntur & sæva sympto-
mata, ac si finis musculi pungeretur.
Deindè principium musculi habet motum; *An immo-*
ergò & sensum. Motum habet: quia mu-
sculus etiam in capite contrahitur &
expanditur, præsertim quando carnosum
est. *bile.*

2. Finem statuunt esse crassiores quàm *An finis*
caput: quod tamen aliquando verum; ali-
quando non, ut in bicipite & aliis. *crassior*
capite.

3. Volunt tendinem esse molliorem
ligamento (ut vocant) seu principio mu-
sculi.

C 3

sculi,

sculi, quantò nimirum est durior nervus. At contrarium est verum, videlicet tendinem esse duriores principio, quia sapienter ab it in osseam & cartilagineam naturam, ut in pedibus pennatorum; principium verò non item. Præterea negatur nervos ingredi tendinem. Nam Aquapendēs observavit sectione multā eos in

An nervi ingrediantur tendinem. gressos muscoli carnem, dispergi in minimos ramulos euntes in flexum quemdam membrum, & deinde in nihilum abire seu desinere, antequam in tendinem veniat. Deinde nervus est mollis quomodo ergò duro corpore miscetur? Nec sensu magis destituetur finis quam put, cum neq; ad hoc nervi perveniant nam nervus insertus deorsum tendit, neq; sursum,

Actio musculi est motus voluntarius.

Motus musculi est triplex: 1. Contrahitur musculus in se caput versus; hunc dum fit, oppositus relaxatur. 2. Contrahitur ita manet. Et hi duo motus sunt in se, 3. Post contractionem relaxatur, quod fit per accidens & ab alio. Unde semper sunt oppositi musculi & antagonistæ.

Cuius vero actionis vel motionis opus quod conspicitur in partibus quibus inseruntur musculi, pro varietate partium

ariar. In faucibus enim est deglutitio; in cubito, flexio & extensio &c. Immò scilicet unum ex altero sequitur. Nam thoracis muscoli dum agunt, thoracem dilatant & constringunt, attrahunt aërem & puritatem expellunt, respirationemque efficiunt.

Motus musculorum hic modò voluntarius dicitur, modò animalis, ut naturalis contradistinguitur, in brutis spontaneus. Nam motum hunc possumus excitare, tardare, sedare prout volumus. Estque in hoc motu voluntas hominis vel appetitus brutorum similis equiti, qui *quum incitat*, nervi habenis, musculi equo.

U s u s omnium partium musculi, sicut in quovis organo perfecto, ita & sic se habet. Nam 1. est à quo primò & per se editur actio, & est caro fibrosa ut plurimum venter musculi, qui maxime contrahitur. Hinc si musculum in vivo ut in mortuo, transversim absceas, in se conglobatur. 2. Sine quo non fit, ut nervus: Nam si nervi lædantur, musculi motus perit. 3. Per quod melius fit & firmitus, ut tendines & fibræ tendinosæ.

*Musculi
qui moventur.*

Vnde illi tantum musculi, qui continentur in
nuos & fortes motus edunt, tendines uni-
tos & conspicuos acceperunt. Nam mus-
culi vel se tantum movent, ut ani & ve-
sicæ; vel cutim simul movent, ut in la-
biis, fronte & facie: & in his omnibus
tendo non apparet: vel os movent, & h-
pluriq; in tendines conspicue terminan-
tur, quia motus validus membri gravio-
ris hoc requirit: vel aliud leve quid mo-
vent, ut musculi linguæ & laryngis (quo-
rum quidam tendines habent, quidam
non) oculorum, testium & penis. 4
Quæ actionem conservant, ut venæ &
arteriæ.

CAPVT VI.

DE MUSCULIS AB- dominis.

*Musculi ab
dominis
quot.*

MUSCULI ABDOMINIS dicti in
feriorem ventrem obtegunt, & Galenus
tot sunt, quot positiones fibrarum: re-
ctæ, transversæ, obliquæ, & hæ vel sunt
sum vel deorsum. Ita Galeno octo sunt
utrinque quatuor: duo obliqui descen-
dentes seu obliqui externi, duo obliqui
ascendentes vel interni, duo recti, duo
transversi: Sed duos alios Massa invenit
& post eum Fallopius, quos pyramidales
vocant, alii Fallopianos, Sylvius succenturi-
turi

variarios. Et ita hæcenus decem fecere
anatomici. Casserius rectos pro pluri-
us habet, & rectè: quorum ut plurimū
quatuor sunt utrinque; atque ita ut plu-
rimum *sedecim sunt musculi abdominis* ad
minimum & *rarius quatuordecim*, quando
recti tres tantum sunt utrinque: *aliquando*
etodecim; quando *rectorum* quinq; utrinq;
aperiuntur.

Primum par oblique descendens ita dictū
ob fibras, quæ oblique descendunt à par- *Oblique de*
te superna ad infernam; totum sui lateris *scendentis*
abdomen obvelat, cum maximum sit & *principiū,*
latissimum.

Oritur in pectore ex infernâ parte sex-
æ, septimæ, octavæ & nonæ costarum,
antequam in cartilagine desinant; &
oritur quidem variis principiis triangula-
ribus seu pinnis, quæ postea in unum co-
alescunt. Singulis verò pinnis ex intersti-
tiis suarum costarum singuli nervi por-
riguntur. Deindè oritur etiam ab apice
transversorum processuum vertebrarum
lumborum. Adeò principium eius latè
diffusum est, videlicet à sexta costa ad i-
mam lumborum vertebram.

Definit in abdomen medium, ubi ap- *Finis.*
paret linea alba, & os pubis, & definit
quidem in latum tendinem currentibus
eò infinitis fibris obliquis.

C 5

Est

*Linea alba
quid.*

Est autem LINEA ALBA, cui aliquando pinguedo adjacet, concursus tendinum musculorum abdominis, exceptio rectorum. Nam tendines obliquorum uniuntur & ita coeunt ab utraque parte, ut quasi tunicam abdomini obductam forment; vel quasi unicus esset tendo.

Alba est, quia carnis expers, procedens mucronata cartilagine ad ossa pubis: estque infra umbilicum angustior quam supra.

Musculi hi duo oblique descendentes perforati sunt 1. ad umbilicum. 2. ad inguina, in viris, ut vasa seminalia exeant, in mulieribus, ut duo ligamenta uteri rotunda & nervea exeant, & in puellis descendendum prope nympham desinant.

Error Aquapendens, quam adhuc tueretur; eamque postea Laurentius tanquam novam & suam proposuit, reprehendens cunctos alios Anatomicos, quos miseris falsos ait. Vult autem hæc contraria opinio, hos musculos nominandos potius externos ascendentes, ut principium sit in superiore parte ossis pubis, ossis ilij, & transversis lumborum processibus; finis autem sit in costis. Probat ita.

Eorum ratio.

1. Musculum debere oriri obgeniat aliquo quiescente & immobili, ut est ossis pubis in respectu ad costas.

Resp. Costæ sunt quiescentes respectu
lineæ albæ.

2. Ajunt musculum trahere principi-
um versus, & quia obliquè descendens,
respirationi inservit, trahere costas pu-
erum versus.

Refutatur.

2.

Resp. Respirationi non primariò infer-
vit hic musculus, ut infra agetur.

Responsio.

Nostra verò sententia, quæ Galeni est,
probat.

Ex ingressu nervorū, qui circa principiū.

2. Ex ductu fibrarum, quæ eunt hic ab
nitio ad lineam albam.

3. Fatentur omnes esse concursum ten-
dinum etiam obliquè descendendum in

lineam albam. Ergo ibi finis.

4. Ex actione communi probatur, de
qua infra.

Secundum par est OBLIQUÈ ASCEN-
DENS, habēs fibras cōtrarii situs: proxi-
mè substernitur, & figurā habet triquetra.

Principium est à costa ossis Ilii, & à pro-
cessibus transversis vertebrarum lumba-
rium, & à spinis ossis sacri.

Fine adnascitur carnosio nōnihil singulis

costis nothis, & veris nōnullis, reliqua ve-
rò sui parte finali paulatim abit in tēdinē,

& quidē duplicē: una pars supra rectos mu-
sculos vergit, altera pars infra: ut rectus
quasi in vagina sit repositus, sed propè
lineā albā reunitur, & in eadē inseritur.

Oriri supe-

rius non in-

serius hos

musculos-

probat.

Principiū

obliquè

ascendentē

um.

Finis duplū

catu.

Recti unde *Tertium par* **RECTORUM** est, ob re-
oriantur. *ctas fibras.* Statuitur vulgò hoc par tan-
 tum unum esse.

Initium rectè Galeno in pectore est
 carnosum ab utroque latere cartilaginis
 ensiformis à sternone, & à quatuor costa-
 rum notharum cartiliginibus: tendine
 in os pubis *finitar.*

Alij econtrà hìc in osse pubis volunt es-
 se initiũ, & superiùs finem. At Resp. 1. Re-
 cti in superiori parte accipiunt nervos
 2. musculus nò solet habere tendinosum
 principium, & finem carnosum.

Inscriptiones habet rectus musculus u-
 plurimum tres in mediæ staturæ homini-
 bus, nonnunquam quatuor in proceris
 quibus abdomen longius.

Sed secundum inscriptionum multitu-
 dinem statuimus cum Casserio esse plu-

Rektor plu- res musculos, Quia

res esse mu-

sculos, pro-

batur.

1. Ad quodvis internodium nervus ac-
 cedit:

2. Si unus esset, contractus in se non
 posset æqualiter omnes partes comprime-
 mere.

3. Nullus talis esset musculus in toto
 corpore, in quo tamen multi sunt longi
 sine tali inscriptionum numero.

In internà rectorum superficie sũt *du-*
vene conjugatæ, cum totidem arteriis.

Superio-

Superior oritur à venâ cavâ, clavibus *Vena.*
 adjacentibus, cujus ramus quidam insigni-
 ber ad mammas pergit, & sub recto mu-
 sculo ap regionē umbilici usq; excurrit,
 ubi terminatur.

Huic obviam it altera, quæ in mulie-
 ribus ab utero, in viris à vena cava ori-
 ur, & sursum pergit ad superiorem ve-
 nam, quam antequam attingat, ut pluri-
 mum oblitteratur. Nonnunquam tamen
 æ duæ venæ conjunguntur manifestis-
 na stomosibus, id est, extremitatibus se
 contingunt. Hinc consensus mammarum
 cum utero putatur, abdominis cum na-
 ribus. Nam in nariū hæmorrhagiâ abdo-
 mini affigimus Cucurbitulas.

Arterias accipiunt recti ab Epigastrica: *Arteri:*
 Nervos ab extremis thoracis vertebra *nervi.*
 prodeuntes.

Quartum par PYRAMIDALES muscu-
 li incumbunt rectorum infimis tendini-
 bus. Nec sunt rectorum partes, ut putant
 Vesalius & Columbus, sed distincti mu-
 sculi, ut probat Fallopius, licet rationi-
 bus quibusdam validis, quibusdam in-
 inibus. Esse verò peculiares musculos in-
 de liquet 1. quia mēbrana peculiari vesti-
 untur. 2. fibris non conveniunt cū rectis.

Oriuntur ab osse pubis, ubi etiam nervi
 ingrediuntur: & quanto longius ascen-
 dunt,

dunt, tantò fiunt angustiores, donec apice acuminato in transversus musculi tendinem definant. Et ex hoc loco observavi aliquoties gracilem & rotundum tendinem produci usque ad umbilicum.

Vsus pyramidalium est rectos juvare in compressione subjacentium partium.

Hinc prout validiores sunt tendines rectorum, ita modò defunt. (quod rarum) pyramidales, modò adsunt robusti, modò tenues, modò unus tantum. Bauhinus ait: Si absint, tum vel caro rectorum capitibus juncta, vel adeps eorum vicem gerit. Et alij volunt, esse quasi stragulam quædam tendinum musculorum rectorum.

Fallopheus vult, pyramidales, vesicam dum mingimus, comprimere ad excretionem urinæ. Contra Aquapendens vult, quod se attollant ac elevent, & unâ subleventur abdomen atq; peritonæum, ne remanentur nimis subjectæ partes. Affingit autem Fallopheus Columbus, ac si statuisset erectioni penis inservire hos musculi.

Quintum par TRANSVERSI situ infimi oriuntur à ligamento quodam ex osse sacro prodiente, & musculum sacrolumbum regente, deinde ab infima costa & ab osse ilij.

ij. *Finiant* membranoso tendine in linea albam, contumaciterque adhærent peritonæo. Horum peculiaris *usus* est comprimere.

ACTIO omnium musculorum abdominis est quasi duplex.

1. *Æquabilis cōtentarum* in abdomine partium compressio: nam omnes simul agunt, adiuvante diaphragmate.

3. Quæ hanc sequitur, excretio superiorum. Et quia partium comprimendarum magnus est numerus, ut intestina, *Cur musculus* vesica non sufficit unus musculus *li abdominis*, sed plures in diversis locis agentes, *nis plures*. secundum varios angulos: rectos, transversos, obliquos. Habet quidem quæ *Præoccupat* pars vim expellendi; sed partes quæ *tio*. quæ sunt, & sæpè multumque onerantur, indigent horum musculorum auxilio, ut cum fit expulsio excrementorum, vermium, urinæ, foetus, molæ &c.

Hæ veræ sunt actiones, quæ parent ex thoracica. Sed natura abutitur aliquādo his musculis ad thoracis motus, quando magna & violenta expiratione opus est, ut in clamoribus, tussibus &c. tum enim thoracem non parum constringunt.

U s u s.

Vsu. Sunt calidi & humidi temperamēti, quia caro prævalet in iis : ideo *foventur* calorem & coctionem : Moderatè crassi : idē tuentur partes, suntq; iis propugnaculo etiam quando quiescunt : item, ad formatiōem conducunt : hinc deformes sunt obesi, hydropici, graciles &c.

CAPVT VII.

DE PERITONÆO.

Peritonæū unde dicatur.

Ablatis omnibus musculis abdominis in conspectum venit PERITONÆUM subiacens, & intestinis obductum, dictum à circumtendendo, quòd circumtendatur partibus quæ inter diaphragmum & crura sunt.

Peritonæū quid.

Est autem PERITONÆUM membrana viscera inferioris ventris investiens.

Membrana est, & quidem satis tenuis atque mollis, ne oneri sit, sed valida & densa, ut laxari distendi que possit : Crassior est in mulieribus ab umbilico usq; ad pubem, ut in gestatione fœtus distendi magis possit : in viris præsertim crapulæ addictis crassior à mucronata cartilagine ad ambilicum, ob ventriculum putatur.

Alii volunt Peritonæum esse ex ligamentosa & nervosa substantia. Alii ex fo-

nervis, alij ex folis ligamentis, alij à
meningibus cerebri.

Figura Peritonæi est ovalis. Est enim in-
vesicæ vel ovi oblongi. Nam infe- *Magnitudo*
rem ventrem totum succingit; ideo *40.*
sic longitudine & latitudine responder.

Superficies eius est intrinsecus leviga-
& velut humore oblita, ob intestina,
æ tangit; extrinsecus fibrosa, & nō
nil aspera, ut connectatur cum mu-
lis.

Ortam habet ad spinam ad lumbo-
m vertebra primam & tertiam, ubi
fissus est peritonæum, unde ibi non
rumpatur, separari potest.

Connectitur etiam superius diaphrag-
ati arctissime, (unde eo inflammato
pochondria sursum convelluntur) in-
us ossi pubis & ilij, anteriùs lineæ &
& transversorum muscutorum
adinibus,

Est autem ubique *duplex* (Laurentius *Peritonæi*
rō cum Cabrollo omnes membranas, *duplex.*
am piā matrē duplices facit) quod ta-
en maxime circa spinam apparet: su-
a umbilicum ita firmiter cohæret, ut
scerni nequeat: at ab umbilico ad pubē
manifestē dividitur in duas tunicas, ad-
distantes, ut in earum capaci duplici-

D

rati

tate vesica contineatur, quod paucis ob-
servatum: idq; in hunc usum. 1. Ut it-
sit robustior membrana, ubi gravatur
2. Ut vasa umbilicalia illic, excurrenti-
tutius feratur; nam hæc peritonæum du-
plicatum permeant. Quare etiam

Perforatur peritonæum anteriùs in fo-
tu, ubi umbilicus est: Deinde *supernè* fo-
ramina habet, ubi diaphragmati conn-
scitur, ad transitum vasorum. Malè ergo
Fernelius contra Galenum negat Perito-
næum habere foramina.

*Fernelij
error.*

*Foramina
quot.*

Sunt hæc tria: Primum, ubi transit
est venæ cavæ. Secundum, ubi transit
est stomachi. Tertium, ubi transit arteria
magna & nervi sextum par per diaphi-
gma. *Infernè* circa anum, cervicem ve-
cæ & uteri, vasaque ad crura abeunt
ad peritonæum, abdominis musculi
& cutim.

Processus habet binos oblongos, ta-
quam fistulas vel canales laxiores in
ris descendentes in scrotum per foram-
na tendinum musculorum obliquorum
& transversorum: in quibus productio-
nibus, vel didymis, uti vocarunt veteres
vasa seminaria descendunt & recurrunt
atque propè testes processus hi magis
explicant, fiuntque testium tunicae.

Huius exterior tunica si dilata-

tur
i
nter

terior (quæ priori exactissimè adhæ-
rit, nisi juxta os pubis, ubi sejungitur) *Hernia*
impititur, hernia fit, prout vel intestinū, *causa.*

Omentum, vel utrumque illabitur.

Vasa accipit à vicinis diaphragmaticis,
hepaticis & epigastricis, aliquando &
renalibus. Nervos exiles ab ijs, qui
abdominis musculis porriguntur. Hinc
visu peritonæum præditum est, contra
quod putavere alij ante Vesalium, qui-
bus etiam refragatur experientia.

Uusus peritonei est qui membrana-
m in genere.

1. Partes continere, & hinc inde con-
nexiones mittere. Hoc maxime facit Pe-
ritonæum: nam omnia viscera infimi
ventris tegit & firmiora reddit; omni-
bus tunicam producit atque largitur,
quibusdam tenuiorem, prout usus po-
tulavit, quibusdam crassiore, ut ven-
triculo, intestinis, vesicæ, utero. Ab eo
etiam prodeunt duæ membranæ dupli-
cata; omentum & mesenterium. Perito-
næum etiam hoc facit, ut vasa in lon-
gum producenda, inter duas eius tuni-
cas excurrant.

*Peritonæū
mater tu-
nicarum
in imo ven-
tre.*

2. Claudere venarum orificia. Hinc
occurrit, si membrana non obduceretur, o-
mnia venarum eius in conspectum veni-
rent.

Lib. I. De
CAPVT VIII.
DE OMENTO.

Sub Peritonæo est OMENTUM quod
si operimentum, alijs zirbus, ret
vel reticulum, ob ductum vasorum ei
rabundum, Græcis ἐπίπλοον dictum a
innatando, eò, quod intestinis veluti in
natet. Nam omnibus animalibus

Omenti
fini.

Situm est ad ventriculi fundum, indo
que intestinis instratum, quorum anfr
ctus ingreditur, nonnullis ad umbilic
cessat, in alijs sæpè infra umbilicum pro
tenditur, & aliquando usque ad os p
bis, ubi inseritur: & quando interced
fundum vesicæ & uteri, os uteri comp
mi, & mulieribus sterilitas adferri put
tur, in viris autem epiplocele, quando
scrotum descendit.

Omenti
principiū.

Origines duas distinctas habet à Pe
tonæo, & est quasi duplicatum Perito
næum. 1. Ad ventriculum oritur, nem
eius fundum. 2. Ad dorsum & inte
num Colon; & nullum initium ali
cohæret. Hinc duos habet parietes, &
duas membranas, subtiles & leves (q
pondere gravent) sibiipsis incumben
Externam seu anteriorem, quæ alligau
exteriori membranz ventriculi ad f
du

im, & simæ lienis parti. Interiorem & anteriorem, quæ alligatur colo intestino, moritur sub diaphragmate, statim ad præteritum à peritonæo. Atque inter hos præterites cavitatem insignem habet: in qua nonnulli arbitrantur contineri naturalem spiritum.

Figura est marsupii aucuparii: nam superiorius orificium orbiculatum habet, inferiorius autem omentum rotundum est.

Magnitudo variat: nam in nonnullis hominibus ad umbilicum, in nonnullis præterius progreditur, ut antè dictum.

Hoc peculiare habet omentum præ aliis membranis, quod per substantiam, in qua plurimæ venæ spargantur & arteriæ, nervi verò exigui. Et ob venas multas, adipis multus in omento est: eiq; innu. meræ glandulæ interjectæ, quæ humorem feculentum depascuntur.

Vsus 1. Ob adipis copiam omentum, fovet & fovet calorem ventriculi, sed non sufficit; nam superior pars ventriculi fovetur ab incumbente jecore, fovet etiam calorem intestinorum, tanquam partium membranarum, & exsanguium. Hinc diator ille, cui Galenus omentum ablit, facile à frigore lædebatur, quare intrè lanis semper obvolutū habebat.

Est itaque omentum ventriculo infundibularis, & coctionem promouet.

2. Membranæ hunc usum præstare ut fulciant ramos venæ & arteriæ eunt ad ventriculum, duodenum, colon, lienem; deinde beneficio membranarum nascitur pinguedo.

CAPVT IX.

DE VENTRICULO

VENTRICULUS dictus quasi parua venter, est pars organica in infundibulo ventris sita statim sub diaphragmate, coctionis instrumentum.

Situs est in epigastrio, nullis ossibus circumdato, ut facilius distendatur. Quod quidem statim sub diaphragmate in infundibulo quasi corporis, spinæque incumbit. Pars verò sinistra quæ major, & ad se habens dum rotundior in sinistro hypochondrio est, ut cedat epati, quod in dextro latere, atque ita in æquilibrio quasi incumbit corpus: Dextram versùs paulatim inclinatur, ut cibus sensim eò protrudatur. Ex quo fundamento scitur, dormire cibum conducere primùm sinistro lateri inclinare eum habere usq; ad coctionis absolutionem: deinde de verò dextro; secus quàm vulgò putant.

Numero unicus est in homine & canis.

*Ventriculi
quot in pē-
natis &
ruminan-
tibus.*

us utramq; maxillam dentatam ha-
bentibus. In pennatis nonnullis duo sunt
ventriculi: unus membraneus, recipi-
ens tantum alimenta, ut inde ejciantur
pulli, cum alias pennatorum pulli
non nutrentur. Alter est carnosus val-
de & calidior, intus habens membra-
m duram, qua recipitur alimentum
durum. In ruminantibus, cornigeris, &
altera maxilla dentatis, quatuor sunt:
primo, reticulum, omasus & ab-
omasus; de quibus Aristoteles.

Orificia habet duo, & ambo quidem
in supremâ ventriculi regione.

Sinistrum vulgò superius dicitur, aliàs
ventriculi simpliciter, aliis Stoma-
chus ob amplitudinem; Vereribus cor,
quia eius affectus animi deliquia alia-
que symptomata Cardiacis similia gi-
gnunt, tum ob exquisitissimum sen-
sum, tum quia cor condolet per consen-

sum, & vicinitatis, & nervorum ab eo-
rum ramo prodeuntium. Orificium hoc
maius est, crassius & amplius, ut etiam ci-
um durum aut etiam semimansum ad-
mittat. *Situm* est ad vertebrâ thoracis un-
decimâ: fibras circulares carnosas habet, *lia.*

ut claudat orificiū, naturali instinctu, ab
assueto alimēto; ne fumi ascēdāt, cerebrū,
petāt, morbosq; generēt, & ita perfectior

D

fias

fiat coctio. Ita quoque illam operculo
ad retinendos fumos tegimus, ne decubi-
tu vario alimenta in os regurgitent. Per
hoc orificium cibus & potus intromit-
tuntur. Est autem adhuc in epigastrica
regione, estque vicinius spinæ, quàm car-
tilagini ensiformi: ideoque in eius affe-
ctu posteriori potius regioni, quàm ante-
riori applicabimus epithemata.

Orificium dextrum vulgò inferius distat
à fundo quemadmodum dextrum fere
Angustius est, & clausum manet, donec
cibi concoctio absoluta, hoc est, donec
bus in cremorem liquidum mutatus est.
Est nonnihil reflexum, & fibras trans-
versas habet, circulumque crassiores
circumjectum (alii vocant tuberculum
glandulosa) instar musculi orbicularis
vel Sphincteris. Dicitur piloros & junc-
tor, quia chylum emittit. Potest valde
dilatari, quemadmodum & sinistrum.
Hinc varia exempla testantur, sæpe de-
glutita fuisse per vomitum & secessum
jecta quæ oppidò magna fuere, ut annulus
aurei, nuclei, cultelli, lapilli, ferramenta
ranæ, lacertæ, serpentes, anguillæ integre
&c.

Fibrarum usus qui. Ventriculus *fibras* habet triplices:
rectas, obliquas & transversas; quæ putantur

facere ad attractionem, retentionem
expulsionem. Verum rectius fortè a-
statuunt conducere fibras ad robur &
mitatem, quemadmodum in telà for-
plura solent intertexere : præfer-
cùm aliæ partes multæ absq; fibris
usmodi, attrahant, retineant, expellant.

Superficies extrinseca est lævis, plana
albicans: intrinsecus, quando ventri-
lus constrictus est, apparet rugosus &
nihil rubens.

Membranas habet triplices: primam
communem & externam à peritonæ-
atam, & crassissimam inter eas, quæ à
peritonæo oriuntur, quamvis alioquin
tenuis satis sit. Secundam Carnosiore, quæ
media est, & ad meliorem concocti-
onem quidem fibris carnosiss donata est.
tertiam Infimam & nervosam, in quam
asa terminantur, œsophagi, oris & la-
iorum tunica continuam: ut nihil ven-
riculo ingratum recipiatur, & quia in o-
cibi fit præparatio. Hinc quando in
ventriculo bilis, communicantur linguæ
amaritudo & flavedo: e contra etiam o-
is & linguæ vitia œsophago & vtriculo.
Rugosa est hæc tunica, ut dilatari melius
possit. Rugas verò habet ob crustam
carnosam sibi adhærentem, ut melius ab

*Cruſta in
ventriculo
unde.*

ingestis durioribus defendatur. *Cruſta* illa ſtatuitur eſſe ex excrementis tertiæ coctionis ventriculi: eſtq; ſpongioſa, habet meatûs veluti fibras breves, ab infimæ ſuperficie ad extimam; ut pars chili tenuior penetret, & à venis exſugatur.

Ventriculi ergo ſubſtantia cum membrana ſit & frigida, calore iuvatur vicinarum partium. Nam dextro lateri ſuperjacet epar & etiã mediæ parti; e enim adhuc epar ſub fovea cordis: ſiniſtro adjacet lien; integitur ab omento pingui: ſubtus eſt pancreas; adjacent etiã diaphragma, colon, truncus venæ cavæ, & aortæ.

Connectitur ventriculus in ſiniſtra parte diaphragmati (non ſpinæ) orificio ſubſtantiâ nimis repletus, impediēde diaphragmatis motû, diſpenſâ parit. In dextrâ duodeno jungitur, altero orificio ſeu piloro.

Ad ventriculum in ſiniſtro latere ſub diaphragmate inſignis formatur cavitatis membranâ inclufa, partim à ventriculi, partim à diaphragmate, partim ab omento. De hac cavitare intelligendus locus Hippocratis ſect. 7. aphoriſmo 54.

Figura eſt rotundè oblonga, & ſimilis tibiæ utriculari, præcipuè quando curvatur duodeno & œſophago cōſideratur. Acriùs equaliter gibboſus eſt ventriculus.

pon

sterius, dum in corpore latet, duos gib-
bos habet: dextrū minorē, & sinistrū ma-
iorem, inter quos mediat dorsi vertebrę,
truncus cavę atq; arterię descendens.
Magnitudo variat. Nam in gulosis &
potatoribus major est, ita, ut cūm turget,
quasi nudus tactu deprehendatur. Est e-
nim dilatatus valdē, ideoq; tenuior in-
potateribus, in quib. nōnunquā adeo atte-
nuatur, at corrugari amplius nequeat,
inde imbecillitas diuturna. Dilatatum ad
umbilicum usque pervenire vult Co-
lumbus, & cum copiā nimīā turget, et-
ā longiūs progredi censet Archangelus,
ut contractus & corrugatus in sobriē vi-
vētib. crassus est, & sub epatē occultatur,
Cognoscitur autē magnitudo vētriculi 1.
ex magnitudine oris, Qui n. oris sunt ma-
gni, ij & voraces, sed insimul audaces &
magnanimi, 2. Si à cartilagine cartiliformi
usq; ad umbilicum longius est spatium,
quā faciei vel pectoris. *Vasa* plurima re-
cipit. *Venas* à liene vas breve, quod inse-
ritur nō in os eius, sed in fundū, ibiq; in
eius tunicas se ingerēs, inter illas sursum
quidē, orificiū versō repit, sed antequā id
attingat, obliteratur; In quibusdā præ gra-
cilitate nō cōspicitur, in quibusdā planē
deest. Quia ergo in fundū inseritur, nō fa-
ciat ad appetitum sanguis acidus ibi e-
jectus.

An ad appetitū vel coctionem faciat sanguis ex liene rejectus. rejectus, uti volunt. Alii autem volūt, excrementum Melancholicum, quod transmutari non poterat in liene, in ventriculum per hoc vas deferri, ut acerba & acida sua vi ventriculi coctionem promoveret, cibosq; justo tempore morari faceret. Verū impediretur potius coctio alieno humore excrementitio ingestis. Deindē à vena portæ venas accipit ventriculus, sanguinem deferentes pro nutritione, quemadmodum in fœtu. Et

An nutritur ventriculus chilo, an sanguine.
64.

gō ventriculus non nutritur chilo, sed sanguine. Vna vena insignis est, quæ fundum ventriculi perrepat, sed cum non planē tangit, ne à valde extenso ventriculo metus ruptionis esset; sed ramospargit ad ventriculum multos: quod vult Aqua pendens tenuiorem & subtiliorem partem exsugere, antequam ad epipar chylus deveniat. Et videtur suaderi posse hęc opinio 1. quia aliàs non potest reddi ratio tam citi transitus, quando ij, qui nimium bibere, statim illud incopia emingunt. 2. aliàs rumperetur fere ventriculus, cum nimia sunt ingesta. 3. ideo citissimē virium refectiones ex vino odorato, jusculis alijsq; assumtis confortantibus. In fundum vētriculi inquit busdam hominibus meatus fellei pars inseritur: sed hic error naturæ est. Unde bilis

his vomitioni obnoxii sunt tales; sunt
nim biliosissimi: quales observarūt Ga-
lius, Vesalius, Fernellius & Casserius.
dicuntur *πικρόκολοι* αἰώ.

Arterias quoque accepit ventriculus
vitam, quæ venas comitantur. Nervos
à sexto pari, ad orificia geminos, à ra-
is, qui recurrentes & pulmonibus atq;
ricardio prospexerunt, qui, quia mol-
, & longum iter conficiunt, membra-
s robustis obducti sunt, Et ita se inter-
cant, ut obliquè, adeoq; tutius ducan-
r. Dexter oris ventriculi partem anticā
sinistram cingit. Sinister posticam &
extram. Quia ergò ita orificium invol-
tur nervis, ac si ex solis nervis compo-
tum esset, hinc valdè sensile est orifici-
um hoc ventriculi: nam ibi sedes appe-
tus & fames animalis esse debuit: quæ-
admodum partē eam contrahi & quasi
corrugari sentiunt valdè esurientes. Ra-
ni nervorum ex his quoq; deorsum mit-
untur ad fundum usq;. A sinistro nervo
bit propago, secundū supremā ventri-
uli sedem ad pylorū, quem aliquot ra-
nis implicat, & jecoris cavum accedit.
Ilij etiam duo nervi adeunt ventriculi
undum à sexto pari, à ramis juxta costa-
um radices ductis. Quamobrem mirum
non est, quod percussio & affecto cerebro
ventricu-

ventriculus turbetur, & vomitiones fiat
maximè in hemisphæria. Atq; vicissim ma-
lè affecto ventriculo, cur animalis facul-
tas langueat.

Actio ventriculi est *coctio*. quæ Chyli
ficatio dicitur. Est n. ventriculus conco-
ctionis primæ organum, cuius coctioni
principium & præparatio fit in ore, me-
dium in fundo ventriculi, finis in intesti-
nis tenuibus. Perficitur hæc coctio calo-
re, nō ventriculi tantum, sed etiam adju-
centium partium; nec non ingenita quæ-
Coctio quo dam cuiuslibet animalis ventriculo fi-
modo fiat. cultate. Vertit autem alimenta in chylum
album, & sibi similem, dum utroque
orificio probè clauso seipsum contrahit
& arcte complectitur, quæ ingeruntur.
U s u s est cibum & potū recipere, quod
fit ob cavitatem eius insignem & amplam.

CAPUT X.

DE INTESTINIS IN

genere.

Intestina
quid.

INTESTINA sunt corpora oblonga, re-
tunda, concava, variè circūgyrata, con-
nuata cū pyloro usq; ad podicē, pro chilo
excipiēdo & excrementis primæ coctionis.

Vnde di-
ct.

Nomē habēt, quia in infima corporis sedi-
sunt, uti & Græcis quib. *ἐντερά* dicuntur
barbaris chordæ; unde fides quoq; quia
sūt ex arescētibus intestinis, chordæ dicūtur.

Magnitudo quoad capacitatem cavitatis

& substantiæ crassiciem non est eadē,
postea dicetur. *Longitudo* ut plurimum
sexies plus minus superat longitudinem
termini cuius sunt: quam ob causam
Gyros acceperunt sive anfractus & con-
volutiones, exceptis principio & fine, ne
ingressus & exitus impedirētur. Et gyros
quidem habent in hunc usum, 1. ne ali-
mentum statim elabatur, nondum perfe-
cta facta coctione. Deindē ne nondum
soluta chili distributione, si statim ela-
beretur, aliud mox alimentum assumere
cogamur, & ita ob voracitatē a negotiis
impediamur. Hinc animalia, quò rectio-
res ductus habent à ventriculo ad anum;
magis gulosiora sunt: quò convolutiores, eo
continentiora. 3. Ne crebrius deicere
excrementum necesse sit, ut in animalibus vo-
racibus: quandoquidē in anfractibus illis
magis delitescere possunt excrementa.

Sita sunt in infimo ventre, cuius ma-
giorem implent cavitatem: *Connectuntur*
per mesenterium, quo & omenti interven-
tu colligantur dorso, & in ossibus illi cavitati-
bus fulciuntur. *Substantiam* habent mem-
branosā, uti ventriculus; ut distendi pos-
sint à chilo, fecibus, & flatibus. At crassior
est substantia in crassis; & quando magis
ad finem vergunt, eo crassiora fiunt, ut
finis coli, & rectum intestinum.

Substantia hæc in tres tunicas potest divi-
vidi:

*Vsus gyro-
rum.*

vidi: 1. propria & interior, in tenuib. intestinis rugosa est, in colo expansa in cellulas, alioquin nervosa satis. Eam *crusta* quidam quasi membranea succingit, ex intestinorum tertia coctionis excrementis gignita, ne Meseraicarum ora obstruantur. ne eadem cum tunica interiori callosa perpetuo chili transitu reddantur. *Secunda* etiam propria, quæ media, valida est, & bris carnosus donata. *Tertia* communis & exterior, nata immediatè ex membranis mesenterij, mediatè verò à peritonæo. Inter duas proprias illas inferior sapè læditur in dysenteria, illas altera.

Fibras habent non tantum transversas, uti vulgò putatur, sed omnis generis: Iam obliquas, media tunica transversas fibras habet. Rectæ fibræ, quæ ad transversarum tutelam datæ sunt, pauciores sunt in tenuibus, in crassis plures, præsertim in recto, quod robustum esse debet ob collectionem excrementorum durorum.

Pinguedine extrinsecus obducuntur in testina intrinsecus moco, ut feces hac bricitate facilius transeant & sensus in intestinis fiat habetior. *Vasa* habent, venæ à porta, quæ Chylum deferunt ad epar, & hoc vicissim sanguinem afferre putant per nutritionem. *Arterias* à Cæliaca quoque habet ad vitam, quæ motu suo præservat à putredine. *Nervos* à sexto nervorum pari. *Di-*

Dividuntur communiter intestina omnia in tenuia five gracilia, & crassa seu p^{ro}p^{ri}a. Licet enim unus continuus ductus, magnitudine, numero anfractuum, substantiâ, situ, figura & officio, plura esse dicuntur.

Tenuia ob membranarû tenuitatem ita dicta, sita sunt partim supra, partim infra An intesti-
umbilicum, adeoq; umbilicalem regio- na tenuia
m juxta & hypogastrium occupant, se- recte dicā-
s quam in canibus. Unde veteres ex- tur supe-
mplo canum, tenuia vocarunt superio- riora.
crassa inferiora, quod in homine fal-
m. Nam in eo plus est ex crassis supra
umbilicû, & plus ex tenuibus infra, cum
quod longius, sit infra; jejunum, quod
eve, supra. Atq; ita omnia tenuia in me-
regione sunt, circa umbilicum, i.
ia nobiliora. 2. ut viciniora sint cen-
mesenterij, adeoq; proximè à mesen-
rio venas & arterias capiant, sangui-
m; citò epati advehant. Sunt au-
tenuia intestina tria: Duodenum, Je-
num, & Ileum. Atq; hæc chilum perfic-
unt & distribuunt: quia ob angustiam
ævis pars chili tangi potest, ab eorum
ica & vasis.

E

Crassa

Crassa ita dicuntur, quia crassiores tunicas habent, & crassam chili partem continent: pro facibus colligendis & nonnihil retinendis facta sunt. Sunt tria: Cœcum, Colon, & Rectum. Sunt ad latera tenuium, quæ quasi circumvallant, sita, ut cederent tenuibus, & ne ha-
abiis premerentur.

Ufus omnium intestinorum est ut sint instar terræ, ex qua Mesaraicæ trahant fugantq; chilum. Tenuium verò usus est, transitu chilum ulterius coquere, eum distribuere. *Crassorum*, chili reliquias e crementitias seu fæces continere; ite flatûs, & bilem ab epate venientem.

CAPVT XI.

DE INTESTINIS
IN SPECIE.

Primum tenue intestinū cui Panc-
as subjacet: præsertim in canib
dicitur, DUODENUM, (Gal.
Φυσίς, Herophilo δωδεκάδακτυλον, a
duodecim digitorum longitudinem
beret; quæ tamen hodie in nostris c
pusculis non reperitur.

Prodit in dextro latere à pylor
spinam versùs, sive sub ventriculo,
lumborum vertebris per ligamenta
branosa junctum, descendit rectà abs
circumvolutione, & terminatur, ubi
fractus inchoantur.

Cra

Craſſius eſt reliquis tenuibus; ſed anguſtiori cavitare, ne, confertim chylus deſcendebatur.

Secundū IEIUNUM dicitur, quia ut plurimū vacuū eſt, præſertim in ſectionibꝫ.

1. Ob copiam & magnitudinem meſaraicarū, quæ ibi infinitæ quaſi ſunt, ſtatim maiorem chylī partem exſugentes.

*Ieiunum
cur vacuū*

2. Ob liquiditatem tranſeuntis chylī.

3. Ob epatis vicinitatem.

4. Ob bilis acrimoniam. Ingreditur enim ad huius inteſtini principiū ſeu ad duodeni finē porus bilarius, à jecore advehens bilē ad excitandā expulſionem.

Tertium ILEON dicitur διὰ τὸ εἰλεῖσθαι à circumvolvendo, unde & volvulus dicitur, ob circumvolutiones plurimas, ad cibi moram facientes.

Oritur ſtatim à jejuno, ubi pauciores Meſaraicæ inferuntur.

Finit ad Cœcum. (trinq;

Sitū eſt ſub umbilico ad Ilia & coxas u-

Longiſſimum eſt inteſtinū, viginti unum palmos admodū æquans: latū eſt unum digitum. Iejunum verò non adeò longū eſt, nempe duodecim vel tredecim palmos circiter, & latum digitum parvum, niſi infletur. Et ſicuti Ileon ſub umbilico eſt, ita jejunum totū ferè ſedem ſuprà umbilicum occupat, cum plurimis ſuis circumgyrationibus.

Ileon

Hernia.

Passio iliaca.

Ileon hoc tatummodo in scrotum delabi potest, unde hernia intestinalis. Et in hoc intestino volvulus fit sive Iliaca passio, in qua vomitus ut plurimum sterco-
ris est.

Primum crassum intestinum dicitur
CŒCUM

1. Obusum obscurum, quem habet in adultis, verum in fœtu excrementa recipere dicitur.

2. Quia unum tantum foramen habet, unde & *μονόκολον* dicitur.

Est enim appendicula quædam parva instar vermis oblongi, quæ orta ex initio coli & fine Ilei substantiâ satis *crassa*, jungitur reni dextro, peritonæo mediante, & à mesenterio maximè est libera.

Longitudo est quatuor digitorum, *latitudo* pollicis, sed angustissima est *capacitas*.

Intestinum
cæcum
antiquorum.

Veteres per cæcum intellexerunt globosam & capacem partem ad principium coli, & hinc etiam Galenus dixit usum cæci esse colligere ex chilo, quod omiserunt mesaraicæ.

Secundum crassum dicitur COLON, quod ἀπὸ τῆς περιστροφῆς derivant à torquendo, quod in eo fiant tormina colica.

Situs ejus varius est, nam *principium* ejus
quod
v

mod capacious & rotundum, est in dextro
dio à cæco ortum, ad renem dextrum, *Coli pro-*
ni adhæret; deinde sursum reflectitur *gressus.*

do epate, ubi folliculo fellis nonnun-
nam nequitur, & ab eo luteo colore in-
scitur: ulterius pergit transversim sub
ondo ventriculi, & à sinistris lieni jun-
membranis tenuibus, deinde reni
sinistro alligatur, & in rectū rectā *desinit.*
circundat ergo quasi totum abdomen,
modo ascendit, modò descendit, (hinc
communiter alvum exonerantibus u-
am dejectionem sequitur altera, ut di-
tius fæces contineantur, nec confertim
fluant, nec semper necessum sit al-
um exonerare. Quò facit etiam ejus
magnitudo & cellulæ. Nam

Longum est communiter palmas octo
el novem; *latissimum* verò & amplissi-
um omnium.

Cellulas accepit, ut diutius in iis conti-
eri possit, & diutius excoqui etiam du-
iusculum aliquod non benè prius co-
tum, & tandem per mesaraicas, quæ ad
olon copiosissimè vehuntur mitti pos-
it materia cocta ad epar. Et ne cellulæ
dissolvantur, atq; , ut in se collectæ
fficiant cavitates per intervalla majores
& minores;

E 3 *Ligao*

Ligamentum à paucis descriptum vel *vinculum* quoddā, medii digiti latitudine per eius mediū parte superna intexitur. Deinde ob amplitudinem *duo* ligamenta fortia habet, unum sursum alterum deorsum, ut supernis & infernis partibus alligetur.

Valvula

Bauhini in
colo.

Ad coli initium apponitur *valvula* crassa & membranosa satis à Bauhino inventa, sursum spectans, non deorsum ut scribit Laurentius; nam excrementa ex ileo in colon ascendunt, non descendunt, ob situm.

Quomodo

invenitur.

Invenitur hac viā: per rectum infusa aqua vel flatus in ileon pertransire non quit, nisi violenter: sed ab aqua non nihil labefactatur.

In ejus figurā & numero non consentiunt autores. Missis enim iis, qui eam plene negant; Bauhinus unicam statuit, figuram unguis habentem. Archangelus ait ad cœcum esse valvulas tres uti corde deorsum spectantes. Nos in plurimis cadaveribus Pataviæ eā quæsi vimus & semper invenimus: verum unicam quidem formā orbiculatā & circularem.

Ufus est, ne ex crassioribus intestinis in tenuia aliquid remeet aut regurgitet ex stercore vel flatu, præsertim in valvulæ excretionē, aut etiam in alvi constri-

tioner

rone: unde postea vomitus stercoris sequi posset. Hinc materia Clysmatum ad tenuia naturaliter pervenire nequit.

Ultimum crassum *RECTUM* dicitur, pro rectum ductum (Barbaris longanon) in anum desinit: pergit enim recta descensum à summo osse sacro ad extremum occygis, quibus *connectitur* firmiter per peritonæum, ne decidat: *connoscitur* etiam peni in viris; cervici uteri in mulieribus, musculosâ mediante substantiâ. Unde harum partium consensus in viris & mulieribus; præsertim in his uteri & intestini, nam intestino exulcerato, sæpe excrementum per pudendum rejicitur.

Longum est, quasi palmum unum cum dimidio, *latum* tres digitos; & corpulentum ac *crassum*, habens pingues appendices, exterius adnatas.

Eius finis dicitur *PODEX* vel *ANUS* tres habens musculos; ex quibus fortè *De Ano.* quinque constitui possunt.

1. Dicitur *Sphincter*, vel Ani constrictor; orbicularis circumjicitur ano in *Sphincter* star annuli satis lati: ita ut licet pars ejus aliqua in fistulis vel aliis affectibus abscindatur, non ideò totus ejus usus penitus tollatur.

Cum Galeno Fallopius & alii duos faciunt ex hoc musculo, quia pars ejus

superior est crassior; pars inferior cuti inseparabiliter annexa, ut in fronte fit & palpebris, ideo hanc partem cuticulosum musculus, vel carnosam cutim vocavit Galenus.

Oritur ab inferioribus vertebrae ossis sacri, & fibris transversis circumjicitur longo ani spatio.

Connectitur Anteriùs 1. vesicæ meatui per fibrosos nexûs. 2. Peni, cujus musculis dat originem. 3. Collo uteri. *Posteriùs* ossi coccygis subjecto. *Ad latera* per ligamenta ab osse sacro in os coxæ producta.

Uusus est, constringere anum, nè nisi volentes fæces excludamus. Ideo resolutus vel aliter læsus, facit fæces invitis hominib. excidere: sicut læso Sphinctere vesicæ lotiû involuntariè effluit.

*Ani muscu-
li levatores.* I I. & II I. *Duo alij* in Sphincteris superiore partem habent insertiones admodum cum eâ commixtas. Dicuntur *Ani levatores*, quia

Uusus eorum est, anum sursum retrahere in suum locum post excretionem præsertim magnis conatibus factâ. Unde ijs debilitatis aut resolutis, modò difficulter retrahitur podex, modò exteriùs propendens manet.

Sunt hi musculi sub vesicâ, lati & tenues

muscles, orti à ligamentis pubis, ossis sacro & coxendicis: unde deorsum feruntur ad partes anī tam dextram quàm sinistram, quas ambiunt.

Portionem verò quandam habent peculiarem & distinctam, radici penis & collo uteri adnatam, quæ tertius & distinctus musculus statui potest,

CAPVT XII.

DE MESENTERIO.

MESENTERIVM dicitur, quod sit in medio intestinorū, non quasi medium intestinum sit, ut vult Cicero, sed intestina instar circuli & in orbem compactatur, colligat & vestiāt. Dicitur & *σαρξων*, Gaza apud Aristotelem vel Lactes.

Unum est: sed *dividunt* alii in Mesenterion sive mesenterium & *μεσσηρόλον*, quod in medio ventris est, & intestina tenuia connectit: hoc, quod colon connectit in dextro & sinistro latere, & te infima recto intestino adhæret.

Figura ejus circularis est ferè, & postquam in exortu angustum fuit, in profu ad circumferentiam degenerat in eas plurimas: in lateribus sit oblongū, fertim in sinistro, ubi ad rectum de-

E s scen-

Triples
pars me-
senterij.

scendit. Unde etiam Galenus triplex fo-
cit mesenterium: dextrum, sinistrum
medium.

Oritur ad primam & tertiam vertebra-
lumbarē, ubi a peritonæo fibræ membr-
næ producuntur, quæ in membran-
abeunt robustas, per quas *mesaraica* ven-
tenuissimæ & plurimæ paulatim in pa-
ciores & majores concurrentes dissen-
nantur. Eodem modo & arteriæ: Acci-
etiam nervos ab iis, qui a sexto pari-
starum radicibus exporriguntur, nec n-
a nervis venientibus a lumborū vertebra-

Habet interjectas glandulas ad sp-
implenda & calorem fovendum:
cumfunditur *adeps*, ut in Omento.

Glandularum *usus* 1. distributio
varias ramorum venæ portæ & arteri-
magnæ fulcire. Hinc circa centrum
senterij majores glandulæ, quia ibi
sorum & magis collectorum vasorum
distributio. Porro hæ glandulæ, si qu-
doq; schirrum patiantur; sequitur
cies totius corporis, quia premu-
occupant divaricationes ramorum
næ portæ, quo minùs per hos ferat-
berè alimentum. 2 Humectare inte-

Usus mesenterij est esse comm-
intestinorum vinculum, quo lumbi
vertebris annectantur. Membranæ

orò ejus duplicium usus est, ut per eas
sa tutiori ductu ad intestina abeant.

*CAPVT XIII.***DE PANCREATE.**

PANCREAS, ac si diceret totum car-
nosum, potius totum glandulosum
est, laxum & informe, & in pingviori
corpore tota quasi pinguedo videtur,
quæ cœnosa pinguedo & humiditas aliis
incitur. Aliis calicreas dicitur, item la-
tes ob candorem & molliciem.

Situs ejus est sub posteriore parte ven-
triculi, hujusq; fundo, duodeno & venâ
portæ, usq; ad regiones epatis & lienis.

Oritur verò ad primam lumborum
vertebram. In medio album est ejus *πα-
νκρυον*, habetq; venas, arterias, nervos
& glandulas.

Usus; 1. Fulcire vasa transeuntia, ut
ramos venæ portæ, arteriæ cæliacæ, &
nervorum; præsertim ramum splenicū.

2. Ventriculi coctionem, quæ in calido
& humido fit, juvare. 3. Ventriculo esse
instar subjecti pulvinaris.

*CAPVT XIV.***DE EPATE.**

Hæte-

HActenus de organis coctioni primæ vel chilificationi dicatis: nunc ad ea quæ secundæ coctioni sive sanguificationi quocunq; modo faciunt accessum facimus. Atq; in his primarium est epar.

Epar est pars organica in infimo venter statim sub diaphragmate sita, sanguificationis organum, & venarum principium.

*Epar cur
venarum
principium.*

Epan Græcis ab inopia dictum, quod subveniat partium indigentia, latinis Iecur appellatur, quasi juxta cor. Venarum principium dicitur, quia in eo apparent dispersæ radices duarum venarum maximarum cavæ & portæ, tanquam in terra aliquæ radicibus affusæ.

Numero communiter unum est, rariùs duo: Rariùs planè deficit epar.

Situm habet in infimo ventre sub felleo pto transverso (quod & Hippocrates & Aristoteles agnoverunt) ad costas, & quod ad majorē partem in dextro hypochondrio, digiti transversum ab eo distantia, & motus ejus impediatur: ideo epatis tumor dispnæam parit. Avibus in utroque latere æqualiter est situm: uti & felleo canibus gracilem & longum lieneri habentibus. In homine rarò mutatur situs, ut epar in sinistro, splen in dextro

conspiciatur. Incumbit autem levi-
 ventriculi parti anteriori, superiori,
 dextra; alias ad sinistram etiam
 ejus aliqua porrigitur. Aristotelem
 aliqui putant epatis situm ignoras-
 quia dixit: *ἡ δὲ τὸ διὰ ζῶμα* &c.
 illi interpretantur, supra septum
 im est epar. Verum Philosophus in-
 oratandus est: Trans vel ultra septum
 im est: nam id significat *ὑπὲρ* cum ac-
 ativo. At cū genitivo super vel supra.
 Atq; ob diaphragma, cui cedere de-
 figuram accepit superiorem & exte-
 m satis rotundam, convexam vel gib-
 æqualem & lævem, ubi etiam poste-
 ad venæ cavæ transitum sinus est ob-
 gus. Et ob ventriculum accepit figu-
 interiorem & inferiorem cavam, quæ
 ejus sima dicitur, estq; inæqualior,
 na duo sunt sinus: ad dextram unus,
 vesicâ biliaria; ad sinistram alter, pro
 situ stomachi. Estq; epar ad dextram
 læ rotunditatis, ad sinistram angu-
 & acutæ.
 dividitur epar à nonnullis in partem de-
 n & sinistram: inter quas mediat fis-
 parva, ubi umbilicalis vena ingredi-
 Alioquin communiter integrum est
 omine, verū in brutis dividitur plu-
 res in

*Epar in ho-
mine non
dividitur
in lobos.*

res in partes, quas lobos vel pinnas vo-
cant, quibus ventriculum ceu digitis te-
gi & contineri ajunt. Male ergo Galenus
in lobos divisum humanum epar voluit
quod tamen semel notavit Fernelius.

Magnitudo & crassities ejus est in ho-
mine insignis & maxima (uti & cerebrū
non tantū ob nutritionem, quemadmo-
dum in brutis; sed ob spirituum anima-
lium procreationem, qui dissipantur sæ-
pius (& ex vitalibus generantur, hi verò
ex sanguine) & magis ob varias in homi-
ne functiones. Majus tamen est in frigi-
dioris intemperiei corporibus, & in ti-
midis & gulosis, ut calor cordis augeatur.
In tabidis mortuis vidi modò epar maxi-
mum, & quadruplò quidem ac quintu-
plò majus solito, modò minimū etiam.
Et ab alijs inventum aliquando epar esse
minimum & perditum: lienem verò
majorem & robustiorem ejus officio
functum.

Membranâ cingitur tenui, ortâ ab al-
tera venaarum membrana, quæ à perito-
næo originem habet.

Connectitur per tria valida ligamēta
1. *abdomini* per venam umbilicalem, quæ
in adultis post partum arefit, & in liga-
mentum abit, ne διάφραγμα nimis pen-
dulum

Tulum fit, & deorsum nimis tendat. II. *Superius* diaphragmati à dextra parte per ligamentum latum membranofum, tenue; (sed tamen validum à peritonæo, quâ diaphragma succingit ortum, & hoc ligamentum suspensorium dicitur. III. Etiâ *superius* diaphragmati, sed à finistris per aliud ligamentum à peritonæo natum, teres & validissimum: *posterius* etiam, ubi cava transit, gibba parte peritonæo adhæret.

Substantiam habet rubram & mollem, vasis circumfusam, instar sanguinis concreti, unde *παρσυχυμα* dicitur, id est, affusio, quia affunditur vasis, & spacia inter hæc replet.

Color epatis sani rubicundus. In quibusdam ægris, ut hydropicis pallidū est valde, uti etiam splen & renes.

Vasa autem illa in epate sunt *radices venæ portæ & cava* (paucis interjectis arterijs & exilibus, magis albentibus, à cæliacâ per finiam partem dispersis; cum gibba à diaphragmatis motu ventiletur) quæ apparent distinctæ abstracta carne seu parêchymate epatis, quomodo ferantur hinc inde inordinate, inter quas etiâ disseminantur tenues furculi, in unū posteà porū euntes, & bilē ad folliculum deferentes.

Con-

Conjungitur autem cum radicibus portæ, ut ibi sanguis à bile segregetur. Sæpius portæ radices plures per imam partem hepatis hinc inde disseminantur, pauciores per summam: e contra cavæ radices plures per superiorem & gibbam partem, pauciores per cavam seu simam partem.

Anastomoses vel conjunctiones radicum cum venæ portæ & cavæ peculiariter sunt notandæ. Rejectis enim ijs, qui plerumque negant uniones harum venarum, aut qui obscurè eas cognosci putant: manifestum est diligenter inquirenti coniungi has radices modo per transversum, modo altera alteri quasi per mediū incumbas, modo extrema unius venæ tangunt extrema alterius, modò extrema unius tangunt medium alterius, modo se invicem non tangunt, fortè ubi rami hepatis tantum nutritioni inserviunt. Præcipue observandum monet Bauhinus Præceptor meus insignem anastomosin, quæ canalem æmulatur, & est veluti communis & continuus ductus, ex radicibus portæ in radices cavæ, stylum satis magnū admittens.

Per has ergò uniones radicum venæ portæ & cavæ sanguis transire potest: per has transit materia peccans, quoniam purgationibus habitum corporis evacuamus.

Verum

Venæ portæ radices paulatim versùs
nam partem sūt pauciores & majores,
nec in unum truncum abeant, qui ve-
portæ dicitur: sic etiam radices cavæ
perne & in anteriore parte in unum
unum coeunt, qui statim ad epar in du-
ramos magnos dividitur, ascēdentem
descendentem, atq; hinc dicitur cava
iri ex superiori parte seu gibba epatis,
portæ verò vena a sima parte.

*Ortus ve-
narum.*

Nervos habet epar à sexto pari duos;
um à Stomachico alterum à costali,
perfos tantum per tunicam ejus, non
r substantiam (sicuti vult Vesalius) ut
ofunditas ejus sensu careat in humo-
m tot motibus, Unde etiā dolores ibi
tusi & potius gravativi fiunt.

Actio epatis est sangvificatio. Ex chilo
im per mesaraicas attracto jecur san- *Sangvis-*
inem conficit; quod fit in ramis venæ *cationis lo-*
ortæ, tanquam in loco; *παρεγχυμα* ve- *cus, mate-*
epatis nō tantum vasa fulcit, ut qui- *ria ex qua,*
m volunt; sed efficiens est sangvifica- *& efficiens.*
onis: Una verò cum sanguine gene-
t naturalem spiritum.

Sangvificatio ergò ita fit, Chili in ven-
iculo facti, & in tenuibus intestinis ab-
luti pars inutilior & crassior in crassa
testina deturbatur, atq; per anum ex-
uditur, pars verò laudabilior & tenuior

F

à me

Quomodo
fiat sangvi-
ficatio.

à mesaraicis per intestina dispersis attri-
bitur, alteratur nonnihil & ab ijs vi-
epate advocatâ sanguinis rudimentū a-
cipit, & Chymus tum dicitur. Huius
chymi, quàm primum ad truncum ven-
portæ appulit, partem crassio rem spli-
ad se rapit, per ramum splenicū dictum
reliquum tenuius pergit per truncū ve-
næ portæ in hujus radices sitas in par-
concava epatis, in quibus tanquam in
eo fit sangvificatio, à parenchymate epi-
tis, sive rubra substantia, tanqua causa
ficiente, convertente materiam in san-
stantiam rubram, qualis epatis caro
Et carnis quidē epatis vis atq; efficacia
cile subit ob tunicam hoc loci tenui-
mam radicum venæ portæ, per quam
etiam pars sanguinis jam confecti efflu-
ditur in epatis substantiā pro nutritio-
reliquum verò per anastomoses in ean-
radices expellitur, ubi magis sangvis
boratur & perficitur. Interea ut supra
ctum, bilis extrahitur à sanguine per
culos in folliculū fellis & porū bilari
desinente. Serū verò ob tenuitatē re-
netur nonnihil ut facilius sangvis ubi
permeare possit: postea verò serū partem
ad renes amandatur, & hinc per ure-
res ad vesicam, unde postea urina, partem
ad cutim abit & exit per sudores inferi-
lesq; transpirationes.

CAPVT XV.

DE bilis receptaculis, nempe
FOLLICULO FELLIS, &
CANALI BILARIO.

In dextrâ & cavâ parte epatis, pro du-
plici bile recipiendâ, tenui & crassâ,
duo meatus sunt insculpti: *Vesica biliaria*,
& *canalis biliaris*, qui *πρωτοὶ χοληδόχοι* di-
cuntur. Agnovit hoc Galenus ipse, cum
ab epate expurgari, biliosum excre-
mentum duplex: impermixtum & sin-
gulum, deinde permixtum & crassum.

VESICA BILIARIA seu folliculus *Vesica biliaris*
κυσὶς χοληδόχος est vas oblongum, *ria figura*.
profundum (hoc est, pyriformem figu-
ram habet) concavum, duplici mem-
brâ donatum: unâ quâ alligatur jecori *Membrâ*.
peritonæo, absq; fibris, & quâ pars tan-
tum extra jecur propendens vestitur;
tunica propria & crassiore, sed valida,
cui fibrarum genere constante; quam
cingit crûsta quædam, ex excremen-
taria suâ coctionis genita, ad ar-
tandam bilis acrimoniam. Vesicula hæc *Magnitudo*.
parva est, lienis & renum respectu.

Dividitur in fundum & cervicem.

Fundus rotundus est, inferiori lo-
catus, quando nimirum, epas, in *Fundus ves-*
turali suo situ est colore bilis flavo *ficula*.

F 2 tin-

bilis flavo tingitur, quanquam & nigro quando nimirum bilis diu retenta aduritur.

Collum.

Cervix fundo durior sursum spectat oblongatur & angustatur, donec in angustum meatum & tenuissimum abeat qui in communem ductum intestina pertentem definit. Ad cervicem observatur primò sinus quidam peculiaris, deinde membranulæ vel valvulæ aliquando binæ, aliquando ternæ, quæ bilis regressum impediunt.

Accepit folliculus fellis plurimè exiles *meatus* multivariis ramulis donatos, in epate inter cavæ & portæ radices disseminatis; qui postea in unum meatum juncti bilem puram in vesiculâ acci-
vehunt: & hæc ubi se exonerat in intestinum quotidie, *rursum* impletur, & f
deinceps.

Vasa.

Venas duas accepit exiles ad nutritionem. Ergo bile non nutritur, ut vult *J*
bertus, *Arterias* exiles à celiacâ quoq; accepit: *nervulum* parvum vix conspicuum à sexti paris exili propagine epatis tun-
cam perreptante.

Urus bilem flavam excrementitiâ
& puram (non excrementum cum sanguine mistum, ut renes) recipere, non
nihil

bilis ad tempus retinere, & postea ex-
cellere.

Alterum bilis receptaculum est
CANALIS vel PORVS BILARIVS,
quod est vas oblongum, & latior mea-
us, quam est cervix vesiculæ, & ab epate
bit recta per communem ductum in in-
testinum (non in vesiculam) excremen-
tum biliosum crassum recipiens, quod &
Galenus agnovit, qui vult bilem recta
propelli etiam a jecore in duodenum:
Postq; Galenum canalis hujus bilarii
descriptio vera Fallopio debetur.

Communis ductus seu meatus in intesti-
ni jejuni principium vel circa duodeni
membrum abiens, constituitur ex cervicibus
canalis bilarii & vesiculæ fellis, & obli-
que inferitur inter utramq; intestini tu-
nicam, & quidem aliquando bifidus, mē-
branulis laxis orificio propositis. Ubi
bilis copia, ut in biliosis naturis, sæpe re-
urgit ad ventriculum, quando his je-
junis venter diutius torquetur.

Nonnunquam sed rarò ductus abit
in fundum ventriculi, eo bilem effun-
dens. Unde bilis vomitus, ijq; homines
dicuntur *πικρόκολοι ἄνω*. Si verò ad jeju-
ni finem meatus inferitur; dejectiones
semper biliosæ obtinent, & ij dicuntur
πικρόκολοι κάτω.

DE LIENE:

LIEN sive SPLEN in sinistro hypo-
chondrio situs est è regione epatis tã-
quã alterũ epar sub diaphragmate inter
cõstas & ventriculũ, in nonnullis altior
vel humiliori sede quã in aliis; in omni-
bus tamen posticæ seu dorsali parti vi-
cinior est, quandoquidem vertebris &
costis spuris innititur, ut tactu depre-
hendi nequeat, nisi tumidus ad abdo-
men appropinquet, Atq; hic ejus situ-
rarò immutatur ut in dextro sit latere
epar in sinistro.

Numero plerumq; unus est, rarò duo
(ut notavit Aristoteles 4. de generat. ani-
mal. 4. & Posthius Monspelij) rari-
tres sibi invicem superimpositi, non t-
men æquè magni (ut observavit Fallo-
pius) rarissimè penitus deficit (ut lo-
co dicto meminit etiam Aristoteles
item Laurentius) nec deficere potest na-
turaliter, siquidem *natura, non abundat in
superfluis, nec deficit in necessarijs.* Fabulosa
ergo opinio vulgi, in cursoribus eximio
& eximi posse absq; vitæ periculo (quod
pondũ à quoquã visum aut literis mã-
tum) nata indubiè ex antiqua Erasistrati

opini-

atione, qui lienem frustra à natura
mum existimavit; quod Plautus et
in Mercatore habet. Infecta verò
ne carent. Quamobrem falsum il-
Habet & multa splenem.

*An lien ex-
mi possit
ex corpore.*

Magnitudo non tanta est quanta je-
ods, homini tamen satis crassus lien est
magnus, ob humorem, quem fran-
debit contumacem & ductu
scilem. Majorem putant datum esse
qui Melancholicum succum na-
copiosorem accepere, quo as-
ente augeatur facile ob laxam ejus
ratem. Quibus augefcit, ijs minui-
corpus, & minus floret. Unde
manus Imperator fiscum appellavit
rem; quia ut hoc ditescente, plebs
quiperatur: Sic liene augefciente, mi-
tur corpus.

*Cur homio
ni lien
magnus.*

Figura ejus plerumq; oblonga est in-
lingvæ bovis; unde linguosum vi-
quibusdam; foris ad latus sinistrum
diaphragma gibba non nihil: nonnun-
um ob costas impressiones habens,
ere dextram respiciente concava,
adjacentem ventriculum: ubi per
gitudinem mediam linea quædam
prominentiis donata, venas & ar-
ias cum omento admittens. Ali-
præter naturam varias accipit
F 4 figuras

figuras : globosam exactè, triangularem, acuminatam, eminentijs *exasperatam*, bipartito sectam &c. ut rectè annotavit Archangelus.

Color in fœtu rubens est, ut epatis cum sanguine materno alatur puro : adultis verò subnigricans, ob succum crassiolem quo alitur. Præter naturam autem lien varios colores induit, juxta humorem dominantem : lividum, cinereum &c.

Connectitur per membranas tenuissimas à peritonæo natas ipsi peritonæo, omentum, & reni sinistro, aliquando & septo ; cava verò parte annectitur superiori menti membranæ, à qua etiam

Tunicam accepit tenuem & simplicem.

Substantiam vel *παρέγχυμα* habet instar crassi, nigri & concreti sanguinis.

Vasa habet omnis generis. A vena portæ insignem truncum, qui ramus splenicus dicitur longè infra epas situs, & transversim ad lienem missus, succum crassum rem Chimi (non verò excrementum Melancholicum ab epate, cum epas non attingat) advehens. Hujus rami numerosi furculi, sed ut plurimum fibrarum instar tenues absumuntur in liene præter duos, qui à liene prodeunt : unus dicitur

as breve, ventriculum ingrediens, modo unâ, modo pluribus propaginibus: quod vas volunt alii sanguinem aridum eructare ad appetitû, aut ventriculi corroborationem, qui deinde per intestina excernatur. Alius ad anum abit, & hæmorrhoidales venas internas gignit.

Arterias habet magnas, multasq; à Cæliaca secus quam epar. 1. ad vitam & calorem innatum fovendum. 2. Ut fortius mutari possit crassus sanguis. 3. Ut expurgetur lien. Observandæ autem præcipuè sunt Anastomoses frequentes arteriarum lienis cum venis eiusdem præsertim una insignis ante ingressum vasorum in lienem: reliquæ in liene sunt.

Anastomoses in liene.

Nervulos etiam à sexti paris' ramo costali sinistro, magis per tunicam quam substantiam dispersos.

Lienis A C T I O ex communi opinione triplex potiss. doctioribus eam sequentibus statuitur. 1. Attrahere humorem melancholicum, excrementitium & limosum ex epate. 2. Melancholicum excrementû inde secernere, ut bono sanguine nutriatur. 3. Secretum in ventriculum & intestina eructare. Statuitur etiam alimentum lienis ab arteriis elaborari

F s rari

rari & frangi, quia caro fungosa & laxa nutriri debeat sanguine vaporoso & subtili. Ductus per quos eructare putatur excrementum melancholicum sunt primo vas breve, deinde vena hæmorrhoidalis. Volunt itaque splenem esse melancholici excrementi seu sæculenti crassi sanguinis in epate segregari receptaculum (quemadmodum vesica biliaria flavam bilem recipit) & ideo lienem è regione epatis positum.

An lien excrementum dicatum negamus. nam

melancholicum recipiat ab epate. 1. In liene nulla ampla est cavitas excipiens, quemadmodum in folliculo fellicis & in renum sinibus membranosis atque vesicâ.

2. Si excrementi receptaculum esset, cur non inferiori loco situs est, ut commodius suscipiat ponderosum excrementum, quemadmodum reliqua receptacula?

Rondeletij argumentum invalidum. 3. Rondeletius negans lienem esse humoris melancholici receptaculum, hanc dat rationem, quod humoris, dum naturalis est, totus in osseas & alias duras & siccas partes impendatur; atque, cum ejus in nobis portio minima sit, ei excipiendo partem nullam esse dicatam, uti nec sanguineis recrementis, quæ fudoribus & insensibili transpiratione abeunt. Hoc tamen argumentum minus validum existimamus.

4. Cur

4. Cur non per epatis substantiam digeruntur furculi huius receptaculi aut item rami splenici, quemadmodum vesica biliaria ramulos suscipit in epate dispersos?

5. Cur non sunt ductus quidam ab epate hunc succum deferentes?

6. Nulla pars excremento alitur, quicquid Columbus dicat, nullam partem excremento nutriri, liene excepto.

7. Absurdum est regurgitare debere excrementum in venam portæ, & postea in ramum splenicum.

8. Per eosdem ductus excrementa susciperet, & rursum expurgaret.

9. Firmissima ratio est; lienem excrementi receptaculum non esse, quia alterum est sanguificationis organum, ut modò probabitur. *Statuimus enim lienem ex crassa Chymi parte per ramum splenicum insita facultate ad se tracta sanguinem crassio- rem, sed tamen laudabilem elaborare.*

An lien sanguificet ut epas.

1. Patet hoc ex structuræ affinitate cum epate. Quemadmodum enim epas carnosus viscus est, tunica vestitum, vasis plurimis donatum, cujus caro quasi sanguis affusus est; ita etiam Lien viscus est tunica donatum & plurimis vasis variè implicatis, cujus caro propria quasi sanguis affusus & congelatus est.

2. In

2. In Liene plexus sunt plurimi & infinitæ anastomoses. Nusquam autē sunt plexus, nisi ad novam elaborationem, ut videre est in cerebro, epate, testibus, mammis, &c.

3. Patet hoc ex situ rami splenici, qui est longe infra epar, ex trunco venæ portæ, ubi attrahitur pars Chymi sive chylis sanguinis aliquam dispositionem habentis: si itaq, materiam ibi recipit, ex qua fit sanguis, cur non etiam sangvificabitur lien?

4. Natura solet corporis partes aut geminare, ut cuius unum latus tribuatur, quemadmodum patet in renibus, testibus, pulmonibus, mammis, organis sensuum &c. aut si unicam facit, eam in medio locare, ut cor, ventriculum, uterum, vesicam, nasum linguam, os &c. Lien ergo erit alterum epar.

5. Lienis morbi, quemadmodū & epatis, sangvificationem lædunt.

6. Interdum epatis situs mutatur, ut sit in sinistro latere, & lien in dextro.

7. Epate deficiente & minuente augetur lien, & epati opem fert, uti exemplis multis notum est, unde lien sæpè videtur fuit in dissectionibus major & rubicundior epate.

8. Veri

8. Verisimile non est tam numerosas arterias lienem ingredi in excrementorum gratiam, quin potius ad coquendum rassiorem sanguinem, ut ita per contrariam tenuitatem contumax crassities rangi possit.

9. In fœtu lien rubet ut epar.

10. Si autoritates valent, prodeat Aristoteles lib. 3. de partibus animalium

7. ubi ait: simili prædita naturâ epar & lienem, item, lienē esse quasi jecur adulteratum, & ubi lien exiguus est, ibi epar bipartitum esse, & quod omnes partes fœtū in corpore bipartitæ sint. Plato lienem vocat expressum epatis simulachrū.

Alii vocant epar vicarium, sinistrum &c. Autor libri de respirationis usu hoc confirmavit, ut i& Aphrodisæus, Aretæus & alij. Archangelus alterum usum lienis facit copiosiores sanguinem conficere.

Iam quæritur in quem usum sanguis à liene confectus?

Alii putant eandem cum epate, videlicet ad corpus totum nutriendum, & ad auxilium epati ferendum.

Sed nos statuimus hoc non fieri, nisi Quibus
si necessitate postulante in epatis aliquo partibus
defectu vel affectu vitioso. lien san-

Ordina- guificet.

Ordinariè autem putamus lienē esse organum conficiendi sanguinis, ad nutrienda viscera infimi ventris, ut ventriculum intestina, omentum, mesenterium, pancreas &c, atque ipsum etiam lienem nutrire sanguinis istius aliqua portione, reliquam verò ad partes dictas amandare. Epar verò arbitramur sanguinem procurare reliquis partibus corporis, præsertim musculosis. Probamus

1. Quia à splenica, vel ramis ex hepatis aut huic vicinis, videlicet ramis venæ portæ solis habent nutritionem viscera infimi ventris, non à vena cava

2. Quia viscera ista crassa sunt, magis terrestria & sordida, quales partes in reliquo corpore non inveniuntur. Ideo talem sanguinem hæ partes à liene requiriverunt.

3. Et ideo epar majus est, quia pro toto reliquo corpore sangvificat: lien minor, quia tantum pro infimo ventre, nisi quando in necessitate epari opitulandum debet.

4. In canibus lien est gracilis & longus, quia partes vel viscera infimi ventris minora sunt in cane & minus circumgyrata quam in homine.

5. Conspicuum est discrimen inter eum & pingue

pinguedinem in partibus musculosis, ut ijs, quæ à cavâ nutriuntur genitâ, & inter pinguedinem cœnosam & facile putrescentem in imo ventre, ut omentum, intestinis, mesenterio, &c. Hinc tot putredines in partibus mesentericis. Et quò humor est crassior, (uti est pinguedo cœnosa) eò citius putrescit: ut cœnosa citius quàm pinguedo in partibus musculosis. Sic sanguis lienis magis est dispositus ad putredinem, quàm epatis, & huius magis quàm cordis dextri ventriculi. Deinde minùs putrescit sanguis arteriarum; minimè omnium spiritus.

6. Argumentum firmissimum hoc est, quod ubi pars reperitur viscerum substantiam habens, ibi etiam venæ adveniunt ex porta seu ramis lienis: ubi verò pars est carnosâ musculosa, ibi venæ adsunt ex cavâ originem habentes, ut liquet in intestino recto, in quo ob duplicem substantiam, duplices venas natura posuit. In musculosâ venæ sunt hæmorrhoidales externæ dictæ, ex cavâ oriundæ: in viscerosa sive intestinali substantia, venæ sunt expor-
ta.

Quatenus ergò lien crassiore Chyli partem ad se trahit, & inde sangvi-
nem

*Quomodo
Lien dica-
tur sedes
risus.*

nem conficit, ut reliqua pars ab epate e-
laboranda fiat purior & illustrior; potest
quodammodo locum habere antiquo-
rum opinio, statuens lienem esse risu-
sedem, Unde illud:

*Cor sapit, & pulmo loquitur, fel continet iras
Splen ridere facit, cogit amare, iecur.*

Quamobrem Lien sangvificat pro
nutritione viscerum infimi ventris. E-
pars excrementitia, quæ à liene superat
non potest expurgatur per arterias, non
solum ad intestina, verum etiam ad re-
nes per emulgentes (Hinc in affectibus
splenis urinæ sæpe nigræ, ubi propterea
diureticis utimur. Et splenetici atq; mor-
lancholici dicti, abundant sero, ut e-
Hippoc. & Galeno notum, nam serum
crassissimi humoris vehiculum esse do-
buit. Hinc quartanarij copiosissimè su-
dant, mejuntq;) & in nimia copiâ pe-
hæmorrhoidales.

CAPVT XVII. DE RENIBVS.

*Triplex ex-
crementum
sangvinis.*

EX sangvine triplex expurgatur excre-
mentum: bilis tenuis in folliculum
fellis, bilis crassa in canalem biliarium,
serum in renes. Quia ergo de priorum
duorum excrementorum receptaculi
dictum est, de tertio quoq; nunc agendum

Rene

RENES à fluendo dicti, quòd per e-
materia urinæ fluat, Græcis νεφροί ap-
pellantur, quasi mingentes.

ini reperiuntur, quia inter omnia excre-
menta serosum est copiosissimum, & u-
mque bilem excrementitiam superat,
sanguinem, cuius vehiculum esse de-
bet, donec sanguis in cavæ ampliores
venas pervenit; & ut uno affecto alter
motum trahat serosum. Rarò unicus
motum reperitur, isq; magnus in medio
sit, cum alias corpus in æquilibrio nō
est. Rarius tres vel quatuor reperiuntur.

Situm habent sub epate & liene, ubi
cumbunt spinæ lumborum musculis
inter duas peritonæi tunicas, ad latera
venæ cavæ & arteriæ magnæ. Neque
in e regione sibi invicem oppositi
sunt, ne tractione impedimentū aliquod
esset, & ne pars aliqua feri præterlabere-
tur. Sed dexter ren in homine inferior est, ut

adat jecori, cui proximè subiacet, sine
tota tertiam vertebam lumborum at-
tingens: rarò elatior est sinistro, raro et-
iam situ sunt pares bini renes. Sinister ut

curvum lieni ex parte subicitur, raro
liene superior est. In brutis contrà lien-
corum magis vergit, & ren dexter ma-
gis sursum, quare epati ipsorum finis

*Ren quin-
altior.*

G

obscul-

in sculpitur ob renem; quod in homine non fit.

Magnitudo non semper æqualis ut usque est, ut plurimum tamen. Longitudo ferè est quatuor vertebrarum, latitudo plerumque trium digitorum. Sed æque semper ad corpus conveniens est proportio.

Superficies sicut in jecore est lævis & lubrica; rarò & præternaturaliter in homine inæqualis quasi ex multis renibus vel glandulis renes essent compositi: Vt ferè semper fit in bove & urso.

Color ruber est obscure, rarò interius rubet. In male affectis variè colorantur renes; quemadmodum & epas & lien.

Figura est phaseoli, item folii asari, planam superficiem spectes. Exteriùs dorso seu ad ilia gibbosa & rotunda figura; inferiùs ad partem supremam imam gibba, sed ad mediam concavissima.

Connectuntur per membranam exteriorem, quæ a peritonæo est, lumbis & diaphragmati, per emulgentia verò vasa cava & aortæ, per medios ureteres vasa. Et dexter ren, Cæco intestino, quodamq; & jecori; sinister lieni & colo. Hinc flatuum & excrementorum copiâ exacerbat nephritis.

Mentio

Membranam duplicem habent : pri-
mam internam proximam & propriam,
tunc pinguedine & venis, tenuissimā;
unica externa & communi vasorum
predientium dilatata, (nam vena in-
ditur tantum cum una tunica) quæ
in arctè connascatur, carnem compa-
rem reddit, & intrò reflexa comita-
vasa, ventresque subit & succingit.
ram externam à peritonæo laxè ad-
rentem, undè fasciam renum vocant,
enim renum involucrum & stragu-
l, quia multus ei adeps circumfundi-
in eius gratiam venam adiposam
tam recipit, adeò ut renes in obes-
ultati non appareant. Undè scri-
renes dicitur, qui occulta scit aut
atur. Adeps autem datus ad renum
orem servandum à feri copia, & ad va-
uenda.

*Scrutari re-
nes quid.*

Substantiam vel carnem habent du-
t, compactam & densam, ferè ut
t, sed non ita fibrosam, quia vaso-
n adfunt fibræ. Sed ad sinus interni
umque latus remoto adipe apparet
stantia laxa, inæqualis & cavernos

Ventres quasi binos accepere. Exterior in parte fima Fallopio porta dictus; quem emulgentia vasa feruntur & primum ingrediuntur bipartita, statim rorò plerumque quadripartita disseminantur in totam renum substantiam, de tandem in tenuissima capillamenta sumuntur. Interior nihil aliud est quam sinus ureteris amplius, hoc est, sinus braneus est factus ex ureteribus, in renum expansis & dilatatis. Ureteres rorò in progressu intus non attenuantur alia vasa, sed ramorum plurium infistularum fines habent latos & apertos excipientes carunculas nonnullas.

Carunculae hæ sunt instar glandularum minus coloratæ & duriores reliquarum. Rondeletius se primum Invenire ait, & mammillares vocat propterea. Alij papillares carunculas appellant suntque acutæ, & perforationes habent angustissimas, ut vix capillum admittant qui sulci & canaliculi observantur, secundum longitudinem renes secernunt. Tenuis debent esse perforationes sanguis pro nutritione renum requiritur una efflueret cum sero & bile in ureteres, quod alioquin fit renibus male affectis, aut meatibus nimis patentibus.

sa habent omnis generis.

as à Cavà.

Emulgentes ab officio dictas, quæ
æ & insignes sunt ob feri in corpo-
piam: in quibus valvulas observari
huhinus prohibentes feri in cavam
issum. Brevi & obliquo ductu ferū-
ceorsum ad renum sinam partem,
namadmodum & *arteriæ emulgentes*, quæ
nes sunt, ab aortæ trunco ad renes
ratae, non tam ad calorem vitalem
reditandum, ut frigiditati obviam
r, quàm ad serum in sanguine arte-
copiosissimè contentum expurgan-

Adiposas. Dextram ab emulgente,
is à trunco, sinistram à cava produ-
ad exteriorem tunicam, quæ san-
nem vehunt pro pinguedine. Aliis
ò vasis ad nutritionem non indigent
s, sicuti vesica biliaria & urinaria,
non ut hæ purum excrementum
unt.

ervum utrinq; unum habent exilem
machico, in propriam membranam
tributam, undè ventriculi & renum
sensus, ut in nephriticis ventriculi
versio & vomitus.

G ;

Paucæ

*Cur in cal-
culo renū
vomitus.*

Paucae verò nervorum progagines ca-
ca principia arteriarum mesenterii pi-
deunt, quarum pars cum arteriis en-
gentibus cavum renum subit, & per su-
stantiam disseminatur. Hinc nephriti-
dolores gravativos habent vehementi-
res: sed dolor tamē fit acrior, si calculi
in ureteres angustos & valde sensibiles
grediatur.

*Structura
renū cani-
ni.*

Hæc vera *structura* renum est in homi-
ne. Nam *alia in cane* est, ubi *alia* ad sub-
cavitates, in hominis verò renibus nu-
læ, nisi quæ ab emulgentibus & uretere-
bus variè divisis formantur.

*Cribrum
benedictū
antiquo-
rum.*

Fictitium quoque veterū nonnullum
rum est de cribro benedictō somnium
Finxerunt enī in renibus duas cavi-
tes secundū longitudinem sitas: unam
supremam, in quam sanguis serosus
emulgentibus effunderetur, alteram in-
fimam, quas transversa quædam mem-
brana distinguere putabatur instar cribri
angustissimis foraminibus pervia: unam
colatorium vocarunt, & benedictum
cribrum, per quod voluere percolari
rum in ureteres, sanguinē verò probulo
remanere pro nutritione renum. Hæc
antiquorum somnia Vesalius rectè re-
cit; sed interim hallucinatur, dum ca-

retinet in humano rene, quales in
quo cernuntur, prohibetq; secari renes
femini & ovis ob pinguedinem.

*Vesalij erro-
ror.*

Erastrius, Erasistratus & Asclepiadis seque-
ntur frustra à natura conditos renes puta-
re. Et Aristoteles quando q; asserit, nul-
los eos necessitatem habere. Sed

*Aristotelis
Error.*

Verum est, serolum sanguinem attrahere
venas & arterias emulgentes, ut ita
sanguis repurgetur. Per hæc vasa ergo
incediens sanguis serosus fertur per ra-
mos emulgentium, qui in carnem to-
renum disseminantur, & in tenuissi-
as tandem abeunt vias, ut in carnem
tandem effundatur recta humor
serosus: pars verò sanguinea & laudabi-
lissima remanet pro nutritione renum. sero-
sa & aquea percolatur per carunculas
biliares perforatas, in ramos urete-
rum, qui in unum amplum sinum sive
materem expansum coeunt, in quem
inducitur serum, & per ureteres in vesi-
cam, unde urina. Quia vero flavescit uri-
na, putatur portio bilis flavæ à folliculo
lis non repurgatæ cum sero permea-
re, ut mudentur ureteres à bile,
sicut intestina.

*Vrina quo-
modo fiat.*

DE CAPSVLIS A
trabilarijs.

HÆc vasa à plurimis negliguntur
nec observantur: quamvis semper
& in omnibus cadaveribus inveniuntur
quicquid contradicat Archangelus. Non
que statuendum est, esse has capsulas
superflua materia ut est sextus digitus.

*Inventor
primus.*

Prima inventio horum corpusculo-
rum debetur Bartholomæo Eustachio
qui sub glandularum nomine memin-
& post eum Archangelus & Bauhinus
Casserijs renes succenturiatos vocat.
Nos ob usum, quem ijs tribuimus, c-
psulas atrabilarias vocabimus.

Sunt verò capsæ hæ ita sitæ, ut foris in-
cumbant renibus parte supernâ, qua v-
nam cayam respiciunt.

Numero tot sunt quot renes. Cuilibet
enim reni una capsula incumbit.

Magnitudo non semper æqualis est;
plurimum dextra sinistram superat, a-
quâdo tamen & hæc illam.

Cavitatem habent intrinsecus, in qua
humorem quandam continere depreh-
henduntur, fœculentum & nigrum.

Figura

Figurâ & substantiâ sæpè renibus re-
spondent, ut videantur quasi parvi renes
signis incumbentes. Vnde forte Cas-
sio renes succenturiati dicuntur: sapi-
entè verò depressa sunt substantia instar
saccæ (intus tantum excavatæ) & fi-
gura quadratè oblonga.

Connectuntur ubi incumbunt exteriori
membranzæ adeò firmiter, ut ne-
cipientioribus diaphragmatis membra-
næ connexæ relinquuntur exemptis reni-
bus. Hinc fit, ut multi non observent.

Vasa habent: *venas & arterias* ex medi-
emulgentibus eò derivatas. Interdum
ex rene simul eò vena mittitur, aliquando
autem furculus juxta epas ex cava eò
producitur, aliquando & ab adiposa, ali-
quando ex omnibus istis locis.

Nervos acciperunt hæ capsæ. Nam cir-
ca principia arteriarum mesenterii, ali-
quæ nervorum propagines invicem mi-
stæ producuntur, quarum pars una renes
& incumbentes has capsas adit.

Vsus hætenus ignoratus est. Si aliquid
conjectare licet, uti rectè consideratâ stru-
cturâ & ductibus omnino licet; dicemus
recipi in his capsulis humorem biliarium
crassum & excrementitium, qui à san-
guine in epate vel liene vel utroque cõ-

fecto, maximè vero eo, quem in liene
laborari suprà probavimus, nondum
expurgatus fuit; ibique servari & vinci
quia per angustos renum meatūs pene
trare non potuit. Hinc fortè urinæ etiam
nigræ sunt, si aliquando humor hic in
capsis nimium coacervetur: ubi quoque
sedes alicuius causæ morbificæ indubie
sa pius esse potest.

CAPVT XIX.
DE VRETERIBVS.

VRETERES seu urinæ ductores sunt
vasa oblonga vel canales è renibus
oriundi, in vesicam implantati, urinam
à renibus in vesicam advehentes.

Numero communiter ureteres bini
sunt: utrinque unus, aliquando duo, &
etiam plures, ante insertionem tamen
in unum coeuntes.

Situs. Plures occupant partes secun-
dum principium medium & finem. *Prin-*
cipium est in renibus, ex fistulis seu cana-
liculis novem vel decem, quibus singu-
lis carunculæ supra explicatæ apponun-
tur, licet etiam medio eorum perforato
carunculæ apponantur. *Fistulæ* verò illæ
in pauciores & majores abeunt ramos
communiter tres distributos in renis re-
gionem

tionem summam, mediam & infimam,
deinde in unum amplum sinum coe-
unt, qui sima renum parte egreditur. Me-
um est totus canalis oblongus, lumbo-
musculis incumbens, inter duas pe-
ritonæi membranas, quibus

Connectuntur Ureteres; & superius re-
bus, inferius vesicæ, cujus interiori
substantiæ continuantur, ut citra disru-
ptionem divelli nequeant. Finis est, ubi
implantantur, obliquè delati ad latitu-
dinem digiti inter vesicæ propriam mē-
branam & musculum eiusdem circum-
volutum, non longè à collo vesicæ in-
obstacula sede. Et præter obliquā ureterum
insectionem apponuntur implantationi
duæ membranulæ transversæ instar val-
vularum & follium, occludentes urete-
rum introitum, ne urina egredi queat.
Hinc ne flatum quidem vesica inflata, &
ad cervicem arctata immittit.

Magnitudo. Oblonga sunt vasa crassa &
concava, paleam lata. At in calculosis dis-
sectis sæpius vidimus cavitatem eorum
duos digitos admittere.

Figura. Teretia sunt vasa instar canali-
um, nonnihil obliqua, instar literæ f.

Membranam duplicem habent: Unam
communem à peritonæo ad validitatem,
alterā propriā substantiæ interiori vesicæ
similem

*Cur urina
regredi ne-
queat in ea
mulgētes.*

similem & continuam, albam (hinc vocant quidam venas albas) ex sanguinem, nervosam, crassam, validam, fibris obliquis, ut distendi queat, donatam.

Venas & arterias exiles à vicinis partibus recipiunt.

Nervos verò à sexto pari & medullâ lumborum. Undè exquisitè sentiunt, & dolent, si calculi pertranseunt,

Vsus est, ut per eos tanquam canales urina in renibus à sanguine segregata feratur in vesicam; arenulæ etiâ aliquâdo & calculi. Urina verò fertur manifesto ductu antea explicato in vesicam, quem

Error Asclepiadis & Paracelsi. ductum quia ignoravit Asclepiades, voluit cœco modo serum in vesicam duci, ac si in halitum prius resolveretur, transsudaret, & postea in humorem priori similem concrederet: quam etiam transsudationem statuit Paracelsus.

CAPVT XX.

DE VESICA VRI- nariâ.

VESICA hæc in hypogastrio sita est inter geminas peritonæi tunicas in cavitate quæ fit ab ossibus sacro, coxarum, & pubis; in viris supra rectum intestinum

um; in fœminis inter collum uteri & pubis.

Magnitudo variat, prout variè distenditur: aliquâdo n. plena in ventre prominet, ut tactu deprehendi queat, aliquando vacua in sectionibus vix cognoscitur statim, ob parvitatem, quæ instar pyri majusculi est.

Figura est oblongè globosa & rotunda, t. capax sit: atque intus cavitatem univ. am habet vesica, rarò duas, membranâ seu sepro distinctas. A fundo sensim contractatur in collum angustum, undè *duæ vesicæ partes: fundus & cervix.*

Connectitur fundus peritonæo, item umbilico per intermedium ligamentum, utrachum dictum, & duas umbilicales arterias resiccatas: ne homine recto incedente fundus cervici incumbat. *Cervix vesicæ connectitur* in fœminis collo uteri & vicinis ossibus coxarû. In viris, recto intestino.

Substantia est partim membranosa ad robur, extensionem & corrugationem; partim carnosâ ad motum. Nam duas habet membranas & unum musculum circumvolventem totam vesicam, quem alii omnes anatomici excepto Aquapendente

dente, tertiam ejus membranam faciunt, non muscolum.

Prima membrana est extima & communis, à peritonæo, valida & densa.

Altera est intima & propria, tenuis, exquisitè sentiens, omni fibrarum genere intertexta, ut multùm queat distendi.

Crusta vesicae & contrahi. Huic obducitur *crusta* carnosa, vel quasi tunica rugosa ex excrementis tertiæ coctionis, ne infima tunica ex acrimoniâ urinæ lædatur.

Quæ inter hanc propriam & extimam communem in medio est, ab aliis *secunda* propria membrana appellatur, quam tamen concedunt crassam esse, & fibris carnosiss donatam.

Musculus vesicae excretivus. Sed musculus potiùs est ambiens totam vesicam: quia fibras habet perspicuè carnosas ad vesicæ initium insertas: ita ut quemadmodum musculus ille circularis sphincter dictus, vesicam constringit ne involuntarie nobis urina effluat, ita hic musculus ad excretionem urinæ faciat, dum se contrahendo vesicam constringit. Atq; hæc quidem Aquapenderæ artis præceptoris mei est sententia.

Foramina tria habet vesica: duo paulum ante cervicem, ubi inseruntur ureteres, de quibus supra, tertium in cervice est pro urinæ exitu.

Est autem *cervix* vesicæ vel collum, multior pars, per quam *urina* emittitur. In *viris* collum hoc est magis oblongum, iustum, & nonnihil contortum, quia his corporibus subiectum sursum; sub pubis ab ano ad penis exortum. In cuius posteriore parte glandulæ biapponuntur, *prostatæ* dictæ: In *feminis* Musculus *constrictivus* vel *sphincter*. *Uterus* & *lata* *cervix* est, recta deorsum tensa, & uteri collo superius implantatur. In utroque sexu *cervix* carnosa est, rimis fibris contexta, præsertim transiis, quæ constringunt collum vesicæ, involuntarie nobis *urina* effluat, & sculus hic orbicularis ab hoc usu dicitur, *sphincter*: qui si refrigeretur, paravel alio affectu lædatur, fit *mictio* voluntaria.

Vasa. Venas habet Vesica ad nutritionem, trahit purum excrementum, nempe *urina*, quæ non alitur.

Arterias ab hypogastrica in *viris*, in *fæ-* minis à vasis uteri cervicem petentibus.

Nervos insignes à sexto pari & medullis sacri.

Uti est, *Urinam* continere instar matris corporis, item calculos & arenulas: idè justo tempore expellere.

CAPUT

DE VASIS SPERMATICIS Virilibus præparantibus.

HActenus nutritionis organa: quæuntur procreationis seu generationis, quæ aliter se habent in viris, aliter in mulieribus. In viris omnium præparantibus occurrunt

Vasa spermatica duplicia, duæ nim. vena spermaticæ, & duæ arteriæ.

Vena dextra, à trunco venæ cavæ cœlitur, paulò infra emulgentis exortum *sinistra* ab emulgente (nam aliàs debebat aortam supergredi & immineret periculum rptionis) quamobrem rariùs à cœlo aliquando ex utroque loco oritur.

Arteria feminalis utraq; ab arteriâ magna oritur.

Magnitudo Vasa hæc in viris maiora sunt quàm in fœminis: Arteriæ venis ampliores sunt, quia plurimum sanguinis & spiritus vitalis pro semine recurrebat. Aliquando una arteria deest aliquando utraq; & fortè in sterilibus.

Hæc vasa nonnihil à se invicem stant, supra ureteres obliquè ducuntur.

inguina, sed in progressu junguntur
infinitas anastomoses hæ venæ & ar-
æ, & connectuntur membranâ à pe-
næo enatâ atque ad testis principiū
area capreolorū vitium instar deferū-

alis verò plexus constitutus voca-
tur à nonnullis *corpus variosum*, pampini-
ne, pyramidale &c. Cæterum hæc va-
peritonæum non perforant, ut in cani-
bus, sed feruntur inter eius duplicitatem
nervo exili à sextâ conjugatione, &
sculo Cremastere.

Vasa hæc generationis præparantia,
jam testem attingunt, non mutan-
in vasa deferentia, tanquam continua
corpora, ut multi putant: sed propri-
testis tunicam penetrant, & per ejus
stantiam disperguntur atque desi-
nt.

us est, sanguinem & spiritum utrum-
ad testes deducere, & in plexibus
s variis vi & efficacîâ à testibus ac-
ficâ præparare. quod fit, dum exacte
miscetur sanguis venalis & arteria-
lis per moram in labyrinthis
theis istis anfracti-
bus.

CAPUT

DE TESTIBVS.

TESTES seu TESTICVLI quasi attestantes virilitatem & viri roborem *διδουοι* etiam seu gemelli appellantur quia communiter

Numero bini sunt. Rarò unus tantum & magnus; rariùs tres, item quatuor quod & Aristoteles ex parte annotavit

Cur testes in viris foris siti, *Situs* in viro foris est extra abdomen sub ventre ad radicem penis in scroto seu involucro suo. 1. Ob castitatem

Aristoteli credimus. Nam animalia, quæ testes habent abditos intus in corpore salaciora sunt, sæpiùs coeunt, & plura foetus gignunt. 2. Vt ob longiorem etiam diuturnior materiae seminis meliorem præparationem efficiat.

Magnitudo communiter in viris est minor exigui gallinacei ovi. Et in viris maiores sunt testes quam in mulieribus.

Figura testium est oblongè rotunda seu ovalis. Variat hæc figura nonnihil, ob vasa vicina magis vel minus turgentia, unde nonnullis *dexter* testis plus varicosior dicitur: & putatur etiam *salidior*, semenque magis percoctum.

Vide Hippocrati ἀρρενόνιον vel
 mrem generans dicitur, eo quod san-
 nem & spiritum puriorem & calidio-
 ra à vasis magnis accipiat, vena cava &
 arteria magna. *Sinister frigidius semen con-*
tere putatur, serosius & imbecillius,
 ut plurimum ab emulgente materia
 vertur, ideo Hippocrati hic testis
 ἀλγυνος dicitur, *foeminas* procreans.
 de vulgatum illud, *foeminas* generari
 in sinistris & in sinistris; mares à dextris
 in dextris. Et Hippocrates ait: Inest
 in viro, sic in muliere semen virile &
 liebre, id est, calidius & frigidius.
 sinister testis in sinu semine magis
 get, plenior est, & venam majorem
 et, ut natura *foeminarum* generatio-
 nis magis intendere videatur, quam
 masculorum. Male ergo Aristoteles, *Error Ari-*
 turam semper intendere generatio- *stotelis.*
 nis maris per se, tanquam id quod per-
 tum; *foeminam* verò fieri, quando
 natura impedita non potuit marem gi- *An natura*
 nere, unde mulier ipsi quasi monstrum *semper in-*
 turæ. Atqui natura videtur magis esse *tendat ge-*
 licita de *foeminae* generatione quam *neratione*
 viri, ob causas ante dictas, neque na- *maris.*
 ra semper melius respicit, sed magis
 necessarium, quale *foemina* est: harum
 im multæ pro uno viro sufficiunt.

H 2

Nam

Nam tempore factus inutiles sunt feminae, deinde etiam brevioris vitae, non tam diu operam dare possunt liberis atque viri. Sed de hac re plenius egimus in problem. Phil. & Med. rarior. & nobil. Erc. 1.

Integumenta & involucria data sunt testibus alia communia alia propria.

Communia aliis partibus & ad tutelam ab externis injuriis data sunt duo.

Primum ex cuticulâ & cute tenuior quam alibi, efformatum, & dicitur scrotum vel scortum, instar sacculi vel buccae foris propendens & tactu obvium. Mollius est & rugosum, pinguedine carens, faciliorem extensionem & corrugationem: Quia materia pinguedinis oleosa testes abire in semen.

Cur pinguedine careat.

Secundum ex panniculo carnosio constitutum, etiam tenuiore quam alibi, venis & arteriis referto, & δαερὸς dicitur: quod tegumentum ab aliis sub scroti nomine comprehenditur.

Propria tunicae vel involucria, utrinque quemlibet testiculum investientia sunt tria.

Prima Tunica propria dicitur ἐλυτήριος, id est, vaginalis, aliis vero ἐλικοειδὲς ἢ formâ, quæ tenuis est, sed tamen valde

ve

referta, orta à peritonæi processu. Darto annascitur fibris multis mē-
neis, quas alii pro peculiari tunicâ re-
quiere.

Secunda ἐν ὁμοειδής, rubra, & fibris
prosis donata nonnullis, quæ priori
intus obducitur.

Tertia ultima & infima immediate
substantiam ambiens, & veluti cō-
gens, *albuginea* dicitur, quia alba est,
& valida, à tunicâ vasorum semio-
rum orta.

Substantia testium est, glandulosa, alba,
elastica, laxa & spongiola, ob plurima
ibi dispersa, & cavernosa, absque
cavitate, uti epar & lien etiam
cavitatibus carent.

Vasa acceperunt omnis generis. *Venas*
arterias à seminariis: *nervum* medio-
rum à sexto pari, aliquando etiam bi-
recipiuntur à vigesimo primo pari spi-
ris medullæ, vasis seminalibus conjū-
& in tunicas disseminati.

Musculum habent utrinque unum, or-
ligamēto valido, quod in osse pubis
ubi musculi abdominis transversi fi-
nt, quorum quasi partes esse viden-
Egrediuntur autem per processum
peritonæi, & initiis testium adnascun-
tur.

H 3

tur.

*Vsus mus-
culorum
testium.*

tur. Dicuntur *Cremasteres* seu suspensori-
testes enim alias pendulos suspendunt, &
vasa seminalia nimis detrahant. In con-
etiam testes retrahunt, ut canali semina-
rio abbreviato, citius & facilius semen a-
vehatur. Quod tamen maximè liquet
nonnullis (musculos hos motus volun-
arii esse participes) qui pro arbitrio, retrah-
re testes possunt & rursus dimittere: ut
hi muscoli procul dubio solito sunt rob-
ustiores, ut testes non tantum contineant
sed etiam de loco in locum moveant.

*Seminis
caussa effi-
ciens.*

Vsus testium est, calore & vi semini-
fieri semen conficere. Seminis enim causa
ficiens est *παρεχουσα* testium proprie-
tas, tum ob temperamentum calidum
& humidum, tum ob specificam proprie-
tatem; cum huic carni similis alia in
pore non reperiatur. Convertunt autem
sanguinem præparatum in semen, quod
pro conservanda specie requiritur: quod
verò super est, in testium nutritionem at-

*Sine testi-
bus non fit
generatio.*

Neque sine testibus semen ordinariè
gigni; aut animalium perfectorum gene-
ratio fieri potest, ab iis enim semen
formam & colorem accipit. Locus autem

*Locus gene-
rationis se-
minis.*

ubi generatur semen, non est ampla
qua testis cavitas, sed vascula tenuissima
inibi formata, & tunica subtili donata
rectè *Vesalius*.

testes etiam calorem & robur viden.
que corporibus virilibus addere, ut patet
in mulistratis, qui quasi in fœminas mu-
tatur habitu, temperamento, moribus
Et certè maximus consensus est testi-
cum partibus superioribus, præfer-
entem verò corde, videmus enim epithe-
lia cordialia in virium defectu testibus
applicata, juvare ac si cordi admoventur.

*CAPVT XXIII.**DE VASIS DEFE-
rentibus sive Ejaculatoriis,
de Parastatis, Vesiculis se-
minariis, & Pro-
statis.*

Vasa spermatica præparatoria supra
proposuimus, quæ desinunt in re-
ceptacula, ad quas materiam pro semine ad-
ducunt.

Alia verò vasa sunt, quæ incipiunt à
testibus, & desinunt ad radicem penis,
per quæ deferunt & ejaculantur semē jam in-
testibus confectum.

Suntque duo talia deferentia vasa, ut
videtur, inque unum.

Dividimus autē hæc vasa in principium,
medium & finem.

*H 4**Princi-*

*Parasta-
ta.*

Principium vocant *PARASTATA* quasi superficialiter testibus astantes, tem corpora varicosa seu variciformia, quæ varicum instar contorquentur: suntque corpora oblonga testibus imposita, albæ, crassa, teretia, quæ sensim angustantur.

Quoad *substantiam* verò, media habent inter testes & ipsa vasa deferentia: habent enim substantiam his molliorem, & duriorē, quia intus glandulosæ sunt & fungosæ; exterius verò membranob.

Vndè autem oriuntur, recentiorum nonnullorum opinio contra omnium autoritates ita statuit: per continuatorem oriri à vasis seminariis, ita ut cono- nua sint & vasa præparantia & parastata & vasa deferentia, & pro vario tantum officio & situ varia iis imponuntur mina.

Cæterum oriuntur à testibus, per stulas exiles seu fibras candidas innumeras: & nullum omnino vasi semen ferenti cum venis & arteriis testium munio est, quod ex sectione patet, ut Vesalius.

*Cur non
semper ad-
fit libido.* *Vsu* parastatarū est, semen perficere absolvere, vi à testibus accepta. Deinde dum in iis semen moratur, fit, ut libido vehemens & crebra non exciterur.

M

ED IUM simpliciter dicuntur vasa
dilatoria, vel vasa spermatica defe-
ria, quia semen à testibus & corpori-
bus varicosis ad vesiculas seminarias de-
ferunt. Nam humorem albicantem con-
tere cernuntur, imò & parastata sæpè
refertæ reperiuntur.

Substantiam habent albam & nervos

figuram teretem & longam : *Cavita-*
obscuram, quia semen ratione spiri-
um, quibus pollet, facile permeat.

Situs eorum est partim in scroto, par-
tim in cavitate abdominis supra os
pubis nam sursum feruntur, & præ-
torioris neantur per tenuem mem-
branam, atque pergunt ad ilia & os pu-
bicum, quod eam ob causam superficiari-
am cavitatem habet. Deinde deorsum
flexa super ureteres deducuntur, &
posteriori parte vesicæ super recto
intestino ad vesicæ collum utrinque di-
stantur, ubi

Finis est, & dilatata hæc vasa consti-
tunt

VESICULAS SEMINARIAS mul-
tas seu cellulas, quæ quasi utrinque unâ,
insignis, magna & anfractuosa videri
possent, cum una in aliam eam. Rondele-
sius has vesiculas primus descripsit, &

H s post

post eum Fallopius. Vesiculæ hæc nervi

Sitæ sunt inter vesicæ urinariæ & recti
intestini ligamenta, ad latera vasorum
deferentium, paulò antequam hæc
crassiora fiant & uniantur,

Usus est semen elaboratum continere
& reservare, ad futuros coitus, adeò
sufficere semen possit etiam pro mul-
tæ foetibus. Itaque non mirum quod Ari-

Taurus an les proposuit, taurum, cui exseci ero-
post exse- testes, tamen postea genuisse: quam
ctione testi hoc alii prostatis adscribant, ut Archi-
um genera gelus & Columbus. Potest autem in
et potuerit his cellulis semen à multis mensibus
acervari, & pro harum vesicularum ma-
titudine in pluribus congressibus semen
emitti potest, nec tamen uno coitu
tum effundi.

Et quod semen contineatur in his
An in vesti- vesiculis, præter autoritatem Fallopi-
culis conti- Plateri, Laurentii, Aquapendentis. & C.
neatur se- serii patet ex hac experientia: si preman-
men. tur, statim semen ad fistulam virgæ ex-
primitur, sicuti lac ex mammâ, lotium

An prostata ex vesicâ &c. At si prostatas digitis cor-
ta semen primas, nihil tamen exit, absque vesicu-
contineat. larum compressione.

Post constitutas vesiculas seminales
vasa illa deferentia deinde uniuntur in
unū exiguum ductū, qui in prostatas abi-

PROSTATÆ autem quasi antestantes
glandulæ duæ, quarum
una est ad radicem penis supra sphin-
cterem sive muscolum vesicæ, utrinq; ad
collum. Columbo dicuntur para-
prostatæ, Vesalio glandosum corpus, Fallo-
pio glandosum assistens. Alij testiculos
dicunt ad differentiam testium.

Anteriùs & posteriùs sunt depressæ, ad
latera rotundæ.

Substantiam habent spongiosam, du-
ram tamen & albidiorē quā aliæ
glandulæ, membranaq; involvuntur den-
sa; & hæc omnia, ne oleosus, & alias
humor penetrans humor exsudet & diffu-
dat & quia sensu sunt exquisito, in cōgres-
su voluptas excitatur Patent hæ glandu-
læ poris quibusdam in urethram Quia

Usus earum est continere humorem o-
leum, lubricum & pingue, qui ex-
imitur cum opus est, ad meatū urinari-
um illinendū, ut defendatur meatus hic
a crumonia seminis vel urinæ, & ne ex-
ccatus confideat; sed lubricus maneat;
quando quidē per eū in coitu subitō & si-
milis humor iste unā cum semine exit.

Hæc voluit Galenus, quando dixit in iis
contineri humore quēdā, spermati similē;
sed longē tenuiorē, cuius humoris usus sit
ad Venerē excitare, & in coitu delectare.

Inte-

Interim alii sunt, qui semen continere putant; alii, ut Laurentius, utrumque vult enim *πρὸς ἄρας* & semen incrare, & tenuem humorem gignere ad titillationem excitandam.

Prostate non faciūt ad seminis generationem. Sunt alii, qui putant facere ad seminis generationem, quod si verum esset, ut que castrata etiam generarent.

CAPVT XXIV.

DE PENE.

Membrum virile seu genitale communiter *PENIS* dicitur, à pendendo item *virga*, colis &c. Alia nomina lent imponi plurima, quæ reticere præstat, quàm nominare. Plato in *Timæo* voluit esse animal quoddam, quod ei insita sit vis generandi appetens. Cæterum est pars & instrumentum animalis visque appetens cerebro insita.

Situs est ad ossis pubis radices, ut commodius fieret congressus, & aliis partibus impedimento non essent, estque in medio positus, quia

Numero unicus. Quidam tamen alii quando Bononiæ dissectus, duplicem partem habuit.

Figura oblongè rotundus est; sed non exactè

est, quia in superiori parte, quam
penis vocant, est latior.

Longitudo, quæ in crassitie & longi-
tudine consistit, variat, tum in specie,
tum in individuo. *In specie* homini tanta
quantum ad procreandem sobolem re-
quirebatur: in proportionem verò brevi-
orem quam in multis brutis, ob modum
gressus in genere humano, qui non
more brutorum. *In individuo* maxi-
me est varietas. Nam ut plurimum ma-
gis est 1. in parvis viris. 2. in iis, qui à coitu
continent, si Galeno creditur. 3. Si vasa
bilicalia non proximè ligentur ad
umbilicum in infantulo: alias enim ob
hæc, vesica & vicinæ partes magis
trahuntur. Nonnullis nationibus
longitudo huius membri est insignior.

Penis cur
Constat cuticulâ, cute, panniculo *pinguedi-*
oso, & propriâ substantiâ. *ne careat,*

pinguedine caret etiam in obesissimis *opinio. 1.*
hominibus. Causa verò cur neque in eo, *Laurentij*
neque circa eum adeps reperitur, quæri- *error.*

Alii, ut Laurentius, putant causam
esse, quòd pinguedo mollicie suâ ere-
ctionem impediret: Atqui quàm diu
tempora penis inflata sunt, erigitur penis.
Ii causam dant, ne pondere læderet,
ne penis in nimiam molem excre-
sceret. At si pinguedo parca esset, non pon-
deraret,

deraret, neq; penem nimis amplificaret. Verior ergo causa est, deesse pinguedinem sensus obrunderetur, & voluptas nueneretur, fusâ per frictionem pinguedinem.

Substantia propria non est ossica, quæ admodum in cane, lupo, vulpe; sed peculiaris & propria, qualis nulla est in parte corporis. Quatuor autem sunt propriæ penis partes, Urethra, glans, & corpora nervosa.

URETHRA seu *fistula urinaria* est callosus nervosus, eiusdem semper amplitudinis, à vesicæ cervice (unde prodit quam longior aliqua cervix) ad extremum penem; nisi ubi glans cum nervosis corporibus jungitur: ibi enim superficialem habet cavernulam, in qua quando humore erodente collecto, gonorrhæa vel aliunde fit ulcus & dolor intolerabilis.

Urethram hanc amplectuntur corpora penis & contingunt, sub quibus ponitur & unâ cum iis reflectitur, atq; deinde glandem exporrigitur, designans hæc ratione figuram literæ S.

Duplicem autem *membranam* & *substantiam* insuper habet *propriam* urethra.

Una membrana est interna & tensa, quâ etiam glans integitur. altera externa

tenosior ex fibris transversis, Substā-
tū propriæ medium est laxum, spongio-
sum nigricans, ut cū corporibus nervo-
sis consistendi queat.

Urethræ est, ut sit ductus commu-
nis urinæ, seminis & humoris oleaginosi.

ANUS vel caput penis est pars exte-
rior, subrotunda vel turbīnata, æ-
quata, coronæ modo circulo cincta.

Membranam habet sensilem magis & soli-
diorē, quā in reliquo pene est, tenuis-
simam membranā intactam.

Sollis est, & exquisiti sensus, pruritus

in aliis acutior, in aliis obtusior.

Volucro vel tegmine donatur, quod
preputium dicitur, à putando, & inferiore
glandi alligatur per membranam
vinculum quoddam, *frænum* appellat.

DUO CORPORA NERVOSA, utrin-
que animum, reliquam, & quidem maxi-
mā partem penis constituunt: quæ sub-
stantia tota est quasi crassissima arteria,
cavosa carne infarcta.

Duplex enim est substantia, prima ex-
terior, quæ densa, dura & nervosa; alte-
rior interior fungosa, rara & cavernosa,
ex nigro subrubra, unde Vesalius ait,
interiorem plurimo nigricante sangui-
ne affar farciminis.

Rara

*Vnde peni
induratio
& erectio.*

Rara autem est hæc substantia, ut pleri possit spiritu & sanguine utroque quod dum fit, nervosa substantia m- tenditur, & efficit, ne spiritus dissipetur, unde penis induratio, ac que erectio, non tam coitus cau- quam ut recta & longissime semen v- jaculari queat, ad uteri orificium, p- facto virilis membri intra muliebren- num motu.

Hæc duo corpora oriuntur ex i- rioribus ossium pubis partibus, tanqu- à firmo & stabili fundamento, ubi in- ortu invicem dissident, ut uretræ l- detur, deinde sursum feruntur, & ossis pubis medium coalescunt, non t- dem utroque corpore manente inte- sed amittunt de nervosa substantia- tertiam circumferentiæ partem: di- eta tamē manent intervētū alicuius- mēbranei, tenuissimi & pellucidi, ne- sis & robustis fibris transversis firm- quarum fibrarum series est instar p- nis textorii.

Vasa omnis generis penē ingrediūtū- na & arteria i. externæ & cutaneæ fre- res: deinde interna & per corpus dist- sa. Male ergo venis destitui penem- dam putant. Arteria internæ sunt inf-

ones, ab hypogastricâ ortæ, quæ in-
 tur ad inirium coalitus corporum, &
 bndum longitudinem penis dissemi-
 mur. In medio autem, ubi septum re-
 is est, per spacia fibrarum ramulos
 inde mittunt, dextra arteria in si-
 num corpus, & sinistra in dextrum,
 tum vehentes ad inflandum & eri-
 dum penem. Nervi ab ossis sacri me-
 a etiam per renem disseminantur, tã
 rni & cutanei, quàm interni, ut ex-
 itus sensus & delectatio adsit.

Musculorū etiam duo paria habet penis.
 primum par brevius & crassius penem e-
 ns oritur nervosum sub penis princi-
 ab appendice coxendicis, & carno-
 fertur ad penis corpora, in quæ non
 cul ab exortu inseritur.

*Penis mus-
 culi.*

sus est penem erigere, flectere & susti-
 ne in congressu.

Secundum par Vrethram dilatans est lon-
 . Oriuntur hi duo muscoli carnosissimi
 in tere ani secundum longitudinem
 is: subtus deinde feruntur, & ad late-
 rethrae circa medium inseruntur.

is est inferiorem urethrae partē dilatare,
 in in mictione, tū præsertim in coitu,
 undo corpora penis repleta sunt, ne se-
 nis exitus cohibeatur. Atque inter hos
 muscu

musculos locus est, ubi calculos ex-
hant communiter Chirurghi.

Coitus.

Usus penis est ad coitum: qui à viro
dè fieri nequit absque erectione puc-
di, & hanc consequente seminis ex-
tione. Vir enim $\sigma\pi\epsilon\rho\mu\alpha$ rectè ejacul-
ad os uteri, ubi postea iunctum cum
mine fœmineo, & ab utero attra-
quando est & retentum; conceptus
ctus esse dicitur.

Conceptus. Secundarius *usus* est ad emittenda
rinam; ob quam tamen non est fac-
cùm sine eo fœminæ lotium co-
nant.

CAPVT XXV.

DE PARTIBVS M- liebribus Generationi in- vientibus, & primò de Vi- lis spermaticis præpa- rantibus.

PArtes Muliebres generationi
vientes nonnullæ conveniunt
dammodo cum virilibus, ut vasa sper-
tica, testes, & vasa deferentia. Aliæ
planè discrepant, ut uterus cum
orificio & collo, hymen, caruncula

*Muliebria
genitalia
à virilibus
penitus dif-
ferre.*

anes & vulva cum alis, clitoride, &
nuculis.

neque enim existimandum est cum
no, Archangelo, Fallopio & aliis, hæc
rebra dicta membra à virilibus non
re nisi solo situ. Quæ opinio nata
aliis, qui putarunt, fæminam esse tã
virum imperfectum, & ob frigidi-
m membra generationis non potuis-
eras protrudi; quemadmodum in vi-
majoris caloris extra propelluntur.
eterum muliebres partes non tan-
situ à virilibus differre, sed universã
turã, quoad numerum, superfici-
magnitudinem, cavitatem, figuram,
um & usum, satis manifestum est
o Anatomico, & cuivis, qui sequen-
ec cum præcedentibus conferre ve-

fatis apparet opinionis eorum falsi-
x multiplici, quam afferunt, con-
rã. Quidam enim uterum scroto vi-
similant, quidam glandi penis. Pe-
rili aliqui uteri collum respondere
nt, aliqui clitorida. Quæ omnia pro-
fragilitate cum concidant, ad expli-
onem partium accedimus.

*Similitudo
penis cum
utero ine-
pta est.*

ASA SPERMATICA PRÆPARAN-
n mulieribus numero, ortu, officio &c.

I 2

le ha-

se habent ut in viris. Quomodo autem differant, nunc duntaxat dicendum

Differunt, primò *Magnitudine*, M
bria hæc vasa sunt breviora ob brev
viam, sed ideo etiam anfractibus
bus corpus varicosum constituent
pollent: quò diu satis semen immo
& præparetur. Deinde *insertione*.
in mulieribus non tota ad testes
tur, sed in medio dividuntur itinere
major pars ad testem abit, corporu
ricosum constituens; minor in ute
finit, in cuius latera disseminatur, p
puè verò ad superiorem fundi po
nem, pro nutritione uteri & conce
& ut per ea vasa menstruorum par
qua in non gravidis expurgeretur.
ob causam in mulieribus vasa hæc
excidunt peritonæo, neque os publi
tingunt: quia testes & uterus intus
sunt.

Venæ istæ & arteriæ sem
pluribus mirabilibus anastomosibus
plicantur ad seminis præpa
rationem.

CAB

CAPVT XXVI.

DE TESTIBVS
fœmineis.

TESTES verò MULIEBRES, licet
conueniant cum virilibus; in
tamen, quo ad structuram, diffe-
rent. quidem.

quem habent intrinsecùs in cavi-
dominis, supra fundum in non-
is: nempe ut calidiores sint atque
fecundiores; cùm materiam ela-
debeant, ex quâ solâ homo gene-
buit, accedente virili semine, non
teria, sed ut efficiente.

agnitudine, quæ non tanta in mu-
is.

superficie extèrnâ, quæ inæqualior

figurâ, quæ non ita rotunda: sed an-
posticâ parte lata atque depressa

Magis etiam testes sunt interùs ca-
repleti magis humore sperma-

Substantia, quæ putatur nonnullis
esse quàm in viris, nonnullis, mol-

*Cur testes
muliebres
intus sint.*

6. *Temperamento*, quod putatur communiter esse frigidius, & semen conditum humidius, tenuius & aquosius.

7. *Integumentis*. Nam integuntur tantum tunica: quia alias in loco abdito: & illa validissime adhæret, ait Galeno δαῖτρος dicitur. Interim ubi seminalia testes admittunt, quoad maiorem partem à peritonæo investiuntur.

Vsus est, elaborare semen: quod contra omnem rationem & experientiam multis viris denegare ausus fuit Aristoteles in locis nonnullis. Alii etiam Anaton quidam negant, testes semen elaborare.

CAPVT XXVII.

DE VASIS DEFERENTIBUS.

DE vasis semen deferentibus nihil adhuc autor quidpiam veri potest scripto prodidit, ut patet ex sequenti descriptione.

VASA ILLA DEFERENTIA sunt meatus seminis, alias quoad figuram & substantiam deferentibus similes, ab utero fundo nascuntur una extre-

neque vasa, nec proveniunt altera ex-
tate ad testes, aut ullam aliam par-
tem. Ideoque hac alterâ extremitate non
nervia, sed occlusa & cæca, ut sint
intestini cæci, & quasi appendix

mero duo sunt hæc vasa, utrinque u-

in suo testes ex dimidio ambiunt, sed
que à testibus distant: atque

figurantur saltem per tenuissimas me-
bras, alis vespertilionum similes, per
venæ & arteriæ multæ disseminan-
tes in testibus in hos meatus delatæ, & se-
cundum ex testibus huc transferentes.

Substantiâ sunt nervosâ, albâ, densâ
et durâ,

figurâ teretia & cava, quemadmodum
in viris.

Ductus eorum non est rectus, sed fle-
xuosus, quia via est brevis, à testibus ad
uterum. At voluptas non debebat esse
brevis, quando semē in coitu confertim
mittitur à testibus in uteri cornua. Et
modum in viris sunt vesiculæ seminales,

I .

semen

semen asservantes; id in mulieribus cum sæpè coeant & semen emittant, esse possunt cæci hi meatus: sunt enim annexi testibus per membranulas, ut per vasa ad se à testibus translata, tanquam per venas mesaraicas facillè trahant. Et cum ab ipsis semen, & in se recondant ad usum.

Ab ortu ad uteri fundum *ampla* sunt & in progressu ad finem angustantur, & in extremitate aliqualem amplitudinem retineant. Dico ab ortu: aut si inferi dicantur, nihil refert.

Vasa verò hæc in sola uteri latera, quæ cornua dicuntur, inferi opinio est Galeni & fere omnium exercitatissimorum Anatomicorum, qui aliam insertionem se reperire non potuisse profitentur, inquit Galenus aperte negat. At Laurentius gloriatur se invenisse ductum aliquem alterum, qui non in fundum, ut præ-

*Inferio de
ferentium
altera &
nova Varo
li & Lan-
rentij.* cervicēabit: adeò ut cujusq;, sed in venteris pars una brevior sed amplior in sui lateris medium cornu inseratur & ibi in uteri capacitatem semen peccat. Et coctum effundatur: Altera venteris pars angustior & longior, secundum uteri latera feratur infra os ad cervicis inferum. Varolus autem hujus alterius par-

non meminit, aitque eam in iis, quæ
conceperunt, adeo exiguam esse, ut
nisi à perito Anatomico observetur,
avidis verò esse amplissimam. Hoc *Per quam*
est, per istum ramum indubiè *viam præ-*
gnantes *semen emis-*
longitudinem majorem delectatio-
habebunt: ut uterum pertransire *tant.*

fit opus. Sin minus: non adeo ab-
dum erit semen ex utero venire, et-
fætu ibi existente: Nam non adeo
cta est clausura oris uteri post conce-
um, uti uno ore omnes asserunt: sed
erfœrationum variarum exemplis
urantur.

Fallopius hæc vasa deferentia aliquo
odo recte videtur descripsisse, sub no-
ne tubarum; sed si conferantur cum
quæ diximus, apparebit eum aut rem-
on penitus intellexisse, aut alienum
ippiam à re proposuisse.

Vsus est, semen deferre à testibus ad u-
rum, præsertim in congressu, ubi per
ornua uteri in cavitatem eiusdem ejici-
ar, & ore uteri aperto in cervicem exi-
ns, virili occurrit, aut statim in cervi- *Semen in*
em per alteram viam angustam, si adest, *coitu quod*
fici poterit. In congressu ergò verissimi- *effunda-*
e est (sive hic ductus adsit, sive non ad- *tur.*

fit) in cervicem semen muliebrem effundit, & virili occurrere, dum muliebrem, re uteri aperto exitum quærit, aut per alteram viam angustiores intrat.

CAPUT XXVIII.

DE VTERO IN
genere.

VTERUS ab Utre ob cavitatem dictus, matrix etiam dicitur, utriculus, & loci. In aliis animalibus testis Plinio, vulva dicitur, præsertim suilla, quam veteres Romani in delitiis habuerunt: quæ de re videantur Plutarchus Langius in epistolis.

Situs est in hypogastrio, seu infima parte imi ventris, quæ in cavitate, quæ pelvis dicitur, constituitur ab osse sacro & ossibus ilei: quare pelvis illa in fœminis amplior est: unde etiam nates habent gradus.

Cur in hypogastrio positus uterus. diiores & ampliores. Situs autem ratione esse debuit, ut distendi uterus pro fœtus magnitudine posset, & commodè etiam excludi infans.

Deinde in medio locatus est uterus ad nullum inclinans latus, nisi aliquando, dum utero gestat mulier masculum.

cornellam; tum enim dextrum vel si-
mum magis occupare solet.

Consitus vero est inter intestinum re-
ctum subjacens, & vesicam incumben-
tem, tanquam inter duo pulvinaria.
Sed ergo superbimus, qui inter ster-
cus & urina nascimur?

Magnitudo consideratur in longitudi-
ne, latitudine & crassitie. variantque hæc
pro ætate, pro ratione corporum, ætatis, &
civitate.

Longitudo in iis, quæ mediæ staturæ
sunt, & Venere utuntur, à pudendo usque
ad fundi finem communiter est undecima
digitorum; fundi verò trium.

Latitudo fundi duorum aut trium di-
gitorum; quia in non gravidis eadem est
latitudo fundi & cervicis. Atque hinc
latitudo facile conjici potest.

Sed virginibus, quæ nondum *con-*
venerunt, parvus est, & vesicâ minor;
perfectis major: quibus tamen à Venere
continentibus, uti & vetulis satis parvus,
& crassus est. At major in illis, quæ sæpè
conceperunt, & utero gestarunt: ut ma-
nu comprehendi quasi possit, nisi quando
im gravidæ sunt: tū enim magis magisque
amplifi-

amplificatur, & cum ante ingravidationem sacri ossis initium non superavit fundus, postea ad umbilicum & ultra etiam extenditur, ut tenuibus intestinis incumbat.

*Gravidis
an attenu-
etur ute-
rus.
Error Ga-
leni & Ve-
salij.*

Crassities uteri eodem modo variatur. Nam in virginibus tenuis est substantia in adultioribus crassior; & quo sæpius mulier uterum gessit, eò crassior est uteri substantia. Mensibus fluentibus crassescit uterus; & quando instat mensium excretio, tumida & crassa apparet uteri substantia. In gravidis, Galenus, Vesalius, aliique Anatomici putant uterum quo magis extenditur, eò magis attenuari, crassitudinem in longitudinem absumi, ut loquitur Galenus. Sed ocularis experientia refragatur, & autoritates Arantii, Varoli, Plateri, Bauhini, Heurnii, Rossetti, & Laurentii. Nam à primo conceptu usque ad partum augetur secundum omnes dimensiones, & uti amplior, sic crassior paulatim redditur & mollior, ita ut postremis mensibus duos digitos crassa sit uteri substantia. Adeò tum uterus à membranea substantiâ abit, & rubra fit, fungosa & spongiosa substantia, moreque pumicis foraminibus perforata, in multos quasi cortices divisibilis:

quod

Id fit ob affluxum sanguinis & spiri-
m pro foetu copiosum. Craffissima
est uteri substantia circa orificium,
narrow quod angustum; unde admi-
randa illa in partu dilatatio & postea co-
ntractio.

figura Uteri aliis rotunda statuitur, a-
liis pyriformis. Sed licet ad rotundam
propinquant, quò capacior sit uterus; tamen
differtimus cum Sorano & Fallopio fun-
dum cucurbitulæ optime assimilarì pos-
sumus quia fundus rectà deorsum sensim
angustatur. Collum verò uteri canalem
longum & rotundum repræsentat.

*Vera Uteri
figura.*

Connexio vel est Colli uteri, vel fun-

Collum vel cervix suâ substantia &
membranas alligatur; fundus verò
ligamenta peculiarìa.

A parte anticâ adnascitur cervix vesti-
buli urinariæ & ossibus pubis per mem-
branas à peritonæo ortas. A posticâ,
si sacro, & intestino recto cum aliquâ
conguetudine; circa pudendum verò cum
peritonæo coalescit. Ad latera per membra-
nas peritonæo laxè necitur.

Fundus sua substantia non annectitur, *Ligamenta*
liber est, quia moveri debuit, ut in *utero*,
dicitur; ad latera verò annecti-

tur

tur per ligamentorū duo paria, quorum
sus, uterum suspensum tenere.

*Proci-
dens
utero
inde.*

Vnum par superius est, latum & men-
branosum. statuitur à musculis lumborum
ortum; definit verò in fundum uteri
prope cornua. Laxum & molle est,
extendi & contrahi queat. Aliqui vespe-
tilionum alis assimulant. Atque huius
paris beneficio alligatur fundus ossibus
ilii. Verum quia fibris carneis intertec-
tum est, musculos esse fortè non immi-
ritò statuunt Vesalius & Archangelus.
Laxatur autem aliquando hoc sive lig-
amentorum sive musculorum par (ut per-
vim, difficultatem partus, pondus foetus
&c.) ut fundus uteri in sinum decidat
& inversa aliquando cervice: atque al-
quando extra propendens abscinditur
ubi ramen accedat necesse est quoque si
lutio connexionis colli.

Alterum par inferius est, rotundum instar
lubricorū, subrubrū instar musculorū,
cavum, maximè in fine. Hoc in initio ra-
gens vasa deferentia ad inguina ascendit
& sicut vasa spermatica in viris, sic ha-
ligamenta in mulieribus per processu
peritonæi & tendines musculorum oblo-
que descendentium abdominis transeun-

atque

in adipem ibi, membranasve ossi-
o oblitterantur prope Clitoriden. e
musculi alii duo incipiunt extra ab-
men tenues latique, totā internam la-
cium faciem investientes; quorum
quædam mulieres labra mas-

Substantia uteri membranosa est, ut dis-
ri & contrahi pro necessitate queat.
Instat autem *membrana* communi &
propriâ,

communis duplicata est, & lateribus *Membrâ*
inque adnata, à peritonæo orta, *cras-* *na uteri.*
ma & validissima ad robur.

propria & interna etiam duplex est; li-
hoc non facile ob arctam adhæsi-
on discernere liceat, nisi in exulceratio-
eius. Inter utramque autem fibræ
molæ, quales in ventriculo reperim-
ad sunt: quas alii propriam vocant
ri substantiam & *παρέγχυμα*: estq;
as ad calorem uteri. Sed hæ membra-
non semper eiusdem sunt crassitiei,
suprà de magnitudine dictum.

Vasa uteri sunt venæ, arteriæ & nêr-

Vene

Venæ & arteriæ se invicem comitantur illæ tamen hi smajores, feruntur inter teritunicas. Suntque duplices: Aliæ supernè oriundæ, aliæ infernè. Nam superioribus & inferioribus partibus, est, à toto corpore venire debet, tum ut in mensibus totum corpus expurgaretur, tum ut tempore gestationis fœtus nutriretur. Quæ supernè veniunt, uteri corpus totum, sed fundum præcipuè perreptant, suntque rami ex venarum principalibus derivati, antequam vasa præputantia constituentur. Termini venarum

*Cur uteri
venæ sinis-
træ cum
dextris jun-
guntur.*

sinistri cum dextris junguntur: ut dextra etiam serosa humiditate stimuletur voluptatem sentiat. Per hos sancti menstruus funditur in non gravidis. Venæ ab infra veniunt, & ascendunt cavæ ramis hypogastricis oriuntur, suntque majores, & uteri collum perreptant & infimam fundi partem, ubi cum superioribus ubique junguntur. Nam per fundum lata admodum uniuntur extra, & in ipsius uteri substantia.

Anastomoses in utero.

ἀναστόμωσις magis apparent in non gestantibus & gravidis. Harum venarum scula cavitatem fundi subeunt, quæ tabula dicuntur, item cotiledones: hiant & aperiuntur, cum menstrua

ar: & in gravidis, ubi epar uterinum
 iungitur (in brutis verticilli) sangui-
 nis auriens pro foetu. Et quia in col-
 luteri ab his venis rami feruntur, *Gravida*
 eos gravidæ plethoricæ menstrua per quas
 ere possunt primis mensibus, ubi *vias men-*
 sanguinis suppetit, quam pro foetu *strua emis-*
 silest. Illum enim sanguinem ex ute- *tant.*
 nire non est probabile: nam foetus
 icaretur; & ex nimia oris interni-
 one abortus sequi posset.

otandum autem venas uteri tem- *Magnita-*
 gestationis adeò turgere sanguine, *do venarū*
 æcipue circa partum, ut emulgen- *uterinarū*
 amplitudinem vel venæ cavæ me- *in gravi-*
 induant. *du.*

nervi complures feruntur ad uteri
 m & partes circa pudenda, ad vo-
 stem: nec non ad fundi partem in-
 terem: unde consensus uteri & cere-
 magnus. Ad fundi partem supre-
 a pauciores feruntur nervi, ii que re-
 modo invicem impliciti.

Uteri & Vfus est attrahere & re-
 e semen muliebri a testibus expul-
 , & virile a pene injectum. Hoc u.
 que, inquam, semen in fundum

K

trahi-

trahitur, retinetur, conservatur & for-
tur, unde conceptus. Est enim mater
instar horti vel agri semen excipient
conservantis, & alimentum suppeditans:
ideoque Aristoteli naturæ cam-
vocatur. Nam & uterus ager est gene-
tionis, locus vel materia in quâ, sup-
ditans simul alimentum, imò etiam ma-
teriam ex quâ spirituosâ verò semini-
rilis substantia est architectus, qui opus
absolvit.

Ulteriùs actio uteri statuitur n-
tus quidam naturalis: unde Plato u-
rum animal esse voluit, & Aretæus au-
lut animal in animali ob motum. N-
in coitu & appetitu concipiendi uter-
nunc sursum nunc deorsum move-
Motus ma- & ad penem hiat instar animalis. De-
tricus. sum item movetur ad fœtus & secun-
næ expulsionem tanto aliquando
petu, ut procidat.

Deinde rebus odoratis movetur
gaudet & oblectatur: at fœtentia, ut
storium, assam fœdidam, &c. fugit.
Hinc Aristoteles ait, gravidas mulieres
ad odorem extinctæ lucernæ ab-
ire.

Sed uterus odores sentit non sub *Cur odora*
 ris specie, sed afficitur ratione con *is movea-*
 sta materiæ tenuissimæ, & vapo- *ur ma-*
 . Sicut etiam videmus recreari o- *trix, & an*
 es spiritus à rebus bene olentibus, *sentiat odo*
 ratione odoris, sed vaporis conjun- *res.*

qui spiritibus familiaris est & acce-
 . Unde citius partes genitales af-
 untur, quia acerrimo sensu sunt
 litæ: & quia bene olentia bonos &
 os vapores habent conjunctos; fœ-
 a verò tetros & fœdos; ideo ab
 spiritus impuriore redduntur, &
 spiritibus refertus sit uterus, hæc
 atur, illis gaudet.

Reperiuntur verò mulieres pra- *Cur quid*
 habentes uterum, quibus svaviter *busdā mu-*
 ia hystericam passionem pariunt, *lieribus be-*
 la verò sanant: quia his irritata na- *nè olentia*
 unā cum fœdis vaporibus hisce *noceant.*
 riam morbi excutit. Illis verò ex-
 tur in utero vapores terri prius la-
 ces, ut ascendant ad diaphragma,
 cor, cerebrum &c. unde ute-
 ri strangula-
 tus.

K 2

GAPTE

DE VTERI FV
do, & ore.

DE utero in genere hucusque
mus, eiusque partibus similari
Sequuntur dissimilares *partes*, in
eum dividimus: videlicet *Fundus*, con
seu *cervix*, & *sinus pudoris*, cum partibus
annexis.

FUNDVS est pars ab orificio inter
usque ad finem ascendendo. Dividitur
eum in partem angustam inferiorem
amplam superiorem; cui tertiam
tem, videlicet os addimus.

Angusta inferior est inter os uteri
amplitudinem incipientem, a
COLLUM BREVE vocari potest
differentiâ veri & longioris colli.
antequam amplitudo fundi incipiat
ter hanc & os interius, intercedit
alterum collum, vel angustior canalis
quàm est amplitudo fundi, idque
hominibus & in brutis. Et hanc partem
cervicem vocatam fuisse à veteribus
Galeno, Sorano &c. vult Fallopius
næo hæc pars est pollicari longitudo
longa. in cervâ nos longam quinquaginta
git. transvers. invenimus.

*Collum u-
teri brevi-
us.*

H

Hujus cavitas non est ampla, sed
 is, quæ stylum majorem, vel par-
 m pennam admittat. Aspera est, ne se-
 in attractum effluat, quemadmo- *Sterilita-*
 in fit in nonnullis sterilibus, quæ *tiis quædã*
 ne partem ob pravos humores lubri- *causa.*
 n habent.

Ampla & suprema pars præcipuè
 N D U S dicitur. Atque hæc pars ute-
 & matrix propriè appellatur, est quæ
 s præcipua, in cujus gratiam reliquæ
 tæ sunt, amplior & latior quàm reli-
 e.

itus est supra os pubis, ut ibi dilatari
 eat.

in homine unicam cavitatem habet,
 e nullis cellulis est donata, uti falsò
 tem cellulas ei aliqui tribuunt. In-
 tis communiter bipartitus est; unde
 ua dicuntur bina binæ istæ in bruto- *Cavitates*
 a utero partes: licet cornuum forma *in utero*
 in omnibus brutis conspiciatur, sed *humano*
 accis, cervis, ovibus, capris &c. *nulla.*
 rnuæ tamen ex imitatione tribuerunt
 m humano utero Autores, quia ad
 ra fundi protuberantia utrinque est
 qua, ubi vasa deferentia inseruntur.
 issimè verò muliebris uterus bipar-
 r sicut in brutis;

Cur in hu-
mano utero
dicantur
esse cor-
nua,

dividitur tamen in partem dextram
sinistram. In illa ut plurimum man-
generantur: in hac foemellæ. Et rari-
ter evenire compertum est, testibus
pocrate & Galeno.

Discernuntur dextra & sinistra
per lineam vel suturam obscure pro-
nentem, quam medianam vocat
stoteles.

Superficies externa est lævis & æque
atque quasi aqueo humore obducta
terna multis porositatibus gaudet,
ora sunt, per quæ tempore gestationis
sanguis facile ex venis uteri exeat,
nutritione foetus.

Vsus est semen recipere, foetum con-
nere, nutrire &c.

ORIFICIUM vel OS INTERIUS
oblongum est & transversum, seculum
gustissimum (quando verò dehiscit
bicolare fit & rotundum: unde fornicato-
stetrices Germanæ vocant *die Rose* os
sam, Gallicæ verò, coronam; le co-
nement de la mere) instar foraminis
glandis penis, ne intret nocivum
quod; nec exeat facile attractum
men.

Situs si immutetur, ut non in m-
recta fundum respiciat; ad illud

semen ejaculari non posse putatur,
semen potius refluere quàm concipi.
hanc deest, quod raro sit, sterilitas o-
no incurabilis causatur: uti & steri-
fit, si aliter afficiatur, videlicet can-
schirris, obstructione, callositate,
ia pinguedine: præsertim nimia hu-
statione & relaxatione, vel ex nimio
gressu, ut in scortis, vel ex nimio
fluvio humorum.

*Sterilitatis
quædam
causæ.*

in gravidis viscosa, & glutinosa ma-
nana scitur orificio, & collum breve
opplet; ut humectatæ hæ partes fa-
is in partu aperiantur.

per hoc orificium uterus semen attra-
quo concepto claudi dicitur: & vul-
quidem ajunt ita claudi, ut ne specil-
iem aut acum intromittat. At resc-
in superfætatione, pravi conce-
salvo fœtu ejectione, quæ inter-
a fit; emissionem seminis, & præser-
admirabili modo aperitur in partu;
pro fœtus magnitudine dilatari de-
ut æqualis ferè cavitas sit à fundo
ri ad pudendum, per quam fœtus ex.

*Vsus oris
cuj uteri.*

Et hoc, inquit Galenus, mirari pos-
nus, intelligere non possumus. Et idē
monet agnoscere nos debere sapien-
& potentiam artificis, qui nos cons-
navit.

*Os matri-
cui quando
aperiatur.*

CAPVT XXX.

DE VTERI COLLE
Majore.

IN uteri fundo tria observavimus; scilicet *collum minus*, & *orificium*. In collo majori itidem tria occurrunt; scilicet *Collum ipsum*, *hymen*, & *os vesicæ*. De *hymene* verò sequente agemus *capite*.

COLLUM, cervix sive canalis *uteri*. Aristoteli aliquando etiam *matris* dicitur, & uteri ostium, Fallopio *sine pudoris*. Estque canalis oblongus. *Situs* inter os externum & internum *penem* recipiens instar *Vaginæ*.

Figura. Contortum nonnihil & oblongum est *collum*, brevius item & angustius, quando laxatum in se concidit; partes internæ non refrigerentur. rectum est & ampliatum. 1. In *confluxu*. 2. In fluxu menstruali. 3. In partu, admodum distenditur ad fætus formam; unde etiam parturientium summus calor: & tum, uti & in menstruis, non refrigerantur *fœmina*.

Magnitudo. Longitudo communiter
 octo digitorum. Latitudo est qualis
 intestini, Sed adeò variant longi-
 tudo & latitudo, ut difficulter describi
 possunt. Nam in congressu ad virgæ
 magnitudinem se accommodat, fitque
 vix hæc longior vel brevior, latior
 angustior, & pro fœminæ libidine
 turget: quod dum fit, carunculæ
 tuberculant à spiritu replente, quemad-
 modum apparet in vaccis & canibus la-
 ventibus; canalis verò arctatur, &
 minor redditur, uti & in coitu; ut pe-
 nis arctius comprehendat: ideo

Substantia est & ex carne durâ ner-
 vaque, & nonnihil spongiosa & fun-
 da, ut penis; ad dilatationem & constri-
 ctionem. Intus superior pars rugosa
 eadem est, quando non distenditur, ac
 compliata, lubrica est & magis lævis. Cæ-
 rum etiam in diducto collo rugæ or-
 culares sunt & multæ, in principio
 canalis prope pudendum, ad majorem
 electionem ex titillatione ab attritu
 mandis factâ. Et in juvenculis rugæ ar-
 tiores sunt. cervixque angustior, per
 quam menstrua expurgantur, etiam in
 virginibus adultioribus. Verùm rugæ

*Rugæ in
 Collo ute-
 ri.*

K s. oblite.

obliterantur, & latera callosa fiunt, que lævia, ob factum crebrum attritum
 1. in Vetulis. 2. In iis, quæ multum co-
 cubuere, aut peperere. 3. In iis, quæ lo-
 go fluxu laborare menstruali vel le-
 bo. Atque in his omnibus substantia
 iam fit durior, ut quasi cartilaginea ta-
 dem evadat in vetulis & quæ sæpè co-
 ceperunt. At in juvenculis mollior
 atque delicatior.

Vsus Colli est membrum virile
 rectum recipere, ad prolectandum
 men.

Tandem ad finem colli anticâ partem
 non longè à vulvâ in conspectum veni-
 VESICÆ INSERTIO, ut urina ibi per
 communem ductum expurgetur. A t
 go verò ingressus vesicæ occurrit mem-
 brana HYMEN dicta: de qua mo-
 agendum.

CAPVT XXXI.

DE HYMENE.

HYMEN seu membrana eugio-
 dicta, claustrum virginale aliis aen-
 pellatur, item flos virginitatis; qu-
 cum adest, virginitatis nota est.

An vero detur aliqua virginitalis nota, Dari reve-
bium esse non debet. Experiuntur *ra aliquā*
nim omnes, qui virgines uxores du- *virginita-*
nt, obstare aliquid, quo minus abs- *is notam.*
te magna vi & impetu virga intruda-
r. Vnde Terentius ait, primam coi-
onem esse acerrimam. Et hæc cum fit,
plurimum cum magno dolore san-
is egreditur, paucior vel copiosior:
nem etiam sanguinem *florem virginitalis*
cant.

Nam ob dilatationē angustioris col- *Cur primo*
& lacerationem hymenis, omnes vir- *coitu virgi*
nes primo coitu dolorem & sangui- *nibus dolor*
s profluxum habent. Iuenculæ *& hemor-*
idem illum majorem, hunc mino- *rhagia.*
n, ob hymenis siccitatem & vaso-
m exilitatem: Adultiores vero men-
uaque expertæ, illum minorem, hunc
majorem, ob causas contrarias.

Si vero menstrua fluant, aut paulò *Exceptio.*
te fluxerint: ob partium relaxatio-
nem facile penis intromittitur, unde
pucus aut nullus dolor, paucus etiam
at nullus sanguinis profluxus. Ideoq;
m temporis nō instituendæ sunt nu-
iæ, ne virginitas sponsæ suspecta spon-
reddatur.

Quid sit
Quid verò sit quod obstat & prohi- *virginitas*
et virgam ab ingressu, hoc est, qua in- *is nota.*
parte

parte virginittis nota consistat, opinio-
nes & discrepantiæ variæ sunt:

Opinio I.
Arabum.

I. Arabes Hymenem dicunt esse co-
tonem efformatum ex quinque venis
colli medium, utrinque insertis, ita
dextrarum venarum oscula cum sinistra
jungantur.

Hæc ficta sunt.

Opinio II.

II. Alii latera colli adhærescere
tuere, in cujus distensione vasa rumpantur,
quæ ibi feruntur.

Sed hoc contra experientiam est, quod
testatur etiam in minimis puellulis
virginitatem collo adesse, nec latera cohæ-
rere.

Opinio III.

III. Alii membranam transversam
Et hoc quidem rectè. At falsò, qui
bri modo perviam finxere, & in extre-
mitate infimâ sinus locarunt: per quam
voluerunt urinam emitti.

Opinio IV.

IV. Recentissima omnium opinio e-
Severini Pinæi, chirurgi Parisiensis
ritissimi, qui integrum libellum de
tis virginittis conscripsit, alioquin non
inutilem. Habet verò ille pro hymenem
quatuor carunculas myrtiformes, per
membranulam vinctas, in exteriori
nu positas, de quibus postea. Et cum
hodie nonnulli viri docti sequuntur.

V. sententia

*V. Opinio
multis au-
toritatibz
firma.*

Sententia communior est, hyme-
nem esse membranam transversam in-
ter in collo uteri, paulò supra collum
cervicis, quæ obstat primo penis introi-
tu. Atque pro hac opinione stant expe-
rientiæ & auctoritates plures: & primò
eiusdem quatuor clarissimorum Patavi-
corum Anatomicorum, Vesalii, Fallo-
pi, Aquapendentis, Casserii. Et vetu-
tas ferè tota non ignoravit. Vnde autor
sæpius carminis antiqui:

*Est magnum crimen perrumpere virginis
hymen.*

Astipulatur Archangelus, Alex-
ander Benedictus, Wierus. Cogne-
vit idem & Carpus, nec ignorasse vide-
tur Scaliger exerc. 175. sect. 1. ubi loquū-
tur de radice quadam mirificè ad Vene-
rem faciente. Ait enim: *si quis super ea
urinam reddiderit, illico turgere libidinibus
incipiunt: virgines, quæ præsumt pascuis, si super
sedent, aut urinam faciant, eæ perinde
incipiunt naturæ membranam, atq; si à viro fue-
rit vitiatæ.* Columbus ter invenit, Bau-
hinus bis, uti testatur in libro de particu-
laribus similaribus, & in institutionibus as-
serit videri. Wolfius Pataviæ se in-
venisse testatur. Nec opus est omnium
auctoritates huc afferre.

Quod

*Refutatio
eorum qui
negant se
per inveni
ri,*

Quod verò in his Columbus & Paracelsus negant semper inveniri; Laurentius vero nunquam se invenisse asserit: impetandum est inopiæ cadaverum, aut negligentia in dissectionibus: aut si putaverint se virgines secuisse, defloratæ forte fuere: aut si virgunculas: illæ quæ que digitis nonnunquam ex petulantia eam rumpere possunt. At si dicent se locuisse abortus, puellulas bimas, trimas &c. Respondemus, non credi facile posse in illis deesse: cum autoritates experientia peritorum Anatomicorum citatorum adversentur. Deinde si istiusmodi aliquando deesse deprehensum est, de quo dubitatur: eodem jure quo illi dicunt præter naturam adesse hanc membranam: nos dicemus præter naturam abesse. Raro enim deest, ut plurimum adest. Alii verò nobis contrariantur & Laurentio consentientes, ut Capivaccius, tanquam parum Anatomici rejiciuntur.

Hisce ita præfloratis, ad structuram huius hymenis seu membranæ transversæ accessum faciemus.

Situs est in collo uteri, propè finem, in tergo colli vesicæ insertionis, vel paulò interius, Atque ibi hæc membrana in-

stat

per diaphragmatis per transversum sita

Figura. In medio est instar annuli perforata, ut minimi digiti apicem in adultis intromittat, per quod foramen menses effluant.

Verum hoc foramen tripliciter inspectissimè Aquapendens, quemadmodum ex ipsius ore hausimus.

Ut naturaliter sit constitutum, & respiciat foramen vulvæ.

Ut superius appareat, & non vulvæ respiciat.

Ut in medio non foramen sit rotundum, sed rima oblonga.

*Foramē hy-
menis me-
dium va-
rius.*

Rarum vero est hymenem esse absque ullo foramine, & tūc menses egredi non possunt, unde tandem morbi & periculi, nisi aperiatur, ut exempla testantur.

Latitudo. Ad latera cervicis ubi enascitur, crassior est quàm in medio.

Connexio. Continuat substantiæ cervicis, ac si ex eâ enasceretur.

Substantia est partim membranacea, partim carnea, neq; tamen admodum crassa.

In aliis vero tenuior est atq; imbecillior, in aliis solidior crassiorq;, & aliquā-

ta firma, ut sectione opus sit, præsertim quando

quando segnior & impotentior est
ritus: alioquin si hic validus, solet
dem post menses aliquot pertu-
re.

Venulū donata est hæc membra
multis, quibus in primo coitu ruptis
lor & sanguinis profusio oritur.

Tandem verò evanescit ex
vel alias petulanti attritu, qu
admodum in viris frænum glandis
do laceratur.

Quæstio verò gravis est, an primo
egredi debeat sanguis in omnibus virginib
qui certa & indubitata sit virginis
nota?

Respondemus fieri id ut plurimum
& fieri debere. At impediri potest, &
fieri.

1. Si ex petulantia ruperint virg
digito vel alio instrumento. Hinc
dam populi in recens natis fæ mellis
vas consuunt, interea spatium exigui
pro egressu urinæ relinquentes; ne
periunt usque ad tempus nuptiaru
tum verò sponsus aperiri curat, ut co
virginem habeat.

2. Si tempus sit menstruorum, &
paulò ante præcesserit, quemadmodu
suprà dictum.

Si rima oblonga sit in hymene: tū
m dilatatio fit, non ruptio.

Si collum uteri amplum sit admo-
n, & penis angustior, nec satis cras-

Si dextrè mas intrudat penem.

Si passa est virgo procidentiam ute-
nde ruptio hymenis.

CAPVT XXXII.

E PVDENDO MV-
iebri externo in ge-
nere.

Bi finis est colli uteri, occurrit ul-
ma & extrema pars uteri, MULIE-

PVDENDUM, vel orificium exte-
seu cervicis uteri os; aliis *vulva*,
i valva, item cunnus, à cuneo aut
ressione fortè dictus.

us eius est extrinsecus in antero-
stium pubis regione, ubi plurimæ *Partes*
rent partes citra dissectionem, & a- *vulva.*

e etiam citra diductionem, ut pili
s, labia & monticuli ipsi; rima ma-
terior, alæ, tentigo; aliquæ verò
absque labiorum diductione, ut fos-
vicularis, rimæ duæ minores ad
phas, corpora clitoridis, foramen.

L

cer-

cervicis vesicæ cum valvulâ carnosâ
 mâ rugosâ vel os immediatum cervicis
 cum carunculis quatuor & membrâ
 rotidem: ubi postea incipit canalis
 quo egimus.

Pili pubis in maturis erumpunt ad
 bia, ut melius claudatur rima. Sunt
 in mulieribus magis crispî quàm in
 ginibus.

Diductis labiis apparet 1. *MAGNA*
FOSSA cum exteriori *RIMA MAGNA*
 & eam fossam navicularem vocare
 sumus; quia naviculæ figuram habet
 Est enim retrorsum magis profunda
 lata, ut inferior posteriorque finis
 quam in fossam degeneret. Colli
 orificium seu principium in fossæ mœ
 est.

Debat autem fossa unâ cum rima
 externâ amplior esse, ut fœtus in
 riori parte facilius exiret; cum cutis
 ita dilatari possit, uti membranosa,
 intus est, substantia.

Deinde *RIMAE* duæ occurrunt
COLLATERALES, quæ minores
 dextra & sinistra, suntque inter labia
 alas.

In fossa verò hac magnâ primò omnes
 conspiciuntur *carunculae* quædam, de
 bus modò agendum.

CAPIT.

CAPVT XXXIII.

CARUNCVLIS
myrtiformibus.

Numerus :

in medio fossæ apparent *quatuor* CA-
RUNCULAE, statim post alas,
te, ut quælibet unum angulum oc-
t, & per quadratum se respiciant
ea quidem anterior est in ambitu
minis meatus urinarii, ad clauden-
ne redditâ urinâ intret velicam
num quid, ut aer &c:

Secunda huic opposita est posterior
reliquæ sunt collaterales.
figurâ myrti baccas referunt.

ignitudo variat. Nam in aliis bre-
es sunt, longiores, crassiores, tenu-

Durant ramen qualescunque
rimam senectam, nec unquam con-
atur, etiam in iis, quæ sæpissime coi-
aut peperere.

adjunctas habent nonnullas mem-
is, quas unâ cum carunculis Pinæus
is vocat: ut ita

stantia sit partim carnosa partim
branosâ.

us est I. Ad tutelam partium
narum, dum immediate clau-
L 2 dunt

dunt orificium cervicis, ne introeat
frigidus, pulvis &c. Ad quod etiā
phæ & labia pudendi faciunt.

II. Ad titillationem & voluptate
dum inflatur, & penem constringit
de, præsertim in juveniculis.

Pinæus autem voluit usum esse
gè alium. Statuit enim carunculas
cujus extremitates membranæ can-
sunt, ita vinctas invicem, ut foro
quoddam reliquatur, esse hymenem
veram notam virginitatis: nec trans-
sim eam vult sitam esse, sed in longi-
ut figura totius hymenis fiat instans
obtrusi sive truncati.

CAPVT XXXIV.

DE CLITORIDIO

HUjus inventionem sibi arro-
Fallopianus: Columbus verò gl-
se, ut in aliis solet, sibi tribuit: cuti-
men eius fecerint mentionem Av-
na, Albucasis, Ruffus, Pollux & a-

*Nomina
huius par-
tis.*

Alii nympham vocant. Colum-
bitur dulcedo amoris, & æstrum Vir-
ris: quia hæc pars est sedes delectat-

congressu præcipua ; quæ si blandè
 erectetur in iis, quæ diu à coitu absti-
 nent, & appetentes sunt, semen faci-
 os funditur. κλειτορίς Græcis dici-
 aliis Tentigo, aliis virga vel penis
 debilis : tum quia peni similis est situ,
 tantia, compositione, spirituum re-
 one & erectione, habet item ali-
 glandi simile & præputio, tum quia *Similitudo*
 quibusdam excrescit in magnitudi-
 penis : adeò ut penis virilis loco *clitoridis*
 oride aliquando abutantur mulie-
 onnullæ, & mutuò coeant, quas
 ricatrices vocant. Vnde hæc pars
 temtus virorum dicitur.

autem CLITORIS processus par-

in pubis parte mediâ, in fine su-
 re & anteriore rimæ magnæ, ubi
 currunt nymphæ.

magnitudo communis est exigua. sub
 his ferè latet in principio, deinde
 er prominet. Nam in adolescentu-
 bus puellis incipit primùm se cli-
 exerere. In aliis vero major est vel
 r. In nonnullis propendet instar pe-
 rilis, si videlicet parvulæ continuè
 quenter hanc partem contrectent
 cent, uti testantur exempla. Planè

L 3

vero.

vero & præter naturam & monstru-
ferè est, ad colli anserini magnitudinem
excrefcere, quale exemplum habet
rerus. Quò verò magis excrefcit, eo
gis impeditur viri congressus. Ne
coitu turgēt inftar erecti penis, &
do erigitur, ad libidinem stimulat

Substantia est uti penis virilis, ex
bus nervosis corporibus duris & ex
intus porosis & spongiosis (ut dicitur
possit hæc pars, rursusque conc
ortum ab ossibus pubis habentibus
stinctum, ad conjunctionem cum
Ischi: at circa osium pubis conjun
nem conjunguntur, & penis corpus
stituunt. Atque utrinque musculu
vus adesse à multis putatur.

Tentigo.

Extremitas vel caput prominens
star glandis (reliqua parte delitescit)
TENTIGO dicitur, foramen habere
penis, sed non pervium.

Tegi videtur quasi præputio,
constituit tenuissima quædam cuti-
alarum conjunctione.

Vasa quoque obtinet omnis generis
ad se delata.

Vsus est, ut sit sedes delectationis
moris. Estque ut frænulum in
Nam ex ejus attritu seminis præputio
excitatur.

tur autem Aquapendens, usum cli-
dis esse, ut uteri collum in coitu su-
tetur.

CAPVT XXXV.

DE ALIS ET LA-
biis.

Roductiones duæ occurrunt rubræ
inter labia, quæ *μερύγια* appellant,
as, Galenus N Y M P H A S, vel quod
nsum primò intromittant, vel quod
is præfint & humoribus profilienti-
: nam inter eas tanquam parietes u-
cum sibilo effunditur in distans abs-
labiorum irrigatione. Vocant aliæ
unculas cuticulares.

itus est inter utrumque labrum.
lagnitudo non est eadem: nam ali-
ndo una ala, aliquando utraq̃ue, &
us in virginibus quàm mulieribus
ò excreſcunt, præfertim cum digitis
quenter attrahuntur, aut aliàs hu-
res affluunt, ut ob impedimēta, quæ
quuntur, excisione opus sit. Et Au-
est Galenus hunc morbum familia-
n esse Ægyptiis; ut ideò nupturis vir-
ibus, uti & aliis mulieribus amputēt,
od alii de Clitoride volunt intelligi.

L 4

Numerus

Numero duæ sunt: dextra & sinistra. *capitulum*
principio autem ferè junctæ sunt: *mentis*
productionem carneam faciunt in
præputii clitoridem vestientis. *scutum*

Figura est triangularis, sed angulus
nus obtusior, videlicet qui infernè
ducitur extra labra.

Color est rubeus instar cristæ galli
guttur.

Tunicâ tenui obducuntur potiùs
cute, quemadmodum oris labia & c.
ræ eius partes.

Substantia est partim membranacea
mollis & fungosa, partim carnosâ.

Vsus sunt iidem, qui caruncularum
myrtiformium: & præterea, ut urinæ
eas ceu parietes feratur.

LABIA duo, inter quæ rima est ex
na constituta, extuberantias habet
quæ monticuli Veneris dicuntur,
decorati. In mulieribus magis depre-
si sunt. Hæc pars pudendum pro-
dicitur. Et sunt corpora oblonga, mol-
larque substantiam habentia, qualis
la alia est in toto corpore, partim ex
te & carne, partim glandulosa & spi-
giosa, cui pinguedo subiacet durius-
la.

Vsus est ut supra.

capitulum

CAPVT XXXVI.

E M E M B R A N I S
fœtum involventi-
bus.

Artes omnes procreationi inservi-
entes, tam viriles quàm muliebres
elaboratæ sunt. Verùm quia institu-
m est omnia exponere, quæ sub cultel-
læ anatomicæ veniunt; quædam et-
iam proponenda sunt, quæ in utero mu-
eris gravidæ continentur, ut sunt:

Fœtus, cuius structura non adeo
differt ab adulto homine; nisi quoad u-
lvas vasorum cordis, de quibus libro
sequente agendum.

Membranæ, quæ fœtum vestiunt,
circumgunt & ambiunt: de quibus hoc capi-

I. Vasa umbilicalia, de quibus se-
quenti.

M E M B R A N Æ F O E T V M I N V O L -
V E N T E S in utero post conceptum o-
mnium primò generantur, ad obvallan-
dam nobiliorem seminis partem, ut pa-
tet oculorum notitiâ, vel in minimis
conceptibus, & omnium fere autoritati-
bus.

L s

Effici-

Efficiens est vis formatrix, non verò
lus uteri calor : quemadmodum a
calor crustam producit in pulite vel
ne. Nam

An solus u- I. Tum arctè adhæreret crusta fœti
teri calor atque inseparabiliter.

fit efficiēs II. Non tantus est uteri calor ut ab
membra- re queat feminis materiam tam bre
uam fœ- tempore, cum ferè statim à concep
tus. generentur : & si tantus esset in utero
lor, non fieret conceptus, ut habet H
pocrates l. 5. Aphor.

Opiniones *Materiam* statuimus fœminei seminis
varie de crassiorem partem. Alii, ut Arantius
materia volunt esse tunicam internarum pro
membrana pagines, chorion peritonæi, amnios
rum fœtus. membranæ carnosæ. Alii fœmineum
semen has solas efficere membranarum
Alii fieri tam ex virili, quam muliebri
semine.

Numerus Membranæ hæ circa humanum fœ
membra- tum *duæ* sunt, circa brutorum, *tres* : qu
narum, junctæ & mutuo connatæ, ut unum v
deantur constituere, efficiunt *SECUNDA*
Secundina *PRIMA* dictam, vel secundam.

quid & cur 1. Quòd secundum sit fœtus domi
ita dicta. liam ab utero,

2. Quia hæc membrana in partu
cundò, vel post fœtum exit.

Prim

Prima membrana AMNIOs dicitur, ob *Humor in*
 molliciem & tenuitatem, aliis agnina, *amnio un-*
 aarta virginea, indusium &c. Estque o- *de.*
 nium tenuissima, fœtum immediate
 ingens: in quâ multus & copiosus re-
 feritur humor, cui fœtus innatat, ortus
 brutis ex sudore, in homine & ex su-
 ore & urina.

Vsus est.

Ut innatando quasi in balneo levi-
 reddatur fœtus.

I. Ne impingat fœtus in partes ali-
 uas vicinas duriores.

II. Ut in partu ruptâ membranâ hu-
 mor hic exiens lævem, lubricam & faci-
 lem viam per uteri collum faciat.

Secunda membrana, dicitur CHORI-
 on, eò quòd instar circuli fœtū ambiat.

Hæc priorem immediate cingit, est-
 ue etiam satis tenuis; cui in brutis ad-
 hærent verticilli vel cotiledones, ex car-
 osa & spongiosa substantiâ costâtes: In
 homine verò adhæret hæc mēbrana ute-
 ro per rotundam & subrubram quādam

Cotiledo-
 carneam massam, alteri tantum parti u- *nes quid-*
 uteri connexam, nec totum fœtum cin-
 gentem; ex innumera sobole venarum
 & arteriarum, quibus intertextitur san-
 guis velut affusus, plasmatam.

Rotun-

Placenta Rotunda illa massa dicitur *PLACENTA* uteri seu *TA UTERI*, ob formam; item *EP*
par uteri- *UTERINUM*: quia ut e par sanguinis
num. concoquit pro toto corpore, ita ha
 massam sanguinem elaborare putat
Cur e par communiter ad nutritionem totius f
dicatur, *et* *rus*: quamvis rectius putetur facere
et eius u- fulcrum vasorum umbilicalium, vas
fus. ramis ibi disperforum, ut tanquam pu
 vinari incumbant.

Tertia ALLANTOIDES, id est, farci
 minalis, non cingit totum foetum, s
 est instar cinguli vel farciminis.

Vsus est, urinam recipere ab uracho
 brutis. Nam in homine haec membr
 na non adest: sed in eo urinam recipi
 amnios sudori permittam.

CAPVT XXXVII.

DE VASIS VMBILICALIBUS.

Dissectis membranis & remotis oc
 currunt *VASA VMBILICALIA*
 dicta, quia in regione umbilici, foetu ex
 cluso, & sanguine nonnihil intrò pro
 truse

iso ad foetus alimentum, abscindun-
t, nodoque conclusa

UMBILICUM constituunt, ab um- *Umbilicus*
ne dictum, quod in medio ventris sit, *quid.*
o totius corporis, si circulum dime-
mur brachiiis extensis.

Sunt autem quatuor vasa umbilicalia;
VENA VNA, ARTERIAE DUAE, &
BRACHUS. Quae integuntur & obve-
niuntur communi quadam

Tunicâ vel quasi crustâ, quam alii vo-
cant intestinulû, funiculum, laqueum.

Estque huius tunicae usus, ne va-
sa invicem implicentur, rumpantur, aus-
tremo modo lædantur.

VENA UMBILICALIS per ge-
ninas Peritonæi membranas delata pri-
mo omnium ante alias venas producta
ratione perfectionis, quia nutrimen-
tum reliquis subministrare debebat.

In epar per fissuram inseri conspici-
tur, & per umbilicum tendit modò
simplex, modò geminata, & in duos ra-
mos

mos divisa, ulnarum aliquot longitudo ne, usque ad uteri placentam, In itinere verò infinitos ramos spargit per secundariam, donec in tenuissima capillamentosa abeat.

Usus est sanguinem haurire pro nutritione fœtus, & in eius epas deferre.

Nonnullis nodis vena hæc referta conspicitur: ut sanguis diutius ibi haboretur, quemadmodum in vasis spermaticis fieri videmus.

Ex nodorū istorū numero conjiciuntur obstetrices liberorum procreandorum multitudinem.

Anastomoses. ARTERIÆ DVÆ in Iliacas iniunguntur, & cum venâ feruntur modo obiecto ad advehendū fœtui spiritum vitalem cum sanguine arterioso. In placentâ autem carnosâ sæpius per *anastomoses* junguntur rami venales & arteriales,

Umbilici non adeo magna est dignitas. Degenerant autem post partum hæc vasa in ligamenta: vena quidem epas, arteriæ in ligamenta lateralâ vesicæ. Nec tamen tanti sunt momenti, ut si rupta vel abscissa subito mortem intulerant, uti historia indubiè fabulosa in pulsi quidam, & in his Laurentius, arborantur. Dicunt enim Ægyptios pro suo plicio grassatores excoriare, & umbilicum intactum relinquere, quo diutius

cruc

...cientur. Qui quàm primùm refe-
...s fuerit, putant hominem exspirare
...is quatuor concidentibus.

Quartum vas ex fundo vesicæ ortum
...eodem modo se habet in brutis at-
...e in homine.

In brutis fertur extra umbilicum in-
...binas arterias, & tandem expandi-
...atque dilatatur in tunicam Allan-
...dem, ubi urina colligitur, & reser-
...ur, donec in lucē edatur fœtus. Vnde
...itur hoc vas *URACHUS* seu vas uris
...rium.

In homine. Non prodit extra umbili-
...n, ideoque neque constituit allan-
...dem, unde humano fœtui tantum
...e membranæ,

Non est pervius urachus, sed est su-
...ulus vel ligamentum, quo vesica pe-
...onæo annectitur & sustinetur, ne quā
...urinā distenta est, cervix eius com-
...atur: quod tamen ab arteriis quoq;
...i non negamus.

fœtus verò humanus urinam excet-
...per penem in amnion (unde etiam
...ta humoris copia) & magna etiam
...vesicæ portio retinetur, unde infans
...primis diebus ferè perpetuò mingit.
Varolus voluit in vesica omnem uri-
...n contineri ad partū usq;.

Alit

**Error Lan-
rentij.**

Alii, & ferè omnes, voluère, per
chum egredi, & colligi inter amniou
allantoidem, ut in brutis. Atque he
opinionem Laurentius acriter defen
exemplis adductis quorundam, qui
urinæ suppressione per umbilicum
emiserunt.

Sed respondeo: Hoc præter naturam
fieri, uti & nota est multorum sententia
venam umbilicalem in hydropicis præ-
ter naturam reſeratam, humorem
exiſſe. Et fatetur ipſe Laurentius
omnia quatuor vaſa umbilicalia dege-
rare in ligamenta. Et rectè; Nam re-
cantur. Quomodo ergò, niſi præter
naturam aperiri pote-
runt?

LIBER

LIBER II.

De Media Cavi-
tate.

Medius Venter THORAX
dictus est totum id, quod *Medius vē-*
circumscribitur supe-
riori parte, à claviculis;
inferiore, à diaphragma-
te; parte antica, à sterno;
postica, ab ossibus dorsi; lateralibus, à

latus anterior dicitur *στένον* & pectus;
posterior, dorsum; laterales, late-

antiqui verò ut Hippocrates, Aristot.
totum illud à clavibus ad pudenda
e, hoc est, & medium & imum ven-
dum sub nomine thoracis complexi
Itaque hac significatione Hippoc.
scripsit Epar in thorace locatum
quod alii imperiti non intelligentes
tunt Hippocratem Anatomes igna-
fuisse.

M

Substan-

Substantia eius externa est partim ossea, partim carnea.

Non totus carneus est hic ventris uti infimus.

1. Quia non continet partes, quæ cogniter distendi debebant.

2. Ne pinguedo nimia ibi generetur, & respirationem impediret.

Ex parte tamen carneus, quia continet, quæ moveri debebāt, ut cordis, & pulmones, & eandem ob causam.

Totus osseus esse non debuit, quod admodum calvaria;

Ex parte tamen osseus, ad munitionem nobilium partium. Nam

Vsus eius est, partes vitales continere, sicuti primi & infimi ventris, nates.

Sunt & huius partes vel continentæ, vel contentæ. Et illæ vel communæ, vel propriæ.

Communes eadem sunt, quæ in infimo ventre. Sequentia tamen hoc loco tractanda.

Vsus pilorum sub axillis. Cutis medii ventris sub axillis pilorum est. Hi pili dicuntur subalares, utiles partes illæ in brachiorum motibus servantur, cum maximè & citissimè sudant, quia dicuntur cordis emunctoria, eorum ex-

amenta recipientia, quemadmodū
 uina jecoris emunctoria appellan-

præterea pinguedo in thorace, si mā-
 excipias, non tanta reperitur, ne e-
 pondere respiratio impediatur. Ob
 tem enim eius osscam non tanta co-
 materiæ pinguedinis affluere potuit,
 in imo ventre, qui totus carneus:
 hic semper pinguisimus: medius
 ter medio modo se habet; caput mi-
 nè pingue.

artes propria præter musculos, ossa
 sunt *mammæ* utriusque sexus, *dia-*
agma, *pleura*, *mediastinum*.

Contentæ, sunt viscera & vasa. Vi-
 a sunt *cor* cum suo *pericardio*, *pulmo*,
trachea, atque *gula* portio. Vasa sunt
vena cava & *arteria magna*, *thymo*
 ulti in jugulo, & nervi varii.

CAPVT I.

DE MAMMIS.

Rdine A anatomico *mammæ* omni
 um primas in thorace occurrentes
 res, mentis dissectioni subicimus.
 mus autem de muliebribus mam-
 interspergendo tamen, quid ab iis
 ales differant.

M 2

SIC 118

Cur in tho-
 race pin-
 guedo pau-
 cior.

Homini *Situs* mammarum in pectore *me-*
cur in pe- est.
ctore sita
mammæ.

1. Ob cordis viciniam, unde calor
 2. Ob venustatem.
 3. Ob commodam lactationem: c
- infans non statim ambulare queat
 re brutorum, sed ulnis maternis co
 prehensus mammis ad moveatur.

Numero duæ sunt: non ob gemella
 sed ut una læsa altera officium faciat
 Cabrolus tamen observavit in quad
 muliere quatuor mammæ, utrinq;
 minas.

Magnitudo. In *virginibus* parvulis
 præter papillas aliquid apparet, do
 sensim excrescant in magnitudinem
 figuram malorum; & quando ad d
 digitos extolluntur, menstrua fluere
 ciunt. In *vetulis* flaccescunt, atque
 iam præter papillas nihil ferè appa
 pinguedine & glandulis absentis.

Mulieribus magis turgent, & in
 gnantibus magis magisque aug
 tur.

Differētia In *viris* non ita attolluntur ut in
mammarū minis, quia ordinariè lac gignere non
virilium a bebant. Unde in *viris* mammæ ferè
fæmininis. dulis carent: pinguedo tamen subj
 in obesis mammæ attollit.

Fig

Figura subrotunda est. Semiglobum
si referunt. In nonnullis verò pro-
ximiam molem dependent.

Dividitur mamma in papillam, &
mamillam ipsam. In medio n. mammi-
læ prænitur peculiaris substantia, quæ

PAPILLA dicitur, fungosa, & penis
adi respondens: unde flaccescere e-
que potest ex suctione & contactu.

non exquisitum sensum habet, cum
si centrū sit, in quod nervorum, ar-
teriarum & venarum fines desinunt.

Color in virginibus est rubeus, in la-
tibus lividior, in quibus etiam ma-
rotuberant ex infantis suctione; in-
tis nigrior,

areolam habet circumjectum, quem
areolam vocant, in virginibus pallidam,
ægnantibus & lactantibus fuscam,
mulieribus nigram.

Forata est in medio, pro lactis exitu:

Foramen papillæ est, ut instar canalis vel
ostii adibuli ori infantis indatur, ut lac-
tis exitus: Deinde, ut ad titillationem fa-

MAMILLA intrinsecus constat ex
membranis, vasis, glandulis vel potius
lobulosis corporibus, pinguedine:

M 3

licet

Sensus pa-
pillarū in-
signis un-
de.

licet duo postrema mammas præ
constituant. Inter membranam &
tim glandulæ & pinguedo habitant.

Membrana verò glandulosam sub
tiam, quam succingit, subjectis
Etit musculis.

Glandule multæ sunt : In Virgini
duriores, in vetulis absunt, in
gnantibus & lactantibus tumidi
Una tamen magna est sub papillâ,
reliquæ minores circumstant, &
rum plexus infiniti intercijiuntur.

Vsus est, sanguinem in lac conver
Pinguedini verò, quæ circumfun
calorem addere & æqualitatem
mis.

Vasa. Venas recipiunt mammae
cutaneas & externas ab axillari, quæ
gravidis & lactantibus sæpè livent
as internas, longo itinere ductas
diutius elaboretur sanguis, dictas
marias : quæ descendunt utrinque
trunco venæ axillaris sub osse pec
ad mammarum usque glandulas.
obviam veniunt aliæ ascendente
rectos musculos, de quibus supr
nimirum mammae cum utero co
sum habeant, Vnde nato infant
guis non amplius ad uterum, sed

*Vene mæ-
maria.*

fertur, & in lac vertitur. Hinc et- *Cur lac*
 lactantes rarò mensium fluxum a- *post natū*
 scunt. Hinc aliquando puelli ni- *infantem*
 suctione sanguis exit per mammas. *generetur.*
 nò animadversum est menstrua flu-
 per mammillas, & lac per uterum;
 d tamen rariùs fit.

arteria veniunt à trunco superiore
 riæ magnæ.

ervi feruntur ex nervis thoracis,
 ipuè quinto, ad sensum, & in papil-
 desinunt.

us I. Generalis in fœminis & viris
 ut sint cordis propugnacula.

In mulieribus est lactis generatio,
 nutritione infantis editi.

anguine enim usus fuit infans in u-
 , & lac idem sanguis est; sed deal-
 s.

Efficiens autem lactis causa est
 illa glandulosa mammarum, cui a- *Lac genera*
 on est similis in corpore. Efficit hoc *ri etiā pot-*
 substantiæ proprietate, tum tem- *est virgini-*
 menti ratione. *bus, viris,*

Quamobrem etiam in virginibus & fœminis nò
 eribus non gravidis aliquando (li- *gravidis*
 arò fiat) lac generari potest, si copio *Ec.*

spirituoso sanguine refertæ sint

M 4 mamme

mammæ, & accedat suppressio mēstru-
rum; nam ibi glandulosa substantia
coquit, quā mulieri ad nutricaoem
opus est.

Imò in viris carnosioribus & mi-
mos humor lacteus & quasi lac g-
rari non rarò apparet, præsertim si
quenti suctu & frictione utantur,
multorum exempla testantur. Ar-
teles scribit de capro quodā in Len-
qui tantum lactis dederit, ut inde
stra conficerentur. Matthiolus in
versis Bohemiæ locis tres hircos re-
ros asserit, undè lac acceptum, qu-
epileptici curati. Cardanus vidit
rum triginta quatuor annorum, ex
jus mammas tantum lactis profluxit
ad alendum infantem sufficeret. In
orbe narrant viros penè omnes mam-
lactis copiā abundare.

III. Ad ornatum mammæ mulie-
faciunt, & viri delicias.

IV. Ad excrementitium humoris
excipiendum. Unde abscissis ma-
mis, fœminæ morbes incurrunt var-
quia ascendens sanguis vasa nō habet
in principes partes, cor, pulmones
irruit.

CAP.

CAPVT II.

DE MUSCULIS INTERCOSTALIBUS.

MUSCULI varij in thorace occurrentes Libro quarto primum exhibentur, ob sectionis methodum. INTERCOSTALES autem ita dicti, quia a costis intertexuntur, hoc loco exhiberi debent.

Sunt autem numero quadraginta quatuor, utrinque viginti duo; Undecim externi; & totidem interni. Nam semper inter binas costas bini musculi sibi vicem incumbunt: undecim autem quinque costarum intervalla. Et male fecerunt 68. Nam in costarum veris intervallis diversos fecerunt musculos inter partes istarum costarum ostendentes habitantes ab iis, qui inter partes cartilagineas reperiuntur.

Error aliorum.

Externi oriuntur à superiorum costarum inferioribus partibus, & inferuntur in inferiorum partes superiores. Interni è contra.

M s

Externi

Externi desinunt ad cartilagines
terni & costarum & cartilaginum sp
 implent.

Fibras obliquas habent, & se mutuo
 interfecant instar literæ X. quia
 as breves sunt muscoli, ob interval
 rum parvitatem.

Vsus est, thoracem dilatare & cont
 here, *Externi* æmulantur tractum su
 clavii: costas attollendo, & thoracem
 constringendo, faciuntque ad expir
 tionem. *Interni* costas abducunt, & th
 racem amplificando ad inspirationem
 faciunt.

Alii cum Vesalio statuunt, musculos
 externos costas inferiores sursum pel
 re, internos verò superiores deorsum
 rapere, ut angustando thorace mutuum
 sibi ferant auxilium. Sed statuendum
 potius, quiescentibus internis, externis
 seorsim agere.

CAPVT III.

DE DIAPHRAG- mate.

DIAPHRAGMA à distinguen
 do dictum, aliis præcordia dictu

Opéves, quia eo affecto mens & sensus perturbantur ob consensum cum cerebro, fitque inflammato diaphragmate paraphrenitis. *Septum transversum* vocant, quia transversim corpus dividit, & distinguit ventrem medium ab *ma quid*.
nimo.

Est autem musculus singularis habens figuram & actionem ab omnibus is diversam.

Situs eius est transversus, & quia non nil deorsum inclinatur, obliquus.

Figura circularis est & rotunda, appendiculis longis exceptis.

Numero unicus est hic musculus, utque lateri communis, sed magnus.

Magnitudo responderet amplitudini transversæ imi thoracis, quæ est inter vertebrae dorsi infimas & costas.

Oriri videtur à lumborum vertebrae per duas partes carnosas longiusculas (quæ lumborum musculis adhærent ad arteriæ magnæ

magnæ latera, & sensim latiores faciunt
circa infimas thoracis vertebrae coeunt
ubi circularis fieri incipit hic musculus
& thoraci circumtenditur, annexus
est parte carnosa: quamvis rectius
re initium statuitur in tota circumferen-
tia.

Caput &
finis in dia-
phragma-
te-

Substantia est carnosa, in medio nervosa & membranosa, ubi apparet
membranosum & quasi circulus
venit loco tendinis, ad quem fibrae car-
nae à thoracis peripheria tanquam ad cen-
trum excurrunt.

Galenus medium septi voluit esse
put musculi, quia ibi nervi inferuntur.
Sed quemadmodum est musculus
cularis situ, actione, figura, nobilitate
&c. ita & hic aliquid peculiare est.

Membrana vestitur duplici ad roborem.
Superiore à pleura, inferiore à peritonæo.
Et propriam quoque tenuem habet tunicam.

Foramina habet: unum dextrum in
parte nervosa mediâ pro transitu venæ
cavæ: aliud sinistrum, maius & non
hil posterius, pro transitu oesophagi
cum duobus nervis ventriculum petentibus.
Et ubi exoritur, apparet divisi-

pr

transitu arteriæ magnæ, & venæ si-

ari. *Asa.* Venas habet & arterias à vici-
vena cava & arteria magna, dictas
enicas: aliquando & ab adiposa.

vi pet totam eius substantiam spar-
tur, delati ex spinali medulla colli
quartam & quintam vertebam:

id ipsi proprium, nec aliis partibus
ernis sub claviculis commune. Fe-

tur autem per thoracis cavum &

liuntur a mediastino. Et quia dia. *Risus Sar-*
igmatis nervi ramulis in maxilla. *donij caus-*
& labiorum musculos divaricatis *sa.*

miscentur, hinc in percussione dia-

igmatis risus oritur, sed non verus,

m sardonius dictus: quia unà faci-

musculi convelluntur, & maxillis

psque agitatris risus apparet.

us est. Facere ad respirationem li- *Diaphrag-*

m; nam muscoli thoracis ad vio- *matris mo-*

am faciunt: Et in inspiratione qui- *tus quomo*

tenditur diaphragma, in expira- *do fiat.*

re remittitur, contrà quàm volunt

itius & Laurentius. Et hic quidem

diaphragma, contra quam alii mu-

, trahere finem suum versus; vulè

que

que fibras à thoracis circumferentiâ
currentes æqualiter contrahi, & co
ad circulum nerveum adduci, atque
peragi respirationem. Sed quomodo
trum membranosum septi costas ad
attrahere poterit, & totum thoracem
constringere?

II. Adjuvare abdominis musculos
compressione, ad exclusionem ex
mentorum & fœtus: Nam à superio
parte intestina deorsum trudit.

III. Distinguere imum ventrem
partibus naturalibus à medio cum v
libus, ne ab ignobilioribus partibus
quentes vapores ad nobiliores partes
cor &c. ascendant.

IV. Hippocrati, esse infimi ventris
spiratorium, dum hypochondria
tilat.

CAPVT IV.

DE PLEVRA, ME astino & Thymo.

*Plevra
quid.*

PLEVRA est membrana intrinseca
tho

Eius origo.

Crassities.

Materia

pleuritica

locus.

thoracis cavitatē succingens, peritonæo
fior & robustior; orta à tunicis, quæ
intercostales ex spina dorsi egre-
santes tegunt, Ideò in dorso crassior
cuius vertebrae quasi inseparabili-
ter adhæret. In thoracis morbis sæpè
decuplo crassior: licet alii dicant
adeò attenuari in pleuriticis, ut vix
spici queat.

duplex est ubique, ut inter duplicatu-
vasa ferri queant. Exterior pars
ior est & crassior, interior tenuior.
has sæpè materia pleuritica colli-
git, nec tantum inter pleuram & mu-
sculos.

riguedinis aliquid aliquando reperi-
ti & quandoque in peritonæo,
dorsi vertebrae in pleura, ubi vasa
sunt.

interim & costæ suam habent perio-

sa. Venas habet à venâ sine pari, &
costali superiore, arterias à magnâ,
à vertebrae thoracis,

Vsus

Vsus est, thoracem intus & eius par
vestire, (quemadmodum peritonæu
imi ventris partibus tunicas commu
cat) & intersepientem membran
seu

*Mediasti-
um quid.* MEDIASTINUM constituere, co
pleuræ soboles est, & membran
plex, thoracis cavitatem & pulmon
duas partes dispescens. Nam postq
pleura circa dorsum orta per later
ēgrovā ascendit, rursus ad spinam
dens, rectā a medio pectore ad dor
porrigitur. Vtrinque lateribus stern
nexa hæc membrana non obscure
plex est, ut pleura, sed conspicuē, u
tercedat tantum spaciū, quanta est
latitudo. In huius duplicitatis ca
tem, quæ sub sterno est, si vulnus
rius inflictum penetraret, satis tutum
& absque periculo; quod anatome
peritus lethale pronunciarer. V
bras verò versùs sensim angustatur
vitas, & membranæ committuntur
anteriori parte cavitatis cor & ven
vā habitant; in posteriore gula cū
vis stomachicis.

Tern

Tenuioris est & mollioris *substantia*
 na pleura; & circa vasa non rarò adi-
 unferta est instar omenti.

THYMUS adnascitur ei in jugulo *Thymus*
 thoracis summâ parte, estque cor- *quid.*
 glandulosum, molle, spongiosum.
 mum (Aliis lactes, pars nempe in vi-
 desui expetita) vasa ibi ascenduntia
 na, venam cavam & arteriam ma-
 na, eorumque ramos ad brachia &
 las proficiscentes fulciens, & ob tu-
 ti, uti fieri solet, & ne vasa ab ossis
 tu lédantur.

Vsus Mediastini est I. Thoracem
 iri, ut una parte pulmonum læsa
 lneret vel aliter, altera officio funga-

Cor cum pericardio annexo
 ndere, ut nullam ad partem alli-

Vasa percurrentia stabilire.

CAPVT V.

PERICARDIO

numore in eo contento.

PERICARDIVM aliis cordis invo- *Pericardi-*
 crum, capsula, arcula, camera, pan- *um quid.*
 N niculus

niculus &c, est membrana cor totum
cingens, cuius ideò figuram æmulat
& ferè magnitudinem: sed tantum
corde distat, quantum satis est pro
cordis & humore, qui in hac capsula
tinetur.

Oritur ad basin extunicis vasa co
ingentibus, quæ à pleura (nam inter
sin cordis & pericardium hæc tunica
adeft) ubi propter eadem

Quinque *foramina* habet: nempe
venæ cavæ introitū & exitu, & pro
quorum vasorum trium egressu.

Connectitur orbiculatim mediatis
plurimis fibris & vicinis partibus,
cipuè diaphragmatis circulo ne
firmiter adhæret, quod homini pro
um, nam ab eo in canibus & similibus
stat.

Superficies externa est fibrosa, im
lubrica, & utraque sine pingui
ne.

Substantia crassa & dura est, tantum
pulmone durior, quantò osse m
or.

Vasa. Venas parvas habet à phrenicis
axillari:

Arterias nullas facilè apparentes: t
quia aliàs cordi vicinum est.

N

ervos minimos, à recorrente fini-

sus I. Cordis esse domicilium fir-
n, ne illud in motu duriores partes
at. H. Ut in eo contineatur

UMOR SEROSUS vel aqueus in- *At humor*
rinæ, non tamen æris aut salsus; *serosus, in*
Galeno cor quasi in vesica esse di- *pericardijs*
omniū re-

ic humor in omnibus animalibus *periat.*

aliter constitutis, tam vivis quam
uis reperitur, ut patet ex sectioni-
ivorum & mortuorum: in aliis ra-
plus vel minus; in hæcticis exiguus
flavescens.

mortuis copiosior est: quia tunc *Cur ille in*
plurimi in refrigeratis partibus *mortui co*
ntur in aquam. *piosior.*

is si nimia copia fuerit, palpitatione
, & inde suffocans mors sequitur:
umtio; tabes.

nde oritur, variorum variæ opinio- *Vnde oria-*
nt. *tur humor*

Eorum est, qui ex vasis cordis *pericardijs.*
ti volunt, siquidem palpitationem *Opinio I.*

ioso humore phlebetomia curat:
tque ob fervorem cordis exprimi
rem aqueum, ut in ligno urente.

N 2

II. Alii

II. Alii volunt ex potu esse, cuius pars aliqua roris modo penetraret ex arteria in venosam.

III. A materia aquosa seminali primâ generatione; sicut à flatuosâ in auribus esse putatur.

IV. Huic affinis est lasolini opio qui vult esse portionem perfectissimam selectam, omnibusq; numeris absconditam, humoris serosi ab ipsa natura transmissam, primigenio forsan ortu.

V. Ab excrementis aquosis coctionis.

VI. Ex salivâ delabente ex glandis linguae in tracheam, inde verò in artus & cor.

VII. Ex cordis adipe, agitatione aquam converso.

VIII. Ex aeris inspirati crassioris tione in aquam versâ.

IX. Et ultima, quæ nobis visibilis est: ex vaporibus & exhalationibus humidis, ab humoribus cordis à motu & calore protrusis, & ad pericardii densitatem pulsis.

Vsus I. Cor humectare & regerare, motumque faciliorem reddere.

II. Ad adipis concretionem facere.

Ut cor innatando minùs grave fiat
in nullam partem impingat.

IVMOR quoque IN THORACIS
VITATE communiter reperitur, si-
us cruori aquæ permisto, quo thoracis
ates oblinuntur, ne nimium calefiant
exsiccentur. Hinc latere Salvatoris a-
to sanguis & aqua effluxerunt.

CAPVT VI.

DE CORDE IN
genere.

Cor à currendo ob motum dictum,
pars princeps animalis est, quâ nul-
animal carere visum est, teste Ari-
le, & ex cuius læsione animal ferè
moritur, quia vitæ fons est, & spi-
vitales elaborat, & per arterias à se
per totum corpus distribuit.

Cor eius est in medio corporis, si
non considerentur, ut in brutis fit; *Cor quare*
in medio. in medio.
ibus cor medium est, ob mobilita-
& securitatem, & in thoracis quo-
medio, ubi à pulmonibus undique

N 3

cingi-

cingitur. Est autem cor quo ad basin
actè in medio;

Motus ramen eius magis in sinistro
rere persentitur.

Error vul- 1. Quia in sinistro eius ventriculo
gi Cor esse ritus vitalis continetur, & à sinistris
in sinistro arteria magna: hinc vulgus putat cor
latere. sinistro residere latere.

Cur apex 2. Quia mucro cordis sinistram spece
cordis fini- ut diaphragmati cedat: ad dextram
strorsum verò declinare non potuit, ob venarum
inclinat. cavam, ibi per medium thoracem asce-
dentem.

Magnitudo. In homine quoad propor-
tionem maius est cor quam reliquis ani-
malibus, uti & cerebrum atque
Maius Cor Alioquin magnitudo variat pro ætate
in quibus temperamento. Frigidiores enim
reperia- medi cor magnum habent, calidi
lior. & audaciores minus. Hinc Aristoteles
affirmat de timidis animalibus, ut
re, cervo, mure, hyena, asino, mu-
&c. quod cor magnum in proportione
habeant.

Figura est conoidalis, quia in mu-
nem exit. Pars suprema ob vasa ibi
ta latior, & rotunda, quamvis non
etè dicitur *basis cordis*, radix vel caput
infima acutior dicitur *corus*, mucro

cusps, & apex cordis. Hippocrati ex-
mum & cauda. Anteriùs cor gibbosi-
est, posteriùs magis simum. In con-
tationibus totum cor est oblongius, in
tationibus maximis è globosum.

Connexio est cum mediastino & dia-
grammate, per pericardium; at cum a-
partibus, per vasa.

Substantia est caro vel παρέγχυμα so-
um, crassum, densum.

1. Ad sustinendam motus continuita-
n.

Cur substā
tia cordis

2. Ne spiritus subtile contenti cum
ore innato exhalent. Hinc caro hæc su-

adeò cras-

ras habet omnis generis ad robur, in-
em adeò commixtas & compactas, ut
n perspicuè cernantur.

Tunicā non facile separabili vestitur
e substantia, ad ulteriorem firmita-
n: cui adnascitur

Adeps circa cordis basin (non facile
ca conum, quia hic ab humore peri-
dii humectatur) 1. ad venas circa cor
ingendas, 2. & cor humectandum, ne
motu exsiccetur.

Interim rectè dixerunt Aristoteles, Ga-
ius & Avicenna circa nullam calidam
tè, ut cor, epar, arterias, venas &c. coire
ille τὴν πικρὴν, pinguedinē: hæc enim

An circa
cor reperia-
tur pingue-
do.

N 4

facile

facile à calore liquatur. Interim τὸ σκληρόν
adeps cū difficulter liquetur, adnoscere
potest.

Rarissimum autem est, quod invenit
Bauhinus, in cordis ventriculo reposita
frustula quædam adiposa.

Vena coronaria cordis. Vasa. Venam habet cor ad nutrimen-
nem, quæ coronaria dicitur, quia in-
venit cor amplectitur, aliquando gen-
na. Hæc à cava oritur extra ventricu-
lū cui valvula affigitur, ne sanguis refluat.
Ramos spargit deorsum per superficiem
cordis, & per sinistram plures, quia
fior ibi est caro.

Arterias duas habet coronarias à
gna.

Nervulum quoque à sextâ conjugum
ne obscurum, ad facultatem sensiti-
vam non motricem.

Error Fallopij. Falsum enim est, quod habet Fallopi-
us, per cordis basin dispergi multum
cohortem nervorum, & quasi reticu-
rem plexum: non enim animalis est
dis motus, cum cor non sit musculus
sed naturalis: nobis enim etiam non
lentibus cor movetur. Et Galenus
et negavit cor esse musculum. 1. Quia
omnis generis fibras habet. 2. Quia

An cor sit musculus.

aus est motus voluntarii instrumenti. Quod si verò quis dicat, cor esse musculus motus naturalis, improprie locutioni non repugnabimus: & ita esse potest Hippocraticum illud, esse musculus. Definit enim hunc, in orbem circumactam:

Temperamentum Cordis in activis est Error A-
vicenna.
imò calidissimum præ omni-
aliis partibus. Vana autem est Avi-
nae opinio, cor esse frigidum ob partes
quas continet, vasa & valvu-

In quibus verò calidius cor est, tho-
hispidus fit, & partes hypochondrii
na; iique homines iracundi & auda-
sunt.

Rariùs tantus calor est cordis, ut
hirsutum fiat & pilis refertum,
le invetum in Aristomene Messenio,
ibus Plinio & Valerio Maximo, & in
rmogene Græco, referente Cælio
odigino: & in latronibus quibusdam
ignibus testantur se hoc vidisse Beni-
nius, Lusitanus & Muretus. Tales ve-
homines audacissimi sunt, calidissimi
callidissimi, atque ut plurimum scele-

*Hispidus
thorax
quid signi-
ficet.*

*Hispidum
cor quid
significet.*

N

Jn

In passivis cor humidum est, humidum nempe cute, sed musculis siccus, quod durius: nam partes tantò humidiores sunt cute, quantò molliores.

Vfus.

I. Vitæ & caloris nativi fons est atque sedes, nam spiritum vitalem elaborat.

II. Sanguinem pro pulmonum nutritione conficit.

*Pulsus
quid.*

III. A putredine conservat motu continuo, qui *Pulsus* dicitur.

Est verò motus continuus & non cessans: quia continuè generari debet vitalis spiritus.

Constat hic motus ex systole & diastole, & inter utrumque motum intercedit quies.

*Diastole
quid.*

Diastole est dilatatio cordis; ut hauritur sanguis per venam in ventriculum dextrum, & aer per arteriam venosam in sinistrum.

*Systole
quid.*

Systole est contractio vel depressio cordis, & in longum exporrectio, ubi angustius redditur, nempe ut sanguis dextro ventriculo in pulmones effunditur per venam arterialem, & spiritus vitalis in arteriam magnam ex sinistro ventriculo, & pars quoque vitalis sanguinis cum fuliginibus in pulmones.

Diastole

Diversum autē motū habent auriculæ
cordis, de quibus modo dicendum,

CAPVT VII.

DE CORDIS PAR-
tibus in specie, Auriculis,
Cavitatibus, Septo, Vasis,
& valvulis.

Artes cordis specialiter consideran-
dæ aut extrinsecus conspiciuntur, ut
AURICULÆ; aut intrinsecus, ut VEN-
TRICULI seu cavitates duæ, SEPTUM
distinguens, & VASA cum VALVULIS.

AURICULÆ ita dictæ fuerunt nō ob *Auriculæ*
aditum, sed ob figuræ aliquam similitu- *cordis cup*
tudinem: nam ex basi longa desinunt in *ita dista*
tuncronem obtusum (sinistra tamen ma-
ius acuminata est) & cavitatem habent,
sinus ante cor producantur.

Sunt verò AURICULÆ processus
vel appendices

Sunt ad cordis basin ante orificia vascu-
lorum, utrinque una. Nam

Numero duæ sunt: dextra major, & si-
nistra minor. Illa venæ cavæ, cum quâ
communis quasi corpus constituere vi-
detur, apposita est: hæc arteriæ venosæ.

substan-

Substātia auricularū est peculiaris, quā nulla in aliā parte. Sunt tamen tenuiores molles ad faciliorem contractionē, nervosae ad firmitatem. Sinistra vero durior est, paulò carnosior & crassior.

Superficies externa in extensis & repletis, æqualis est & gibba, in contractis rugosa; & in sinistra quidem magis rugosa quàm in dextrâ.

Vsus.

I. Esse cordis promptuaria: recedunt enim primò sanguinem & aerem subito in cor irruant, unde cordis laceratio & animalis suffocatio.

II. Vasa, quibus apponuntur, turgent.

III. Hippocrati, esse cordi loco belli & refrigeratorii: moventur enim instar follium hæ auriculæ: & quia implentur, distenduntur; at cor, quia distenditur, impletur.

Error Aristotelis.

CAVITATES Cordis sive Ventriculi, vel sinus, thalami, specus &c. non tres sunt, ut falsò Aristoteles, sed duæ tantum reperiuntur in animali cavitate, dextra & sinistra, superficiem habentes ternam inæqualem & asperam, maxime vero sinistra,

Des.

Dexter ventriculus sanguinem recipit
cavâ, quam in se recipit: unde
tam crassa carne ceu pariete constat,
ut sinister, ut æquilibrium fieret, cum
materiæ contineat, & maius pon-
quàm sinister.

Non exactè rotundus est, neque ad
pericardii finem pertingit, sed videtur
quasi appendix ad cordis sinistrum
ventriculum, qui remoto dextro inte-
rim adhuc quasi cor repræsentare vi-
detur.

Latior tamen est, & major sinistro.
Sanguinis copiam, quam continere de-
bet, & pro pulmonibus nutriendis, &
spiritibus vitalibus in sinistro ventri-
culo gignendis. Nam

ius eius est I. Sanguinem recipere ex
cava, ad pulmonem nutriendum.
Sanguis iste effunditur in pulmones
venam arteriosam. Ideò pisces, *Pisces cur*
pulmonibus carent, & aerem per *unicam in*
res non inspirant, hunc dextrum ven-
triculum non habent, sed unicum tan-
trum *corde ven- triculum*
Hic ergò dexter ventriculus co-
& attenuat sanguinem pro pulmo-
nutritione.

II. Mittere partem tenuiorem per septum in sinistrum ventriculum, ad spiritus vitalis confectiorem

Sinister Ventriculus angustior est, sed bihor: rotundam habens cavitatem ad mucronem peringentem. Carne habet sex parietem triplo crassiore habet item durior, ne spiritus vitalis exhalent.

Vs est, spiritum vitalem elaborare duplici materia I. Ex sanguine in dextra cavitare preparato, & per septum transmissio. II. Ex aere per os & nares inspirato, in pulmonibus preparato, & per arteriam venosam in cordis sinistrum ventriculum missio.

SEPTUM vel interstitium est inter utrumque ventriculum, quod crassum instar alterius parietis sinistri ventriculi concavum parte sinistra, dextra gibbissimum, cavernosum & foraminibus (quæ aliqui putant esse tertium Aristotelis ventriculum) plenum; quæ cavernæ ampliores sunt dextrorsum, extremos verò ostes sinistrorsum vix cernere licet.

Un per se- Unde multi per hoc septum quicquid per septum cor-transire negarunt. Sed non mirum est *dis sanguis* dubitare. Nam *pertranse-* I. Anfractu feruntur ambagioso, ut *at.* faci

stilius penetrare queat. Magis ta-
fiunt isti pori conspicui in corde bo-
ni elixato.

In mortuis omnia concidunt.

Angustia esse debebat summa in-
quia tenuissima portio sanguinis
vasi percolatur. Interim, quia frustra
sunt hæc foramina, ideo

us septi est, ut per id sanguis ex dex-
triculo in sinistrum transeat, ad
sanguinis spiritusque generatio-
qui postea per arterias in univer-
sorum corpus distribuitur ad vitam & calo-
ratiuum servandum atque suscitand-

A S A circa caput cordis reperiuntur
duo insignia cor egredientia, quæ
Hæc vocat Naturæ humanæ
s. Dextro ventriculo inferuntur
duæ venæ: vena cava, & vena arte-

Sinistro totidem arteriæ: Arte-
riosa, & Arteria magna. Quibus o-
culis intus apponuntur VALVULÆ
membranae undecim, utilia, ne materia
refrueat.

Primum vas est VENA CAVA
dextro inferta, admodum
& patente orificio, ut ideo vi-
deatur ex corde oriri potius quàm
ab epa-

ab epate præsertim cum adeo firmiter
adhæreat dextro ventriculo, ut separari
nequeat.

Usus est, sanguinem inferre ab eodem
re.

Circulus membraneus huius orificii
annasitur ad cordis robur: qui finditur
statim in tres validas membranas
fas

VALVULAS, janitrices dictas, figuratas
intro spectantes, ut sanguis intrare
deum queat; sed non in cavam
re.

*Valvule tri-
cuspidæ.* Dicuntur *TRICUSPIDES*, Græcè
τριγλωχίνες, quia telorum trianguloribus
cuspidibus similes sunt, quæ
clauduntur, & invicem connivent.

Adnascuntur filamentis multis, quæ
junguntur carneæ particule; quæ co-
ligamenta aliis dicuntur, aliis fortè
vi cordis, ut Aristoteli.

VENA ARTERIALIS vel vas
riofum

*Vena arte-
riosa cur
vens.* *Vena* dicitur ab officio, quia pul-
pro nutritione dat sanguinem.

*Cur arte-
ria.* *Arteria* dicitur l. Ob substantiam
non est ex tunica simplici, ut vena
duplici.

Quia in foetu arteria munus obit,
capite sequente dicitur.
Iac minori orificio corde egreditur, *Eius ortus*
arteria magnæ innitens atque fini & progres
rsum inclinans ad pulmonis partes *sus.*
stram & sinistram duplici ramo ver
dextro & sinistro: qui postea in va
ramos pulmonicos abeunt.

sus est, sanguinem excipere ex dextro
triculo, & pulmonibus pro nutritio
dvehere. Et ne in correlabatur san

ALVULÆ tres apponuntur, à tuni. *Valvula*
sius venæ ortæ, intus foras spectan. *sigmoides.*
& semicirculum referentes vel Græ
teræ Sigma, unde *Sigmoides* dicuntur.
nent verò potius figuram latinæ lite

ARTERIA VENOSA tertium cordis *Arteria ve*
est, quod in sinistro conspicitur ven- *nosa cur*
lo. *arteria.*

icitur ob officium ARTERIA. Nam
llsat, siquidem sinistro ventriculo
inua est. II. Aerem continet & de
t.

ENAT. ob substantiam, 2. quia in
i venæ munus obit.

ritur orificio rotundo & magno (ma
jori

jori quàm arteria magna) statim a gressu bipartita, ac si ferè duplici oriretur; ac disseminatur in pulmonem dextrum & sinistrum.

Vsus

I. In dilatatione aerem attrahere Cor pro spirituum generatione.

II. In contractione, sanguinis portionem in pulmones excludere, fuliginibus: ideo tantum duæ.

VALVULÆ orificio huius vasis ponuntur, foris intrò vergentes (ex membraneo circulo ex cordis sutura enato) quæ junctæ mitram epipalem referunt. Maiores sunt, quæ valvulæ cavæ, longiora filamenta habent atque roboris gratiâ plurimas explantationes.

ARTERIA MAGNA, ita dicta, aliarum omnium radix sit, alterum sinistri ventriculi vas, unde prodit & eitur.

Ad huius orificium fulcris loco ponitur non quidem in homine, sed in animalibus quibusdam dura quædam substantia, quæ aliquando cartilaginea, quâdo ossea, prout magna & annosa animalia.

est, spiritum vitalem à corde accedentibus partibus communicare, in cor remeet, apponuntur tres e intus foras spectantes, quæ Sig- dicuntur.

CAPVT VIII.

VASORVM COR-
dis foetus unione.

Corde aliter se habent vasa, dum in utero est, aliter, cum jam in luto- tus est; Quod licet Galenus non- que mentionem iniecit, tamen- Anatomici aut neglexerunt, aut de re protulerunt, dum unio- rum dixere quidam fieri tantum- olem, quidam per solâ anastomo-

conjunctiones seu UNIONES
V M cordis in foetu sunt dupli-

it per anastomofin, alia per cana-

anastomofin fit unio Venæ Cavæ
Venosæ, sub dextrâ auriculâ
coronariam, antequam cava se
dextrum ventriculum aperiat.
est aniplum & ovalis figuræ.

O 2

Voluit

Voluit autem natura unionem
per *ἀναστόμωσιν* moliri. i. Ob vi-
tem. ii. Ob similitudinem sub-
rum.

Foramini huic in cavitate arteri-
nosæ apponitur *membranula* pendu-
nis & dura, foramine major.

Vsus est, ut per hoc foramen ex
in arteriam venosam feratur sang-
in dextrum Ventriculū, nam non
tur adhuc vitalis spiritus, nec ita a-
to eget pulmo sanguine) ad nutriti-
pulmonis; cum hic alias in fœtu
non posset, quippè in quo cor non
motum, quo expelli posset sang-
dextro ventriculo in venam arteri-
Quare hæc arteria Venosa dicta
vena est.

*Vsus mem-
branulæ.* Ne verò sanguis in Cavam rel-
prohibet membranula apposita,
concidit.

Post partum aliquantulo temp-
alescit hoc foramen & exsiccatur
cus hic nunquam pertusus fuisse
tur.

Per canalem oblongum est alter
videlicet Venæ arterialis, & arteri-
gnæ, quia à se invicem distant.

unicus unio extra cor est (prior in cor-
 obus digitis à basi, in adultis qua-
 nam non à caudice arteriæ magnæ
 Canalis. Obliquè ad arteriosam
 leò nulla valvula apposita est, si-
 non obliquitas regressum impedire
 ubi hæc bipartitur, ac si in tres
 divideretur; quarum minima ta-
 t canalis.

Infantibus trium vel quatuor an-
 reperitur quidem adhuc, sed non
 is; in adultis tandem paulatim at-
 ur & siccatur, donec penitus con-
 at.

est, ut Spiritus Vitalis ab arteriis
 calibus in arteriam magnam rece-
 hac per canalem illum in venam
 sam feratur, & rectà in pulmones,
 m.

CAPVT IX.

DE PVLMONI-
 bus.

PVLMONES Græcis πνεύμονες à re-
 ando dicuntur: quia animalibus

O; in

in aere viventibus & respirantibus
sunt, piscibus non item.

Siti sunt in pectoris vel thoracis
te, quam implent, quando disten-
tur.

Dividitur pulmo in partem dextram
sinistram beneficio mediastini : ut
parte læsa altera adhuc officium

Lobi pulmo Harum quælibet in duos lobos dirigitur
rarius una earum in tres : quibus
quam digitis cor pulmone amplectitur.

Figura est ungulæ bubalæ. Extrinsecus
ad thoracis cavitatem pulmone
sunt, intrinsecus cavi, ubi cor a-

Etuntur.
Color in foetu est rubeus ut epatis
alimentum, quod à matre accipitur
adultis ex pallido flavescent : aliquando
cinericius ; in iis, qui morbo diu
obière, nigricans.

Connexio est antèrius cum sternum
mediastinum, posteriùs cum vertebra
ad latera cum pleura per fibrosos
caussa quæ aliquando connascuntur pulmone
de dispnæa oritur diuturna. Hip-
tes 2. de morbis vocat pulmonem
eius delapsum ; fitque hoc vel ab o-

pleuritidem, vel ob pituitam tena-
viscidam se interponentem; vel
sa externa, ut curatione negligenti-
in fossi, vel suppurati thoracis. Co-
etiam pulmo cordi per venam,
osam & arteriam venosam.

Substantia in fœtu est densa & crassa.
post partum quia moveri cum corde
at, calore & motu caro levis mol-
fit, laxa, rara & spongiosa; ut
attollantur pulmones, & rur-
collabantur, aeremque faciliè reci-

Membranâ cingitur pulmo tenui,
poris multis insignitâ (hinc sa-
thoracis penetrare potest, & per
exire) quæ à succingente pleu-
ducitur. Nam cum vasa pul-
s intrant, tunicâ suâ à pleura ena-
se exuunt, quæ pulmones postea
tit.

Vasa. Substantia pulmonis tri-
us intertexitur vasis non parum
ad robur facientibus. Duo à
veniunt, de quibus supra di-
Vena arterialis & arteria Venalis.
tium proprium est videlicet

Q 4

Trachea

Trachea sive aspera dicta arteria, de
sequenti capite.

Pthiſeos Vasa hæc si erodantur, ut in *Pthiſeos*
cis, sæpè copia sanguinis ejicitur,
caussa que cartilaginosa substantia. Sæpè
dam, & in *Pthiſici* inopinata morte extinguuntur
de mortis quia vasis erosio majoribus effuso
repentine, guine cor obruitur.

Pulmo præ Vasa hæc pulmonum magna sunt,
omnibus plurimo sanguine egebant; nec ulla
partibus est corporis ita sanguine abūdans quæ
sanguine modum pulmo, ob motum perpetuo
abundat. & copiam caloris tam ex motu, quæ
cordis vicinā.

Modus pe- Et quia attenuato & subtiliori san-
culiaris nu- guine nutritur, hinc venæ pulmonis
trititionis cas venarum habent, ut nil nisi su-
pulmonū. transfudet: arteriæ verò tunicas
rum, ut copiosè sanguis arterialis &
tilis perfluat, contra quam in aliis or-
bus sit partibus.

Cur ulcera *Nervi* exigui à sexto pari tantū
pulmonum membranam eius sparguntur, non
indolorifi- substantiam, ne ex motu assiduo
ca. ant: Hinc pulmonum ulcera absque
lore fiunt.

otio pulmonis officialis nulla est, uti *Error Aver*
 rrhoes, qui putat, pulmones pro- *rhois.*
 vi moveri, nec thoracis motum se-
 dicatque alias dari motum aliquem
 entum perpetuum.

ed tenendum, pulmonem, licet respi-
 onis vas sit, non tamen agendo, sed
 endo. Nullam enim propriam moven-
 um habet, sicuti vult Averrhoes, nec
 us principium à corde accipit, uti *Error Ari-*
 stoteles; sed tantum thoracis *stotelis.*
 um ad fugam vacui sequitur.

Quare aërem inspiratum tantum reci-
 quia thorax se dilatando aere pulmo-
 n complet.

Pulmonis autem motum à thorace *Motum pul-*
 , experientia constat. Nam si tho- *monis esse*
 em penetrante vulnere percussus aer *à thorace*
 rediatur, immobilis pulmo manet, *probat.*
 a thoracis dilationem sequi non
 est, aere se per vulnus in spaci-
 ne insinuante. At integro thorace,
 is amplificationem sequitur pulmo,
 fugam vacui. Quia verò pulmo est
 trumentum respirationis, hinc sequē-
 g habet

O s

Vsus

Vsus I. Dum dilatatur; deinde dum constringitur.

Dum dilatatur, recipit instar folliis rem per tracheæ ramos.

I. Ad aerem cordi præparandum spiritus alimonia convenienti. Non

Non quem nim quælibet aeris qualitas spiritui *via aerem* stro amica est, uti videre est in iis, *spiritui ho* extinguntur ex carbonum fumo, ita *minis esse* in ædibus calce nuper illitis.

amicum. II. Ad caloris ventilationem & re-
generationem. Videmus enim calorem *Calorem* strum frigido indigere, & absque eo *nostrum in* stingui, ut liquet in iis, qui diutius in *digere fri-* ventissimis balneis morantur, sicut *gido.* flamma in angusto loco aere non ven-
lara contabescit & perit. Quare pulmo

Pisces cur & pisces in aquâ, quia non indigent *pulmonibz* hac refrigeratione, pulmonibus carent
non ege- Ergo pulmo ad vitam absolutè non *tant.* necessarius, sed ad cordis commodi-
tem.

Dum cōstringitur pulmo in expiratione iterum duplicem usum nobis præstat:

I. Fuliginosa excrementa per eū exeunt

II. Ad vocem facit, quatenus dat fir-
ritum ad edendam vocem. Quamobrem
animalia pulmonum parenchymate de-
tuta vocem non edunt.

CAPIT.

CAPVT X.

DE FISTVLA PVL-
monum.

FISTULA vel canna PULMONIS ve-
teribus Arteria dicta est, eò quod ae-
m contineat: Galeno & aliis Trachea
eu *aspera arteria*, ab inæqualitate, & ad
differentiam arteriarum lævium. Est au-
tem canalis pulmones inferiore parte
lurimis ramis, quos Hippocrates Sy-
ngas & Aortas vocat, ingrediens; cu-
us caput *larynx* dicitur, de qua sequenti *Trachea*
apite, reliquum vero *bronchus* dicitur, eò *quid.*
quod à potu irrigetur. Aliquid enim po-
tus ferri etiam in trachæam & pulmo-
nes rectè probat Hippocrates ex macta-
to recentè porco, in cuius pulmonibus
materia ita colorata reperitur, qualis
latim antea ab eo hausta. Et quod ali-
quid potus deferri possit per Tracheam *An potus*
probari potest ex Julio Jafolino, Ana- *aliquid in*
tomico Neapolitano, qui in nobilissimi *tracheam*
cuiusdam viri cadavere quærens causam *& pulmo-*
mortis, invenit pericardium adeò humo- *nes descen-*
re distentum, ut eo presso aliquid humo- *dat.*
ris per os effluerit.

Siguo

Situs. Oesophago incumbit, nam a
ore recta deorsum per collum ad pulmo-
nes fertur: Eius verò rami, qui reliquorum
vasorum pulmonis ramis majores
pulmonem ingredientes, inibi feruntur
medii, inter venam arteriosam, quae
posterius est, & arteriam venosam, quae
anterior: quibus cum jungitur per anastomoses.

Membrana vestitur duplici: una extrinsecus,
secus, altera intrinsecus.

Externa tenuis à plevra est, & arcte
cohæret cum cartilaginum intermediorum
ligamentis, atque nervos recurrentes du-
ducit.

Interna crassior est, densior & solidior
(maximè verò in laringe, minimè in ramis
pulmonum, medio modo in fistula mediâ)
idque ne lædatur facilè à rebus acris
tribus haustis, aut aliis per tussim reje-
ctis, aut aliis à capite decidentibus.

Oritur hæc à tunica palatum succingente,
ideoque continua est ori.

Pingui humore inungitur ad prohibendam
exsiccationem in motibus, clamoribus,
Vocis lesio. ribus, aeris calidioris attractione, fuliginum
acriorum exitu &c. Atque vox ex
huius

ius humoris copiâ vel inopiâ læditur.
illâ enim per destillationes contracta,
ca fit; In hac ex febribus ardentibus
clangosa fit.

Exquisiti sensus est hæc tunica,
ad molestorum expulsionem insur-

Inter geminas has membranas est Tra-
chea propria

Substantia, quæ partim cartilaginea
partim ligamentosa.

Ex parte *cartilaginea* esse debuit & non *Trachea*
totum ligamentosa. *cur Carti-*

Ob vocem: quia quod sonat soli-
m esse debet. *laginea.*

Alias ob molliciem semper concide-
ret & non facile aperiretur in respira-
tione.

Ex parte *ligamentosa*, & non tota carti-
laginea esse debuit: Nam si aut ex unicâ *Cur ex par-*
instaret cartilagine, aut multis planè *te ligamen-*
cularibus, *tosa.*

Semper esset aperta, & non concide-
ret atque dilataretur.

Oesophagum premeret, cui tamen
edere debet in deglutione præcipuè
solidorum ciborum, ut sufficienter gula
dilate-

dilatetur. Atque ita cartilagines
vocem faciunt; ligamenta verò mem-
branosa ad respirationem.

Cartilagines sunt multæ, rotundæ
annulares, sed non perfectæ. Parte
nim posteriori, quâ Oesophagum tan-
gunt, quarta circuli pars deest, cuius
loco membranosa est substantia.

Connectuntur hæ cartilagines per in-
termedia ligamenta, quæ in homine ca-
nosiora, in brutis membranosiore; &
homine, ac si viderentur esse muscu-
liperexigui. Atque ubique æqualiter à
invicem distant cartilagines: & quo
periores, eo majores sunt.

Uſus

I. In inspiratione, ut per eam tan-
quam fistulam aer à pulmonibus seu fo-
libus recipiatur.

II. In expiratione, primò, Ut per eam
dem fuliginosa excrementa ad os & na-
res excernantur, Deinde ut ad vocem
faciat, unde Hippocrati organum
spirabile & vocale di-
citur.

GAPV

CAPVT XL

DE LARYNGE.

Stulæ huius pulmonariæ caput seu
initium dicitur LARYNX, quæ est
organum,
in collo, & quidem in medio,
mero unicum est, ut una vox eda-

gurâ rotundâ & circulari ferè; quia
avum ob vocem esse debuit; sed
antica magis extuberat, posticâ
mitur, ut gulæ cedat, in deglutitio-
asertim, in qua, dum œsophagus
mitur, larynx sursum recurrit, &
glutitionem adjuvat, tum cedendo,
deprimendo.

Magnitudo variat secundum æta- *Vox gra-*
Nam in junioribus larynx angu- *vis acuta*
unde vox acuta; in adultioribus *unde.*
unde vox gravis. Ad quæ et-
ficiunt laryngis longitudo vel bre-
& si accedat aeris vel spiritus in-
copia, fit vox magna: si inopia, fit

Unde

*Vocis magna quæ
causæ.*

*Mutatio
vocis unde.*

Unde Galeno vocis magnæ causæ sunt. amplitudo asperæ arteriæ, & tæ efflatio, utramque verò docet Hippocrate esse à magno calore. Quod obrem in libro de sem. testes docet ferre ad conformationem vocis. masculi pubertatis tempore vocem tant. Hinc vox mutatur in castratis quos castratus hinnitum deperdit. canere definit, aut cantum infirmior & à priore discrepantem habet.

Partes laryngis & circa laryngem cartilagine, musculi, membranæ vasa & dule.

Musculi occurrunt omnium præ qui cartilagine movent, quos ob larynx, ut voluntario motu moetur, cum vocem pro arbitrio mus.

Sunt autem humanæ laryngis non nisi tredecim, quatuor communes & novem proprii; licet alii viginti octodecim, alii quatuordecim conant.

*Communes musculi
laryngis
quid.*

Communes sunt, qui in laryngem plantantur, ab ea tamen non o-

proprij in larynge & oriuntur & finiuntur

Communium par primum, quod inferioritur interius à sterno & juxta tracheam progrediens, inseritur inferne in cartilagine scutiformis.

Usus est rimam laryngis coarctare, & scutiformem detrahit.

Secundum par, quod superius, oritur superiori sede ossis hyoidis, inseritur apicem scutiformis.

Usus est rimam dilatare, dum scutiformem attollit.

Alij hic *tertium par* addunt, quod tamen à Columbo & Casserio pro uno habetur musculo.

sed hic potius deglutitorius est quam quidem à scutiformi quidem pronatur, sed gulæ circumplicatur.

atuitur scutiformis latera contrahendo rimam constringere: sed laryngi nisi per accidens famulatur.

Primum par proprium oritur anteriùs ab apice scutiformis parte, ut nervorum portio docet, & in annularem tendit.

hoc par dici potest Thyrocricoideum non verò ut alij Anatomici volunt, thyrothyroides.

Usus est annularem cartilaginem ad scutiformem trahere, ut jungantur.

P

Secun-

Secundum par ab annulari posterius
tur, & in glottalis partem inferiorem
implantatur, laryngem aperiens. *Latini*
vocant Crycoarythenoides. *Cassius*
hoc par cucullare vocat.

Tertium par ab annularis lateribus
perius oritur, & ad glottalis lateris
articulum inferitur, laryngem aperit.

Quartum par intrinsecum & valde
prodit a scutiformi anteriùs & interius
definit in latera glottalis. laryngem claudens.

Nonus musculus, alijs quintum par, oritur
a postica guttalis linea & fibris transver-
sis delata in ejusdem latera inferitur
laryngem claudens.

Musculus Πιγλωτῖδος in hominibus
est. Nam voluntariè in eo non mo-
vetur, uti nugantur aliqui; sed ad sub-
stantiæ pondere deprimitur.

In belluis autem musculis don-
de Πιγλωτῖς, quæ perpetuæ ciborum
digestioni inhiant, ruminant, & Πιγλωτῖς
prægrandem habent. In his verò alij
musculi ab hyoide oriuntur, & in basin
glottidis, quam attollunt, implantantur
(& hoc par pro quarto communi re-
fert Vesalius) alij siti sunt inter Πιγλωτῖ-
dos tunicam & cartilagineam, claudens.

Cartilaginee laryngis quinque sunt: quæ
fenestribus aliquando instar ossium in-

tur; unde aliqui suffocationis pericu-
m in paribulis declinaverunt.

Prima cartilago dicitur *ῥυρκοειδής*, vel *scuti-*
di, scutalis, clypealis, peltalis &c. a for-
quia intus cava est, foris gibbosa &
minens, magis tamen in viris, quam
fieriibus: quia harum collum exæquāt
modulæ ad laryngem positæ. Protube-
ia illa in collo anteriùs conspicua
tur *Pomum Adami*. In medio distin-
tur lineâ, unde duplicem alijs consti-
tuit; cum revera duplex rarissimè in-
atur.

Secunda *κρυκοειδής* sive annularis, quia
unda est instar annuli, & totam laryn-
nambit. Est autè instar annuli Turci-
m posterior pars est lata & crassa ad-
um. Vulgò *innominata*, quia antiquis
nomine.

Tertia & *Quarta* alijs unica: sed si mem-
a exuitur, apparebit esse geminam.
tur *ἀρυστοειδής*, guttalis, ob formã
irij vel ollarũ parti, quã aquam ef-
imus: si duo processus partis superi-
considerentur, qui juncti constituunt
lã pro modulãda voce, quæ alijs lin-
appellatur, parva lingua, vel *γλωττις*.
nō fit, nisi per transitũ augustiorẽ.

notandus hoc loco *sinus*, qui forma-
ter guttalem & scutalem, à mem-
branis

Pomum A-
dami ma-
gis promi-
net in viris
quam mu-
lieribus.

Glottis.

branis cartilagine colligantibus quem, si fortè inter ridendum vel quendum, ubi aperitur *Ἐπιγλωττις* capanis vel aliquid ex potu incidit, sis excitatur, quia cōtra spiritum fen- Sed si sensim aliquid per rimā delab- ad parietes laryngis, spiritui non ob-

Epiglottis. Quinta *Ἐπιγλωττις* dicitur, quæ rimā regit & claudit, ne ex cibo vel potu tracheam multa decidant, sed claudat epiglottide in gulam abeant. Non exactè clauditur, quin parum ad laryngem ex potu descendere queat. Quando dicitur potum non transire in tracheam & pulmones, de maxima parte intelligendum est: nam aliquid eo deferri præ audivimus. Vnde in adfectibus racis eclegmata & tabellas præscribere in ore reclinato capite tenendas, de liquecant; ut portio aliqua per tracheam parietes defluat.

Est autem mollior epiglottidis *STANTIA*, figura linguæ, vel secundum Hippocr. folij hederæ. Utrinque; verò *brana* ori communi alligatur; quali et lento humore perfusa succingitur laryngis interna cavitas, & extra quoque laryngem obvolvitur.

Vasa. Venas habet larynx à jugularibus interna.

terias à Carotide, Nervos Galeno vo-
dictos pro motu musculorum à se-
ris ramo recurrente.

andulae adstant duplices.

ad laryngis sedem altiore vide-
ad ungulae seu gargareonis latera;

dicuntur tonsillae vel amygdalae, item *Vfus amig-*

thmia & Antiades: quae spongiosae *dalarum*

sint (utrinque una) humiditatem ce- *duplex.*

uscipiunt, in salivam convertunt, *Saliva.*

gratia humectantur fauces, larynx,

& oesophagus; quamvis & ad gu-

qui sine madore non fit, faciat. Sunt

andulae circa linguae radicem, & co-

loris tunica teguntur, atque venas à

aribus accipiunt.

adstant inferiori laryngis regioni,

una, magna & fungosa, per quam

minatur venae ex jugulari externa. In

is magis perspicua est, in homine &

magis carnea.

est humiditate viscosa & pingui (non

laryngem irrigare, ut cartilagine

tum aptiores fiant, & vox suavior

etur: quod imitantur ij, qui fistulas

ungunt.

laryngis est esse vocis organum.

ana enim vocis sunt vel remota vel organa

iniqua. Illa thorax & pulmo. Haec vel vocis quae

reparantia, ut Trachea vel adjuvan-

tia, ut *musculi & nervi*; vel conservantia *os & guttur*. Maxime vero principalis est *LARINX*; ejus vero pars, quæ *glottis* citur, proximum & adæquatū est organo

Vox quomodo fiat.

Vox autem hoc modo fit: Aër subitū cū nisu exsufflatur beneficio pulmonum rimula verò mediocriter angustatur ex aeris allisione fit vox. Vnde Arist. est ictus aeris; intelligendo in sensu sali, actionem pro qualitate inde tante. Si verò patente organo egred

Suspirium.

Spiritus, fit *suspirium*.

Vox in propria significatione

Quamobrem propriè vox dici ne sonus ille, qui editur ab animalibus, organo, caretibus; ut sonus piscium rundam, ranæ coaxatio, cicadæ strepit

C. A. P. V. T. XII.

DE OESOPHAGO.

OESOPHAGVS alijs *gula* alijs *stomachus* est fistula vel infundibulum ventriculi, sicuti trachea fistula pulmonis

Situs ita est, ut initium habeat in *trachea* bus, & ab his rectà descendat in ventriculū sub *trachea*. Vbi verò ad quintā racis vertebram pertingit, aortæ per diū lata cedendo dextrā versus incli postea rursū ad sinistram arteriam gnā conscēdit, & per diaphragma in ventriculi os sinistrum, una cum vis binis à sexto pari oriundis.

tenas vero habet paucas à portæ ra-
monario, & à cava.

terias à Cæliaca & trunco Aortæ de-
cedente.

connexio est in initio cum faucibus, & In affecti-
phage, per tunicam oris, quæ ipsi & ven- bus gula,
iculo, continua. Vertebriis, tracheæ, & applicanda
ais partibus iungitur per membranas, dorso To-
orfi ligamenti ortas. Quia verò spi- pica.
uperjacet, ideo eo adfecto topica
a applicamus.

andulosum corpus parte posteriore ad-
tur, quod humorem suppeditat, ad
mendam cavitatem, pro faciliori de-
tione.

stantia ejus ex triplici constat tunica,
licilius distendi in longum & latum possit.
na communis est cum ventriculo. Hanc
aliq à vertebriarum ligamenti, aliq
vra ortam volunt. Oritur inde autē,
mēbrana ventriculi est videlicet à
conæo nam continua est membranæ
triculi. Insigniter est tenuis & fibris
oī omnibus destituitur.

unda est propria prima. externa, carnea
crassior & mollior est, ac si musculus
oratus esset vulgo rotundis & trans-
is fibris pertexta.

tia est propria secunda interna, quæ est
is nervea, paulo subtilior & durior,
gò rectis & longis fibris prædita.

Cæterum contra vulgarem hanc opinionem testantur oculi, internam transversis & circularibus villis effectam, externam rectis & oblongis.

Musculi Oesophagi, qui ab alijs si pede prætereuntur, *quatuor* sunt.

Primus ille est de quo supra in larynx

Secundus & *tertius* exiles sunt in fauces, & à palato prosilientes, in principium finiunt.

Quartus à mento interno enatus, vix fibrarum plexum inseritur, & apparet eadem quoad fabricam duplex.

Actio ergo Oesophagi est animalis, per musculos fiat non verò naturalis vulgaris omnium est opinio, & deglutitio certè ex nostro pendet arbitrio.

Deglutitio autem fit hoc modo. Quando aliquid venit devorandum, musculus primus; Galeno sphincter dictus, ex parte se contrahit, unde fibræ ejus liquæ, quæ ab oesophago ad larynx tendunt, transversæ redduntur, quæ cum sit, larynx attollitur, & gula demitur: atq; ipsius gulæ jam depressæ cætas angustatur. Huic succurrit quartus musculus. Nam sicut primus constricit cibaria per masticationem conglobat circumvenit, & amplexando deprimat, & hic quartus se contrahens, ex ar-

*Deglutitio
an sit actio
naturalis
an ani-
malis.*

*Deglutitio
quomodo
fiat.*

ibus illi velut obviā venit, & ore al-
ta ne retrorsum ruāt, omni ex parte
bet, repellit, & in oesophagum trans-
it ut ita ex utroq; musculo cōstricto,
misp̄hærico simul juncto, fiat veluti
eger circulus & sphincter absolutus.
q; musculus est, in cuius fabrica fere
aes errant, usum verum aut igno-
aut masticationi tribuunt, & linguæ
cioni.

Isus gulæ est, ut per eam tanquam per
ndibulum, cibus & potus in ventri-
m deferatur.

Et deglutiuntur quidem facilius li-
la, quam solida, e contra verò in x-
nonnullis, ubi facultas magis irrita-
fortiori objecto, alias sopita, præ-
m in paralyfi.

*Cur ali-
quando so-
lida facili-
us deglu-
tientur,
quam li-
quida?*

CAPVT XIII.

DE COLLO.

Appendix ad medium Ventrem est
COLLUM, ceu medium quoddam
inter caput & thoracem.

ducitur à colendo, quia exornari solet.
longum est ob vocis modulationem.
ic, quæ veram vocem non edunt ani-
ia, ut pisces & ranæ, collo carent: quæ
rò maximam vocem edunt, colla lon-
ma habent, ut grues & anseres, &c.
ars colli posterior propriè *cervix* di-
P s citur

citur, Partes autem colli vel sunt externæ, ut cutis, musculi, &c. vel internæ, ut vasa percurrentia, trachea & œsophagus, de posterioribus actum: de reliquis suo loco.

Liber Tertius DE SUPREMO CAVITATE.

*Cur caput
in summo
positum.*

Tertius vel *supremus Venter* est *caput*, animæ sensitivæ domus, & principium præcipuum, quod in summo positum est oculorum gratia, qui ibi quasi in specula constituti cerebrum statim adesse debuit oculis quippe molles nervos habentibus, longum ductum non ferentibus.

Figura.

Rotundum est sive sphericum caput, simul compressum, & nonnihil oblongum.

Substantia.

Magnitudo homini præ alis animalibus insignis est, ob cerebri molem. Atque tutiori munimento totum osseum est caput.

Dividitur caput in partem capillatam & non capillatam.

Illa CALVA dicitur, hæc facies.

Calvæ partes externæ recensentur.

Incipit, estque pars anterior à fronte usque ad futuram coronalem.

Occiput

Occiput, estq; pars posterior ab initio
turæ lambdoidæ, ad primam cervi-
vertebram.

(bosa.

Vertex, estq; pars inter has media & gib-
Tempora, suntq; partes laterales inter
ulos & aures,

Calva autem partes constituentes sunt
vestientes & externæ, aliæ contentæ
internæ. Illæ vel sunt communes, ut
scutula & cutis pilosa, pinguedo, mem-
bra carnosæ: vel propriæ, ut pericraniū,
periostiū, musculi, ossa, meninges duæ.
Contentæ sunt cerebrū, cerebellum &
medulla partim in calva, partim in spina
istens.

Pars capitis glabra, *facies* dicta, præ-
cipue partes continentes, proprias habet
partes, vel superiorem, quæ *frons* dicitur,
vel inferiorem, in qua organa sensuum
sunt; ut *oculi*, *nares*, *aures*, & *os*, in quo lin-
guæ aliæq; partes latitant.

CAPVT II DE PILIS.

In capite maxima copia pilorū est, ideo
sic commodè pilorum natura docetur.

Pili in animalibus ferè omnibus intra
generantibus animal, reperiuntur, te-

Aristorele: quorum loco in piscibus
nullæ sunt, in avibus penæ, in nonnul-
tis animalib9, ut erinaceo, aculei oblongi,

Sunt

*Pili quibus
in anima-
libus.*

Sunt autem *pili* corpora quidem, non partes corporis, nisi lata admodum significatione, qua partes aliquæ ad naturam pertinere dicuntur.

Pili & ungues an ex bono aliquo alimento nutriantur.

Causa materialis ex qua *PROXIMA* sunt fuliginosi & excrementitii vapores crassi & terrei, non nihil tamen glutinosi. Falsum ergo pilos & ungues nutriri & generari, ex bono atq; laudabili alimento. Etenim crescunt etiã heceticis tabidis, præcisiq; semper crescunt in quavis ætate; atq; sæpius abscissi citius crescunt. Immo in defunctis, ut furibus & crescunt. Videatur Paræus in fine operis, qui cadaver conditum domi suæ habuit a 24. annis, cui semper crevère pili & ungues quoties resecurit. Ergò fuliginibus & vaporibus nascuntur.

Quo loco pili generantur?

Materia remota est humiditas superflua, præsertim quæ in glandulis continetur. Propterea ubi glandulæ, ibi plurimum pili, velut ad aures, sub alis, inguinibus &c. Si verò aliquando glandulæ adsunt, absq; pilis, ex nimia copiâ humoris hic pilorum defectus oritur.

Nam *materia in qua*, vel *locus generationis* pilorum non debet esse nimis humidus, neq; nimis ficcus, sicuti nihil generari videmus in loco palustri & fuliginoso, neq; in terra nimis arida.

Idco

Ideò *cutis*, quia pars temperata
locus est generationis pilorum; sed si
 humida nimis est, vel nimis sicca, ut in
 quibusdam fit, pili non erumpunt: Hinc
 animalia crustata, ut cancri, ostrea &c.
 carent.

Cutis ergò in qua pili generabun-
 esse debet moderate sicca, ne pilus *Cur crusta-*
 sua seu radice excidat; nec non *ta nimis as-*
 moderatè laxa & rara, ut penetrare pi- *lia pilis ca-*
 possit. Hinc per totam cutim, quia *reant?*
 sa est, pili oriri possunt, & habet
 in quilibet porus infixam radicem
 nam, si excipias volam manus & plan-
 pedis, quæ partes ob motum & at-
 tionem perpetuam carent pilis, &
 sentire maxime debuerunt. Hinc ex
 trice quippe poris destituta; nullus
 erigit pilus.

Efficiens est calor moderatus, fuli-
 sos istos vapores exsiccans, & foras
 poros cutis protrudens.

Æctria jam explicata, præcipua sunt *Te uisita*
 ista ad pilorum generationem, vide: *ad pilorum*
materia, locus conveniens & calor. *generatio-*
 nem.

Inde è contra colligi potest *causa cal-*
vici.

Quando materia deficit. *Calvitiei*
 Quando cutis est ab ortu siccior, *causa.*
 istea magis siccat, nec à parte ali-
 a vicina humectatur. Intelligen-
 dum

Cur Syn- dum autē est synciput, quod ferē so-
put tantum fit calvum, & parte posteriore nemo
calvescit, vescit, inquit Aristoteles. Nam inte-
 rim & cranium in syncipite non in-
 ant muscoli aut pinguedo, sicut in ca-
 pitio & temporibus; ideò ibi cute, &
 testacea reddita, capilli decidunt.

3. A calore peccante, in defectu
 excessu. Imbecillis calor non satis e-
 cat materiam, ut in frigidis & humi-
 in senibus &c. nimius calor & siccus
 dices pilorum planē exurit. Hinc
Ex coitu coitum nimium incalescens humor
nimio cal- quando calvitiam parit, & ea pro-
vities. pueri & evnuchi non calvescunt.

Dividuntur pili vulgo in congen-
 & postgenitos.

Congeniti sūt, qui in uterò materno
 biscū nascūtur, suntq; triplices: Cap-
 pili seu capilli, superciliorū & palpebrarū.

Postgeniti extra uterum nascuntur
 homine, quando ad justam pervenit a-
 tem, hoc est, quando in puero semen-
 sci incipit, & in virgine mensibus via-
 tur, tum enim summa cutis rarescit.

Sunt & hi triplices: nam 1. ori-
 tur pili in pube, deinde sub alis, & u-
 mo in mento virili, non muliebri: n-
 in mulieribus menses materiam ab-
 munt barbæ, unde interdum menstrua
 cū

in subsistente, quibusdam mulieri-
pilis in mento prodeunt.

Finis vel usus est.

1. Esse partium tegumentum.

2. Earundem ornamentum. Et hæc

in pilis capitis & faciei ostendun-

Nam

capilli i. cerebrum humanum tegunt

externis injuriis, frigore & calore &c.

Cerebrum habet homo præ cæteris

animalibus maximum, sic capillos co-

ssimos.

*Cur homo
copiosos ca-
pillos ha-
beat.*

Calefaciunt moderatè, cum aliàs

capite pinguedo nulla calefaciens; sed

is ossea substantia, eaq; à corde diffi-

Capilli verò pro judicio Medici in

el illo sunt magni relinquendi aut

abscindendi, sed non planè abra-

, quia defluxiones inde concitan-

ic etiam barba maxillas & mentum

, & moderatè calefacit.

Ornant: nam calvi & depiles defor-

nunt, ita & barba ad ornatū facit, &

abundū virum efficit, præsertim si

indiq; circumfundantur. In mulierib9

quæ formā venerāda nō erat opus.

forma pilorum per accidentia de-

potest, quæ sequentia sunt:

Magnitudo: Longissimi verò

sunt capitis, quia cerebrum

majus

*Barba gra-
nati.*

maius est quā reliquæ glandulæ: & crassissimi, quia capitis cutis crassissima, sed tamen rara, & sufficientem humorem continens.

Pro ratione ergo cutis vel crassa vel tenuis, raræ vel densæ, item humoris copiosi vel pauci, & caloris debilis vel fortis, fiunt pili crassi vel tenues; duri vel molles, copiosi vel non copiosi, & recti vel crispi.

II. *Figura* Pili recti sunt & simplices in iis, qui humore abundant; crispiores in iis, qui sicci sunt. Hinc crispiores sunt rectis. Hinc omnes Aethiopes crispi sunt; videlicet ob siccitatem temperamenti. Schytæ verò & Thraci pili sunt promisso & simplices; quia temperamenti sunt mediocris, teste Aristotele. Deinde pili recti fiunt ob meatum rectum, per quem fit evaporatio; crispi e contra.

III. *Color* in brutis æmulatur coloris cutis: in homine admodum variatur, & sequitur regionem & aerem ambientem, humorem prædominantem; &c.

Nam qui calidas & cæcas regiones incolunt, pilos habent non tantum crassos, crispos & fragiles; sed etiam grossos, ut Aegyptii, Arabes, Indi. Si Ispani, Itali & Galli ex parte, ut plerumque

hos capillos alunt. Qui humiditas & caliditas regionēs; non tantū molles, & longosq; pilos habent, sed ut plurimū nigros vel albos, ut Dani, Angli, Norvegi, Scythæ, etc.

Deinde humor prædominans colorat pilorum: ut pituitosis albi, ut siccis sunt pili, & ita consequenter.

Sed & calor varius variè colorat: immodicus calor dat nigros capillos, nam vaporosum excrementū ex calore decoquitur, & in exactam fuliginem mutatur. Calor autem temperatus dat flavos; temperatior rufos, immodicus albos. Sed facilè concurrit ut hæc colorum causa in capillis, ut redundantē pituitā, imbecillitas caloris immutatur, redundante sanguine, calor præteraturus est, &c.

Ratione quoq; ætatis fit mutatio coloris, uti & aliorum accidentium. In senioribus enim fiunt pili non tantum crassiores, duriores, valentiores, & nigrescentes; sed & tandem cani atque canescentes: quam

caniciem veteres putarunt fieri à siccatate, quemadmodum arborum folia siccatate albescunt.

Sed hos refutat Aristoteles. Nam *Canities* non fit à siccatate, sed à frigore, qui causa.

qui tecto capite incedunt, citius canescunt, nec tamen ita exsiccantur, qui nudum caput aeri exponunt. De quibus quidam ab ortu statim canescunt, non à siccitate.

*Cur citius
cāscāt, qui
capite tecto
incedunt.*

Canescunt autem citius, qui capite velato incedunt, quia calor nequit extari, sed obruitur & strangulatur, extincto externus inducitur: hinc credo canitie causa, ut fiat canities inopiam caloris nativi, quando non humores coquere potest, ut in iuvenibus. Et ultima atq; tenuissima pars pilorum ubi calor minimus, maximè albescit.

*Citius circa tempora
cur homines canescant.*

Cæterū cur ex putredine humor accendatur, causa est secundū Aristoteli, quia magna pars in aerem vertitur terrenæ & aqueæ substantiæ permixta, facit albedinem. Et hinc etiā liquefaciuntur homines citius circa tempora canescunt, quia nimirum ibi magni & carnolique locantur muscoli, qui ob humiditatem facilius putrescunt. Adde quod temporum ossa admodum sunt tenuia, ideo calor extraneus facile potest pervadere.

CAPVT II.

DE MEMBRANIS EXTRA & INTRA CRANIVM.

MEMBRANÆ EXTERNÆ *crani-*
ngentes duæ sunt: PERICRANIVM
 PERIOSTIVM. INTERNÆ, quæ
 eorum cingunt, itidem duæ sunt, Me-
 nes dictæ & matres: DVRA mater & *Meningia*
 MATER, id est, crassa membrana *cerebri*
 inuis, quæ idem præstant in sua ca-
 usus.
 e, quod plevra in mediâ & perito-
 in infima.

PERICRANIVM est membrana
 & mollis, cranium cingens, orta à
 matre, per cranii suturas exeunte.
 PERIOSTIVM est membrana te-
 na & nervea, ideoq; admodum
 ilis, cujus beneficio omnia ossa,
 us exceptis, cincta sensum ha-

Distingvimus has duas membranas
 Vesalio & Bauhino contra Fallo-
 Laurentium & alios, qui confun-

Musculi verò circa caput varii suo
 xplicabuntur.

ASSA MENINX seu membra-
 or, aliis DVRA MATER di-
 crassitiem & duriciem, & quod
 omnes totius corporis membra-
 nac atque tenui matre oriri exi-
 , cranium interius ubique suc-
 cingit

cingit, omnesq; ejus sinus & cavitates
atq; basi ejus adhæret validè, ut in
tum ducere alii putaverint.

Laxè autem & cerebrum cingit
calvariâ succingit; ut distantia
interfit, sicuti pericardii à corde,
pediatur

*Cerebrum
moveri.*

Cerebri motus, qui systole & diastole
constat; estq; continuus. uti videri
in capitis vulneribus; & nos non
hunc motum in vulneratis videmus
Mirum ergo quosdam, etiam doctos
ros, hunc motum negare velle.

Connectitur autem cum ten-
ninge & cerebro per vasa; cum
per fibras membranofas tenuès, ex-
tas, per suturas egredientes, & p-
nium constituentes.

Gemina est hæc Meninx instar
rum membranarum. Pars exter-
nium respiciens durior est, asperius
minoris sensus, ob cranium d-
quod tangere debuit.

Pars interior lubrica est,
splendida & candida, aqueo h-
magis perfusa.

Quadruplicatur, ubi cerebrum
rebello distingvit, quo loco can-
bent cerebrum suffulciens, ne ce-
lum prematur.

Duplicatur autem in capitis vertice, cerebrum dividit in partem dexteram & sinistram: & quia hæc reduplicata parte posteriore latior est, & fenestra arctatur, ut falcis messoriae repræsentare videatur, ideo illud corpus falcem vocant. Dum autem *Falx* multiplicatur, constituit.

Cavitates vel sinûs, seu receptacula sanguinis & spiritus copiosi, suntque sinus *superior*, quos Galenus aliquando crassæ membranæ ventriculos vocat: alii sinus *ductus*.

Primi duo incipiunt ad occipitis basem iuxta latera lambdoidis, ubi se exonerant venæ & arteriæ. Hi duo deinde

Tertium gignunt longissimum: nam capitis longitudinem pergit ad summa tempora. Galeno aliquando *vena dicitur* eo quod copiam sanguinis continet. Atque his sinibus dehiscentibus quando immensa copia sanguinis per eos fluit.

Quartus sinus, calvariæ non attingit, uti priores, brevis est, & inter cerebrum ac cerebellum intrò pergit, ad glandulam pinealem.

Oritur in concursu sinuum trium priorum.

Hæmorrhagie narium magne causæ quædam.

Forcular.

priorum, & hoc principium aliqui *for-
lar* vocant : unde venæ eunt pro na-
tione ad cerebri substantiam.

A sinubus oriuntur rami, seu *ve-
reptitiæ*, tam sursum euntes ad cranium
& per suturas ad pericranium, quàm
orsum ad piam matrem, cerebrum &
rebellum.

Itaque *usus sinuum* est continere
sanguinem utrumque à venis & arteriis
sibi continuis acceptum. Nam cum
sinubus, tanquam si venæ essent jungun-
tur ipsæ venæ, & venarum tenuis quædam
pellicula, cavitatum istarum parietibus
adhærescit, quæ cū venis continens
sit, virtutem ab epate possidere poterit.

Continetur autem sanguis in
cavitatibus admodum copiose, quia
cerebri substantiæ moles maxima est
non tantum venarum, verum etiam
arteriarum officium sustinent, cum
sint hæ cavitates.

Usus duræ matris est I. Cerebrum
gerere, medullam, & nervos inde ori-
dos.

II. Distingvere cerebrum in duas
partes, & idem à cerebello.

III. *Pericranium* constituere, dum
pro eo ligamenta per suturas mittit.

Tens

ENVIS MENINX vel PIA MA-
do, ob tenuitatem dicta, proximè &
mediate cerebrum ejusq; partes, ne-
mant, vestit: quare tenuis & mollis
debebat; estq; exquisiti sensus.

Ufus cerebrum, cerebellum, me-
m, & nervos vestire.

CAPVT III.

DE CEREBRO E-
IVSQUE MEDVLLA
IN GENERE.

a calviam substantia mollis & alba
consideranda triplex: CEREBRUM
pars anterior, CEREBELLUM vel
posterior, & intima pars, quæ cere-
um mergitur, MEDVLLA alba; quam
alii confundunt cum cerebro ipso
tè; nos veritatem sic explicamus.

Cerebri vulgò dicti pars alia est ex-
a, alia interna.

Externa propriè & strictè CEREB-
M dicitur, estq; totum illud quod
rius circumjectum molle apparet *Cerebrum*
ricii coloris vel ex albo flavescens, *propriè*
n, colorem, aliqui ex venis innu- *quid.*
is ibi disseminatis oriri credunt.
ac externa substantia est quasi cor-

Q 4

Interna

*Medulla
quid?*

Interna est reliquum intus reco-
tum, durius & compactius, magisq-
didum, quod *MEDULLAM* vocare
sumus, in qua sibi sunt ventriculi v-
dicti, non verò in ipso cerebro; ut i-
differant cerebrum & medulla

1. Situ. 2. Colore. 3. Consiste

Videtur ergò cerebri pars caro-
in cinericia esse demersa, quemad-
humor crySTALLINUS in vitreo. Et
duæ hæ substantiæ, candida & ciner-
in cadaveribus putridis maximè co-
nuata appareant; in recentibus ta-
sanorum repentè interfectorum, do-
minantur lineis quibusdam variis, i-
invicem separari actu optimè quear-
summa adsit dexteritas, & mox ab o-
fiat sectio, alioquin multa humiditas
perfunduntur & concidunt.

*Medulla
partes.*

Mediam hanc candidam subst-
am vel *medullam* dividimus in partem glo-
sam seu rotundam, & oblongatam.

*Medulla
caput quid?*

Globosa quam nos *caput medullæ*
cabimus, figuram Calvæ æmularur-
magna constat mole, habens in se
cavitates vel ventriculos vulgò
ctos.

*Medulla
cauda quid?*

Oblongata, quam nos caudam med-
vocabimus, immediatè ab hac glo-
orito

instar caudicis cuiusdam, cui in-
 tus est calamus scriptorius, vel *De loco ge-*
 quibusdam dictus ventriculus; *nerationis*
 nos statuimus veram esse anima- *animalis*
 ritus generationem. *spiritus, no-*

hæc medulla oblongata est omniū *va opinio.*
 quorum, quicunq; ibi sint, principium
 go; cerebrum verò ne unius qui- *Nervorum*
 nervi initium; contra quam com- *omnium*
 is fert opinio. *Principiū.*

est verò & hæc oblongata *medulla*
 acriter considerari: vel prout ad huc
 intra calvariam, & tùm ab ea nervi ori-
 tur, qui vulgò cerebro tribuuntur: vel
 extra cranium est, & in spinam dela-
 tur, diciturq; medulla *spinalis.*

verò discentes turbentur, totius
 bri vulgò ita dicti structuram jam
 ponemus.

Cerebri ergo humani *Magnitudo* infi-
 est in proportionem sui corporis, ut
 et Aristoteles. Et ut plurimum *Cerebrum*
 duplo plus cerebri habet quàm *maius qui-*
 nempe ad librarū quatuor vel quin- *bus datum*
 pondus. Et inter homines mares
 habent quàm fœminæ. Ijs enim
 imum est datum cerebrum, qui plu-
 um cerebro uti debuere, h. e. functi-
 s animales varias & præstantes exer-

Q

Figu-

Figura subrotunda est ad modum Calvæ; antèius verò *tubera* acquirerebri. cerebrum, quæ à nonnullis processibus mammillares dicuntur.

Superficies externa cerebri anfractuosa est, atque convolutiones, gyrosque varios instar intestinorum habet: quæ non ad intellectum factos dicendum cum Erasistrato, cum & asini habeantur nec ad levitatem, ut Aristoteles voluerit nec absque fine vel usu esse, ut alij putant; sed ut vasa cerebri per hos anfractus ducerentur tutius, ne ex motu aliquid duo, rptionis periculum esset, præsertim in plenilunio, quando in calidum cerebrum maximè turgescit.

Superficies interna habet varias tuberantias & cavitates, ut in sequentibus dicitur.

Color albus est, quia ex semine, omnes partes, generatum est cerebrum sed ita ut minus amplificationis habere sit quam constitutionis: unde in summis inedijs, nihil ex cerebro diminuitur.

Temperamentum est frigidum & humidum, quod apparet ex albedine mollicie. Vnde Hippocrati cerebrum

sedes frigidi & glutinosi. Ratioci-
moni enim & somno cerebri caliditas
inferior obest, ut in phreneticis appa-

SUBSTANTIA est peculiaris, *Cur modis*
nulla alia in toto corpore. Glan-*te mollis*
assimilavit Hippocrates, ob colo-*stantie*
& humoris copiam. *Mollis est sit cerebrum.*
humida ad faciliorem impressionem
siginum & conceptuum, est enim i-
minationis sedes: non tamen ita mol-
litur diffuat, sed molliciem habet
sistentem, ut, quod impressum est,
quandiu maneat: Nam cerebrum et-
memoriae sedes est.

Vasa per cerebrum disseminantur va-
Nam si ejus substantiam compri-
guttulae sanguineae copiosae exu-
ideò plurimas venas & arterias ca-
ibis ibi disseminari cum Galeno sta-
amus; quas etiam non rarò oculis u-
avimus.

ervi autem nulli per cerebrum disse-
nantur, ideò sensus expers est o-
s.

Vena quae per cerebri substanti-
feruntur, sunt i. Rami quinq; vena-
jugularium, quorum aliqui crassae
menyn-

*In cerebro
venas esse.*

meningis subeunt sinum, aliqui per ninges & cerebri substantiam sparguntur. 2. Ramuli exigui utrinq; abeunt substantiam cerebri, ex duræ matris vitaribus.

Arteriæ quatuor sunt ex Carotidibus & cervicalibus.

Vsus cerebri secundum Aristotelem ad cordis refrigerationem, quod refutavit Galenus, quia à corde cerebrum est remotius. Sed

Vsus est 1. Esse animæ sensitivæ domicilium, ad edendas functiones animæ. Est autem cerebrum non particulare sentiendi organum, ut oculi, aures, sed universale: nam de omnibus judicium fit in cerebro.

*De motu
cerebri.*

De motu etiam animali fert judicium, ipsum verò animali motu caret: naturalem agnoscit, eumq; perpetuum dilatationis & constrictionis, ut liquet in vulneribus, itē in recens natis, quod in fincipite cerebrum palpitare concipitur, quia ossa mollissima sunt, nec duntaxat satis indurata.

In dilatatione cerebrum vitalem spiritum attrahit, ex arterijs carotidibus sinibus, itemq; aërem per nares:

In contractione spiritum animalis

nervos propellit, qui in totum cor-
 pus, tanquam canales, hunc spiritum de-
 ferunt, unaque cum spiritu, facultatem
 sentiendi & movendi.

Spiritus ergo animalis materia est *Spiritus animalis materia.*
 colex: videlicet sanguis arteriosus: De loco ge-
 nerationis postea dicetur. Non enim
 in ijs sentimus, qui in cerebri substan-
 tiis aut ventriculis istis anterioribus ge-
 nerari volunt hunc spiritum.

2. Ut in cerebro contineatur & ser-
 vetur, tanquam in promptuario spiritus
 animalis, jam antea generatus & confe-
 ctus. Et conveniens certe spiritus ani-
 malis domicilium atque receptaculum, est
 cerebri substantia, cum eadem sit, quæ
 substantia nervorum medullaris interna,
 quæ spiritum illum animale etiam
 continet.

Putamus autem in cerebro propriè *De usu ce-*
 recto, vel cortice, servari spiritum ani- *rebus eius-*
 malem pro sensu, in medulla verò totà, *que medul-*
 lam quoad caput, quàm quoad caudam, *la non tan-*
 reservari spiritum pro motu, *toris opti-*
 quod sequenti capite mani- *mo.*
 festum eva-
 der.

CAPVT

CAPVT IV.

DE PARTIBVS CEREBRI

in specie, & i. de medulla oblongata & spinali, ejusq; ventriculo nobili.

Capitis sectione vera ab inferiore parte inchoanda.

EAquæ in cerebro conspiciuntur inquirunt secundo primum caput partem superiorem, & ad inferiora usque progrediendo, quare etiâ multas partes minus recte proponunt & explicant. Nos inuerso ordine attamen vero & accurato, incipiemus à parte inferiore cerebri, & ad summam usque transibimus daturi postea ordinem partium à summis ad infimas, pro ijs, qui vulgatum atque communem secandi ordinem sequi volunt.

Obiectio.

Ordiendo ergo ab infima parte cerebri, occurrit primò *Medullæ oblongatæ principium*; hujus progressus quia in vertebrae spinæ est, *spinalis* dicitur, item dorsalis *medulla*.

Quod si quis à cerebro putaret initium faciendum, quia ab eo, ceu principio, oriri dicitur *medulla spinalis*;

obgerimus, nos statuere medullam,
 ut & intra cranium est, & pro ut *Responsio.*
 nalis est, principium potius cerebri
 tendum, cerebrum verò ipsum in du-
 partes divisum, esse quali *ἀπὸ τοῦ* *Medullam*
 andam, vel processum duplicem ipsi-
 medullæ. *esse princi-*

Et id quidem manifestius fit inspi-
 rentibus Anatomiam piscium; ibi c- *rebri, nova*
 in medullæ caput & cauda insignis est *Autoris o-*
 gnitudinis, processus verò medullæ *pinio.*
 cerebrum admodum exiguum; cu- *Probatio.*
 rei causa est, quod pisces motu ma-
 quam sensu utuntur ac si ad sensum
 conferat cerebrum vel cortex, ad
 tum plus medulla ipsa. Hinc pisces,
 ad sensus, stupidi satis sunt, in mo-
 verò satis agiles. Atque ex hac no-
 sententia verum erit, durius ad
 tum, mollius ad sensum corpus ifa-

MEDULLA OBLONGATA

secundum alios à solo cereb-
 secundum alios à cerebello. Sed
 umque principium (ut ita jam com-
 ni modo loquamur) obtinet.

Ori-

Oritur enim quatuor radicibus seu
damentis: duo majora sunt, ab ante
cerebri vulgò dicti parte. Duo min
cerebelli parte interiore. Ex unitis
videtur constitui spinalis medulla.
rectius fortè putatur, origines istas
processus ipsius medullæ, ut ant
Etum.

*Divisio
medullæ.*

SUBSTANTIA medullæ oblonga
paulò durior est quàm cerebri.

Pars ejus alia intra cranium est
quatuor digitos transversos, supra
gnum occipitis foramen. Alia ejus
& quidem longissima, extra cranium
in vertebris à prima cervicis, usq;
timam ossis sacri.

Figura est oblonga & rotunda.
ptura vocat funem argenteum. In
cipio verò crassior est & amplior.

*Alia divi-
sio.*

Dividitur ulterius in partem dextram
& sinistram, uti & cerebrum, à pia
tre, quæ eam immediate vestit, quod
paret in bovis medulla leviter co
Hinc paralyfis unius vel alterius la
esse potest.

*Alia divi-
sio.*

Dividitur autem in multos quas
niculos, circa sextam & septimam
racis vertebram: & si recentis cad
ris medulla spinalis statim frigida
me

atur, & fiat horum funiculorum se-
 gno, figura repræsentabitur caudæ
 præsertim circa finem, in mul-
 tilos oblongos divisæ: ita ut secun-
 dum Laurentium etiam dorsales & lūm-
 bales nervi, à cervicali medulla orian-

membrana integitur triplici. Prima Tegumen-
 ti medullæ, cingens est à pia matre.
 Secunda est à dura matre & alteri ad-
 la.

etria exterior oritur secundum Ga-
 lenum a valido ligamento anteriores
 vertebrae colligante, quod parte
 anteriore in validam tunicam desinat.
 In spinæ flexione vel extensione la-
 ter medulla.

Huic circumfunditur crassus
 viscosus humor, ad humectatio-
 nem. Postea includitur medulla in ver-
 tebrae, ne lædatur (ut cerebrum Calva in-
 cluditur) cum sit pars nobilis, & nervo-
 rum principium. Ideo spinæ partem per-
 foratam *ἱεράν στήν*, sacram fistulam
 vocant veteres.

In principio hujus medullæ, dum *Ventricu-
 lus nobilis*
 hic in calvaria est, insculptus vi-
 lus nobilis
 in medulla

R

Sinus

SINVS vel CAVITAS, quæ Galenus cerebelli ventriculū vocat, alij quæ
tūm cerebri ventriculum, cum tamen
cerebro non sit. Nos ventriculum me-
læ nobilem vocabimus.

Hic solidissimus est, purissimus, su-
lissimus, sed minimus, nam rem majus
virium & facultatis continet, ut ait
lenus.

Et quia post ductum quendam æ-
leim utrinq; ad latus dilatatur, deinde
eo in mucronem exacuatur, ob hanc
ram calamus scriptorius à nonnullis dici
est.

Ventriculi
nobilis o-
perculum
ex cere-
bello.

A cerebello autem quæ huic me-
læ committitur, constituitur alia, &
media pars hujus ventriculi quasi op-
culū, ita ut sita sit tota hæc cavitas in
cerebellum & medullam oblongata
potior verò cavitas est inferior, quæ
medulla.

Verus locus
generatio-
nis anima-
lium spiri-
tuum se-
cundum
Autorem.
Probatio.

Vsus hujus ventriculi à nobis statu-
tur, ut sit locus generationis, & elabo-
rationis animalium spirituum. Hic eni-
ventriculus est purissimus & subtili-
mus, cavitatemq; ad id sufficientem
tinet. In eo deniq; loco est situs, ut
diq; circa se in omnes nervos spirituum
animalem effundere possit. Recte eni-
Her

Scophilus hunc ventriculum principa-
tum existimavit.

Alij generari putant spiritum anima-
m in ventriculis cerebri antero-

*Aliorum
opinionēs
de loco, &
refutatio-
nes.*

Atqui hi excrementis scatent, quo-
potius sunt receptacula, ut apparet
objecta ijs glandula pituitaria, & quod
pituita repleti reperiuntur.

Alij in reti mirabili, alij in plexu co-

Sed in his præparationem nos fieri
nimis. Solet enim natura materia
jus præparationi plexus tribuere: *Præparatio
animalis
spiritus ubi*
am hæc vasa adeo exigua sint, quo-
o in ijs generabitur, præsertim
per ventriculos defluant tot cere-
xcrementa?

Alij volunt in cerebri substantia e-
rari. Sed tam subtilis spiritus gene-
cavitatem requirebat aliquam,
vitalium generationi concessa est.
Alii adducti fuere spiritus natu-
generationem in dextro cordis
triculo statuere, quia in epate nulla
vitas.

R. 2

Nostra

*Animalis
Spiritus
præparatio
generatio,
& conser-
vatio iuxta Auto-
rem.
Omnium
Nervorum
principiū
est hæc me-
dulla.*

Nostra ergò sententia est, spiritum animale præparari in reti mirabilis magis adhuc in plexu retiformi; generari & elaborari in hac medullæ oblongatæ cavitare, sive vetriculo nobili; per verò conservari & retineri in toto cerebro tanquam promptuario.

Ufus medullæ oblongatæ & spinalis est, ut ab ea omnes nervi prodirent. Ab ejus enim parte, quæ intra cranium est, oriuntur nervi, qui vulgò cerebrum tribuuntur, & communiter eorum præterea paria recensentur. A parte verò longissima, quæ in spina est, oriuntur merantur ab Anatomicis triginta nervorum, quot videlicet sunt vertebrarum foramina.

Interim non ita intelligendum, si tot duntaxat rami seu funiculi irrigerentur. Nam quilibet nervus præterea funiculis vel quasi fibris oriuntur quæ egredientes per foramen aliæ vertebræ, ibidem per membranas præteruntur, ac si ex una propagine fieret nervus egrederetur.

CAPUT V.

DE CEREBELLO.

CH.

CEREBELLUM quasi parvum *Cerebellū*
 avatum quoddam cerebrum, est mi-
 quid.
 quādam portio, sub cerebro posi-
 parte inferiore & posteriore occi-
 In brutis, totam ferè occipitis re-
 tem occupat.

Eandem cum cerebro habet sub-
 um, *consistentiam, colorem, gyros, mo-*

constituitur præcipuè ex duabus par-
 lateralibus, utrinq; quasi globum
 titibus.

Processus duos habet, vel excrescen-
vermiformes dictas, quia multiplici-
 biculatae sunt, & ex multis porti-
 is transversis, tenui membrana
 atis constant. Harum extremitas
 & convexa ciceris magnitudinem

Sita verò sunt ad sedem cavitatis
 is, una quidem ad anteriorem, al-
 id posteriorem.

atum *usus* est, ne ventriculus nobi-
 erebello pressus obstruatur.

Nervi cerebelli idem qui cerebri. *Galen. Galeni er-*
 verò, ut inde oriantur duriores *rer.*

Nervi: quod falsum: Nam nul-

li nervi ab eo pro-
 deunt.

R. 3

CAPVT

DE RELIQVIS, QV
IN CEREBRO OBSE
vantur partibus; Reti mirabili, Glandula pituitaria, infundibulo, ventriculo cerebri, corpore colloso, fornice, plaxu choroide, glandula pineali &c.

PRæcedentibus consideratis, accedendum ad ea quæ statim circa vorum opticorum conjunctione conspiciuntur, ut sunt: Rete mirabile, glandula pituitaria, & infundibulum.

RETE MIRABILE, alijs plexuiformis, ita dicitur ob artificiosam & mirabilem structuram, apparet enim in multorum retium invicem cumulorum. Aliam verò structuram habet vitulis & bobus, ubi etiam manifeste conspicitur quam in homine; in quo men dari non negandum est, ut facit salius.

Subiicitur hoc rete cerebri basi, glandulam in ambitu complectitur, à latibus sellæ ossis sphæroidis.

Constat ex arterijs carotidibus corde sursum latis ad basin cerebri quæ sanguinem & spiritum vitalem hoc rete deferunt. Nam

Vesalius
error.

Silius.

retū est, ut in eo diutissimē more-
 anguis & spiritus vitalis, ut fiat pri-
 paratio pro generatione anima-
 ritus.

GLANDULA PITUITARIA
 sinus dicta, quod excrementa cere-
 ventriculis per infundibulum su-
 (ideo ad finem infundibuli ponitur
 sphaenoidis) Galeno simpliciter
 glandula.

Superne concava est, *inferne* gibbo.

Situs?

Figura

Substantia ejus durior est & compa-
 quam aliarum glandularum.

Utur pia matre.

Vsus est idem qui aliarum glandula-
 carne bibula instar spongiae excipe-
 excrementa crassa (nam tenuia per
 as evaporant) collecta in cerebri
 viculis, saepe satis copiosa. Nam ce-
 ni mole magnum multo indiguit
 cito, ideo & multa excrementa gene-
 rasertim à naturali constitutione

Excrementa
ra cerebri
copiosa
sunt.

nihil recedens. Hæc excrementa
 gula modò in palatum deijcit, mo-
 fluere finit, per basis cranij fora-

Alijs usus etiam glandulae hujus
 audere infundibulum, ne spiritus
 anima-

animales egrediantur. Nam statim pra grandulam pituitariam est.

INFUNDIBULUM dictum à figura nam supernè caput ejus amplum est, inferior pars est longus canalis. & angustior. Alij *pelvim* vocant, quæ vox recedens de capite infundibuli seu principio dicitur.

Est ergo *infundibulum* cavitas orbicularis, facta ex pia matre, ubi cerebri sinus succingit. Ejus initium amplum ad foramen tertij, uti vocant, ventriculi per quod ex ventriculis excrementa per hoc infundibulum ablegantur.

Hiscæ absolutis occurrit in sectione nervorum origo, ubiq; à medulla, quæ in libello de nervis.

Ventriculi
cerebri
quot.

VENTRICULI cerebri seu CAVITATES sequuntur.

Hi, si sectio communis fiat à superioribus incipiendo, putantur esse: duo anteriores & superiores, vocant, *unusque medius*, cui alij addunt *quartum*, de quo nos supra.

Si vero sectio nova fiat, ab inferiori ordiendo, duo tantum apparent, ut testis communis fiat portio reliquorum duorum.

Nos putamus *unicum esse cerebri ven-*
triculum, qui in medio est, sed biparti- *Vnicum esse*
 est ejus initium, vel gemini proces- *cerebri ven-*
 qui excrementa recipientes defe- *triculum*
 in ipsum medium quem tertium *Autoris*
 unt. Cavitas enim una & continua *sententia.*
 cerebri, & duo dicti ventriculi in
 communem cavitatem desinunt.

Interim, quia pars cavitatis alia atq;
 diversimodè formata videtur, di-
 ctio aliqua doctrinæ ergo admitti
 est.

Duo illi ventriculi, qui malè *anteriores* *Ventriculo-*
 superiores dicuntur, amplissimi sunt, *rum antea-*
 qui, anfractuosi, semicirculares, piâ *riorum de-*
 re vestiti. *scriptio.*

Formantur non in cerebro, sed me-
 â, quo loco vocant *corpus callosum*, *Corpus cal-*
 substantia ibi est durior, instar calli, *losum.*
 duabus extuberantiis anterioribus
 umbere videntur ventriculi.

Distinguuntur septo laxo & rugo- *Speculum*
 quod si extendatur, lucidum fit, ob *lucidum.*
 mitatem: quod alii volunt esse ex te-
 timâ ipsius cerebri portiunculâ, alii
 tenui meninge duplicatâ.

Pars inferior albicans, ubi junguntur
 ventriculi, dicitur

FORNIX seu *testudo*, figurâ trian-
 & s guli

guli. In communi sectione Tertio ventriculo superstratum putatur hoc corpus, & corpori calloso subjectum.

Tertius vulgò dictus ventriculus, rima longa est priorum concursus, in centro quasi medullæ cerebri foratur ob conjunctionem duorum truncorum rotundorum, à cerebro prodeitum: meatus in se geminos habet, primum anteriorem deorsum ad glandam pituitariam abeuntem, ut eo excrementa excludat: alterum posteriore membrana vestitum; quod foramen quidam *anum* vocant, sub natibus ad ventriculum nobilem, ut præparata materia spirituum animalium in locum generationis, & quasi uterum intrare queat.

Anus quid. Est hoc foramen nihil aliud quam spatium ex contactu truncorum quatuor spinalis medullæ.

Nates & testes. *Nates* verò & *testes* sunt quatuor orbiculares prominentiæ, quas in cerebello esse dicunt, quod falsum: portiones duarum radicum medullæ oblongatæ à cerebro ortarum vocant nates; duas verò ex quibus radicum ex cerebro, vocant testes. Et hæ partes sunt inferiores; istæ superiores.

de ejusmodi nomina imponere par-
 etur momenti, uti & quando glan-
 pinealem *penem* vocant, & fove- *Penis.*
 quam inter eminentias oblongam

Valva.

ter ventriculos priores dictos ad
 dinis sedem, PLEXUS quidam re-
 choroidis, vel RETICULARIS Plexus cho-
 s, ex venis & arteriis tenuissimis *roidis quid.*
 extus missis parim ab arteriis, par-
 x vasis sinus quarti duræ matris. In-
 xitur huic plexui glandulosa sub-
 ia, & piæ matris portio

us est idem qui retis mirabilis.

od ortū foraminis quod a medio ven-
 do in nobilem intrat, quædā GLAN-
 A est apposita, PINEALIS dicta, *Glandula*
 tura nuclei pini: alii *penem* cerebri *pinealis.*

nt, estq; substantiæ durioris; coloris
 ntei, & membrana tenui obducitur.
 us est instar aliarum glandularum;
 fertim præesse distributioni vaso-
 per cerebrum disseminatorum.

us cavitatum vel ventriculorum cere- *Ventriculos*
 esse excrementorum conceptacu- *in cerebro*
 quod apparet. *excremen-*

Ex structurâ: Nam foramen ab ita recipere
 aribus ad glandulam pituitariam. *probat.*

Superficies ventriculorum semper
 humore oblinitur.

3. Sæpè toti repleti pituitâ reperiuntur.

Ordo partium monstrandarum in sectione nova.

Cæterum in sectione hac novâ, quam monstratum est infundibulum cum glandulâ: medullâ sublevit primùm conspiciuntur nates & testes; deinde foramen in ventricululum; postea nervi varii, cerebri ventriculi cum foramine in infundibulum corpus callosum, fornix, plexus carotidis, & glandula pinealis.

Ordo partium in sectione antiqua.

In sectione verò antiquâ & communia, hæc monstrantur ordine partes cerebri: Corpus callosum, septum tentorium, extuberantiæ duæ, quibus ventriculi incumbunt; Ventriculi duo anteriores vulgò dicti; fornix, plexus, choroidæ ventriculus tertius, ejus duo foramina, glandula pinealis; remoto nonnihil rebello nates & testes, cerebellum, processus vermiformes, ventriculus posterior, pelvis, glandula pituitaria, rete mirabile.

CAPVT VII.

DE FRONTE.

Cur facies humana depilis.

P Ars capillata explicata est, sequitur facies glabra vel **FACIES**, quæ in hominibus pilis caret, secus quàm in brutis, ad vultum nullum.

ritatem; dicitur & *vultus*, ob voluntati-
ndicium in facie conspicuum.

Ejus pars superior *FRONS* dicitur, *Frons unde dicta*
busdam à ferendo, quia præ se fert
mi signa: reliquum a superciliis ad
nti extremitatem pars inferior est, in
aliæ multæ partes.

Frontis cutis, quia movetur, ideo mu-
los habet, quos Platerus affectuum
mi significativos vocat, Frontis au-
musculi supercilia elevant, & ad su-
cilia crassiores sunt.

Ad latera musculis temporalibus an-
untur, in medio verò supernè nonni-
distingvuntur, sed infernè ita confo-
ntur, ut unus esse videatur musculus.

Fibras habent rectas. Non ergo à
rurgis transversim incidendi sunt,
ereat superciliorum elevatio.

Quia verò frontis cutis arctè his mu-
is connascitur, ideo & frons & su-
cilia moventur.

Aliquando verò in occipite etiam
ad sunt musculi, cutim capitis mo-
ates, breves, tenues & lati, fibris re-
sursum in tendinem latum desinen-
res: hisce donati aliqui homines.

cutim capitis posteriora ver-
sus trahere possunt.

CA

LIBER III.
CAPVT VII.
DE OCVLIS.

Oculi ab oculendo vel occultando dicti, eò quòd sub palpebris occultentur, sunt instrumenta visus conflata e humoribus, membranis, musculis, vasis aliisq; partibus.

Siti sunt in loco eminenti, ceu speculatores in antris osseis periostio fuscinctis, munimenti tutioris ergo.

Numero duo, qui in homine minimo intervallo dissident, & ob actionis nobilitatem atq; perfectionem. (undo

Rotundi; sed aliquantulum oblongi

Anguli duo constituuntur, ad orbem tam oculorum, qui *canthi* dicuntur; in *ternus* major ad nasum, & *externus* minor ad tempora.

Partes, in oculo & circa oculum variae sunt; aliae extra oculum, munimenti causa vel commoditatis, ut *palpebrae* cun *ciliis* & *superciliis*, item *carunculae* in angulis; aliae sunt partes ipsum oculum constituentes, suntq; *adeps*, *musculi*, *vasa*, *membranae*, & *humores*.

Palpebrae sunt partes oculum regentes & claudentes.

Constunt ex cute, membrana carnosae musculis, tunica, tarsis & ciliis: Ideo mollis est earum **SUBSTANTIA.**

Palpebrae

Palpebra alia est inferior, quæ ex se immobilis est; alia superior, quæ movetur, & quidem celerrimè, unde motum celerrimè comparamus cum ictu oculi.

Moventur autem sursum, id est, aperiuntur & attolluntur, per *rectum musculum*, qui altero minor est. Moventur deorsum, id est, clauduntur, teguntur, per *musculum orbicularem* quendam vel *semicircularem* à nasi radice ortum. Musculi palpebrarum

Membrana carnosâ hoc loco est tenuior, unâ cum musculis, instar alterius membranae simplicis tenuis: quamobrè Philosophus palpebræ cutim absq; carne esse pronunciavit, & discissa ut præputium non coalescit.

Tunicâ interiori vestiuntur à pericranio enata tenuissimâ & mollissimâ, ne lædantur oculi, quos tangunt.

Extrema palpebrarum duriora sunt & cartilaginosa; sed molles istas cartilagineas parvas, semicirculares Græci *τρίγωνα* vocant, Latini *CILIA*, quibus pili inguntur, (quos alii *cilia* vocant,) recti, quia in duro siti, visui dirigendo inservientes.

Supercilia verò dicuntur pili in frontis fine supra oculos, excipiētes, quæ i capite defluūt, ne in oculos delabātur. Vfus superciliorum.

CARUNCULA apponitur cuilibet campo majori, humiditatem continens pro oculo humectādo; & foramina

*Punctum
lacrymale.*

nasi ossi insculpto, quod *punctum lacrymale* male vocatur. obducitur, ne perpetuo lacrymas emittamus. In bove verò membrana adhuc motum agnoscens adest, quæ claudere oculum potest, etiam papæbra aperta, cupus beneficio bruta nictant, quando metuunt, ne quid incideret.

*Vsus adipis
in oculo.*

In spaciis musculorum & variorum vasorum reperitur *adeps*, faciens ad oculi calefactionem, humectationem & faciliorem motum.

*Error Columbi de
tunica oculi.*

Musculi oculorum humanorum sunt, quia tot motus: quatuor recti & duo circulares: *Siti* omnes intra calvariae cavitatem, & nervum opticum committantes. Horum tendines omnes simili ad corneam juncti constituunt *tunicam*.

Columbo innominatam vocatam, licet tunica non sit, nec oculum totum cingat.

Primus musculus superior & crassissimus dicitur *attollens* & *superbus*.

Secundus ei oppositus in parte inferiori minor, dicitur *deprimens* & *humilis*, quia oculum deorsum malas vertit & trahit.

Tertius in majori angulo positus *adducens* vocatur & *bibitorius*, introrsum movens, versus oculum movens.

Quartus abducens in latus ad parvum angulum, *indignatorius* dicitur.

AA

Ab his quatuor simul agentibus oculus intrò trahitur, & motus sistitur, qui motus Medicis *tonicus* dicitur.

Quintus gracilis, teres, brevis, *obliquus*, obliquè deorsum in gyrum movet ad angulum externum.

Sextus habens tendinem longissimum, oculum *circumagit* ad angulum internum. Dicitur *trochleæ musculus*, quia quasi per trochleam circumrotatur.

Hi duo posteriores dicuntur *amatores* & *circumactores*, *supernus* & *inferius*.

Septimus musculus adhuc in brutis adest, qui in duos, tres, vel quatuor dividendi potest.

Hic intercedente adipe nervum opticum ambiens brevis est, & carneus in tunicam duram inferitur.

Uusus est; brutorum, quæ prona terram spectant, oculos sustinere, nervumque opticum mollem involvere:

Addi potest *octavus* membranofus, quo nectitant bruta.

Vasa ad oculum mittuntur, *vena* à jugularibus, *arteria* à carotidibus per musculos adipem & membranam disseminatæ.

Nervorum verò duo paria priora
S ur

ut communiter recensent: *primum opticum* vel visorium crassum & porosum cerebro facultatem videndi cum spiritu deferens inseritur parte posticâ in centrum corneæ; in brutis obliquè & non in centrum, sed ad latus: *Secundum motorium*, quod in membranas abit, & in quemlibet musculum ramulum mittit

Membranas oculorum tres esse.

Membrane præter externam & conjunctivam (quæ communis) non ni tres sunt & tres humores. Et quemadmodum in nervo triplex est substantia oculum ingrediens: ita tres hæ substantiæ tres oculi tunicas constituunt. Prima enim tunica oritur à durâ matre, Secunda à pia, Tertia à medullari substantia.

Ufus tunicae adnatæ.

Adnata alba, seu *coniunctiva* est lævis & tenuis, à pericranio orta, estq; omnium extrema, ossi proxima. Hippocrates album oculi vocat.

Conjungit oculum orbitæ & interioribus ossibus instar ligamenti.

Exquisiti sensus est:

Venulis ac arteriolis plurimis còspersa est, non apparentibus nisi in affluxu humorum, quando turgent & admodum

dub

dum rubent, ut in ophtalmia, quæ hic
sedem habet.

Sedes ophtalmie.

Remota hac adnatâ primùm se offert *scirotica* vel *dura* dicta, quæ à durâ matre oritur, estque crassa & posterius opaca. Hujus partem anteriorem vocant tunicam *Corneam*, quia est sicut cornu politum & pellucidum: potest enim in plures partes distrahi: *Scirotica* proxima est.

1. Tunica oculi.

Cornea.

Xogoeidēs, quia est instar chorij, & per eam vasa sparguntur; oritur a piâ matre. Hæc in anteriore parte dicitur *Uvea* ob colorem *Uvæ*, & *anterior* hæc pars est perforata in medio, ubi

2. Tunica oculi.

Uvea.

Pupilla efformatur in homine rotunda: in quibusdam brutis oblonga: quia verò *Uvea* tunica varios colores habet, hinc oritur

Pupilla.

Iris vel circulus qui variis conspici-
tur coloribus præditus; & ubi Iridem constituit, nunc cærulea est, nunc cæsia, nunc nigra &c.

Iris.

Ex circumferentia *uveæ* oritur ligamentum vel *interstitium ciliare* dictum, quæ sunt tenuia quædam filamenta referentia lineas nigras
S 2 palpe-

Ligamentū Ciliare.

palpebrarum pilis similes, & crystallinum humorem cingunt, qui horum operi nequitur vicinis partibus.

Tertiatica oculi.

Tertia est, retina, ex cerebri vel nervi interiori substantia quasi expansa: ideo colligi simul potest hæc materia mollis & quasi mucus, humorem vitreum reticul instar ambiens: Hæc postea ulterius abiens fit *aranea* vel *Crysalloides*, humoris crystallini propria tunica tenuissima & pellucida, unde *speculum* dicitur.

Aranea.

Addunt tunicam *vitream*, quæ vitreum humorem vestit, & à crystallino separam.

Humores oculorum tres sunt: aqueus, vitreus & crystallinus: quorum hic nobilissimus est, & anima atque *centrum oculi* quibusdam dicitur.

Suffusionis sedes.

Aqueus quia tenuis est & fluxilis instar aquæ, totus spacium occupat inter tunicam corneam & crystallini sedem anteriorem, in quo fiunt suffusiones.

Aqueus humor non est pars animata.

Hic humor non est pars animata, sed tantum excrementum esse videtur ex nutritione crystallini: nam & in morbis absimitur, & in vulneribus oculorum deperditus restituitur: reliqui duo humores partes sunt animatæ, cum habeant propriam circumscriptionem, nutriti iantur

triantur sanguine per venulas proprias adducto, deperditæ non refarciantur, & Reliqui in utero nascantur: & crystallinus qui sunt. dem ex purissimâ & lucidissimâ seminis parte.

Ufus aquei est tueri partes vicinas ab humoris exsiccatione: addunt alii tanquam medium infringere splendorem confertim irruentem. *Materia crystallini.*

Vitreus posterius conspicitur, vitro fuso similis, aqueo minus fluidus, in cuius medio Crystallinus ponitur, tanquam in pulvinari.

Ufus non simpliciter cedere in alimentum crystallino, sed ei alimentum præparare & communicare.

Crystallinus à colore dictus clarissimo, quem habet absq; omni alieno colore, ut omnes colores recipiat, splendidus est, mediocriter durus, ut imagines in eo hæreant, parte posticâ rotundus, anticâ depressus.

Ufus est esse primariū visionis instrumentum. In hoc enim humore fit visio.

CAPVT IX.

DE AVRIBVS.

Auditus organa, nempe AVRES, vel sunt externæ, vel internæ.

S 3

Exter-

Externa ab aliis *AVRICULÆ* dicta
in homine *figura sunt* semicirculari, ex
trinsecus convexæ, intrinsecus cavæ.

Dividitur auris externa in partem su-
periolem & inferiorem,

Superior latior est, & quibusdam pin-
na dicitur, aliis *ala*.
Inferior mollis est & propendens, di-
cta *fibra*, *auricula infima*, *lobus*.

Appellatio-
nes partium
auris ex-
ternæ.

Ambitus auris exterior dicitur *helix*
item *capreolus*, ob tortuositatem. Inte-
rior priori oppositus, *scapha*. In huius
medio cavitas magna est & auris externa
præcipua pars, *concha* appellata. Cavitas
verò juxta meatum auditorium, ubi
sordes flavæ & amaræ gignuntur
alvearium nuncupatur. Tempora versu
adnata est eminentia instar tegminis
& *hircus* dicitur, quia hac in parte pil-
i crescunt.

Partes ex quibus conflatur auris ex-
terna sunt vel communes ut cuticula, cup-
tis, membrana nervea, caro, pinguedo
nonnulla in lobo: vel propriæ, ut muscu-
li, vasa, cartilago.

Cutis tenuissima est, adhærens paucis
cæ carni cum firma cartilagine; eiquipis
ut in volâ manus, membrana nervea
validè connectitur. In lobo ita

comos

commiscetur cum carne, ut subpinguis, carnosa & fungosa existat. Hinc mollis est atq; flexilis lobus, ut sine magna molestia perforari possit: unde etiam à quibusdam ornamentis appensis decoratur.

Vasa. Venas habent à jugularibus.

Arterias à Carotidibus.

Nervos parvulos; duos à posterioribus, & totidem à lateribus, à secundo pari cervicali.

Musculi in ijs hominibus, quibus aures moventur rectè conspicui sunt communes vel proprij. In plurimis verò non moventur aures, tum ob muscolum parvitatem, tum quia non adeò opus erat, quia homo manibus efficere potest, quod bruta aurium motu, quo muscas abigunt.

Primus musculus communis est auri & utrique labro, estq; pars musculi primi moventis genas, & faciei cutim, diciturque *quadratus*. Auris radici sub lobo implantatur, ut deorsum in latus trahat.

Secundus proprius est & anterior, musculo temporali incumbens, à fine musculi frontis ortus, tendinosus in auri superiorem partem inseritur, ut sursum & antrorsum aurem moveat.

S

4

Ter-

*Uſus tertij
musculi.*

Tertius posterior ſupra mammillari
rem proceſſum oritur ab occipite, primo
cipio anguſto, deinde latior redditus, &
velut in tres partes diſiſus, aurem po-
ſterius adit, ut eam trahat ad poſteriora
& nonnihil altiora.

Quartus à mammillari proceſſu or-
tus latus, paulatim anguſtatur, donec in
tendinem abeat. Hic muſculus potius
Triplex eſt, quia tribus inſertionibus do-
natur, omnes tamen ex uno loco conſuſi
prodeunt. Ex his aliquando aliqui de-
ſunt, aliquando etiam reperiuntur.

Cartilago Auris eſt ſubſtantia, quæ
oſſi petroſo alligatur per ligamentum
validum à pericranio natum.

Parotides. *Glandulæ* exteriùs nonnullæ ſunt cir-
ca aures, craſſæ & inſignes, quæ *Paroti-*
des dicuntur, licet hæc vox etiam de tu-
more earum intelligatur.

Situs Paro-
tidum. Suntq; non tantùm ponè aures, ut
vulgus putat, ſed ad utrumq; latus, &
ſub aure; ſed non ſupra.

Glandulæ hæ juxta aures *cerebri e-*
munctoria dicuntur, quia cerebri excre-
menta ſuſcipiunt.

Sunt & aliæ glandulæ multæ in toto
ſpacio, quod eſt ſub maxilla inferiore, in
quibus varij affectus, ut *ſcrophulæ* gignun-
tur.

tur. In animalibus nonnullis, ut porcis *Scrophula-*
sylvestribus, vulgus in delicijs habet, *vo-rum sedes.*
 catq; lacticia & animellas.

*U*sus est partes humectare, & vasorum
 divisionibus præesse.

*U*sus *auris externa* est.

I. Ad ornatum.

II. Ad tutelam cerebri, ne lædatur
 ab aere subito irruente.

III. Esse organum auditus, sed non
 principale, verum adjuvans. Intus later
 verum organum, uti & olfactus. Et
 quemadmodum naso præciso olfacere
 tamen possumus, licet imperfectè: sic *Organum*
 etiam auribus penitus ad radicem exci- *auditus ex-*
 sis audire, sed obtusè, confusè, & cum *ternum.*
 murmure, vocesq; articulas instar flu-
 entis aquæ aut cicadæ resonantis, ut no-
 tum est ijs, quibus aures excissæ. Immo
 alterius auris non abscissæ actio audito-
 ria læditur, nisi foramen abscissæ obtu-
 retur.

*U*sus ergo *auris externa* est promti-
 us & rectius sonos recipere, & per aerem
 vagantes tanquam in sinu colligere, ut
 citra violentum impetum ad tympanum
 pertingant, prius in anfractibus viæ obli-
 quitate moderati. Hinc, ne appulsi soni
 præterlabantur, bruta aures circuma-

S s

gunt

gunt ad sonos & voces. Hinc Hadrianus Imperator, quò acutiùs audiret, manus cavas auribus obtendebat, quod & surdaſtri faciunt. Hinc Scythæ aliqui quibus propter frigus aures commoruntur, cochleæ reſtam auribus admovent, ut in concavitate facilè conſuſus aër ſuſcipiatur, & ita meliùs audiant. Hinc exactius audiunt, quibus aures ceteriùs prominent, & ſi non nimium tamen ex longo decubitu, quàm nutricum lactantibus aures depreſſas haberemus, rectiùs audiremus.

AURIS INTERNA varias quoq; habet partes in oſſe petroſo contentas, præter oſſis partes atq; cavernulas, aſunt: tympanum, duo muſculi, vaſa & aër cõgenitus.

In meatu auditorio cute inveſtitum per quẽ ſoni feruntur, reperitur humor liſus & viſcidus à cerebro expurgatus: inſtrinſecus verò huic foramini apponitur

Tympanũ. Septum quoddam vel membrana orbi-
cularis, alijs Myrinx, alijs ſeptum membran-
eum, & mediaſtinum. Alij tympanum vocant, ſed nonnullis rectiùs *tympani membranula*: nam cavitati internæ aëris cõgenitum continēti obtenditur, quæ admodum membrana in tympano.

Sicor

Siccissima est, ut melius perfonet, nam sicca ad sonum aptiora sunt.

Pellucida, tenuis & subtilis, ut soni facilius transmittantur ad aerem congenitum : Nam quibus ab ortu crassior est, *Surditatis, quaedam causa.* Surditate laborant incurabili, uti & ij, quibus exterius adnascitur tunica crassior, cujus tamen curationem aliquam docet Paulus, & si a nativitate; muti simul ut plurimum manent, quia voces inauditas nec animo concipere, nec linguâ proferre possunt. Si verò interiùs mucus apponitur, vel humor affluat crassior, *Gravis auditus causa.* gravis & difficilis oritur auditus, aut surditas curatu difficilis. Si tenuis affluat humor, oriuntur aurium tinnitus & *sa quaedam* murmura.

Est tandem *robusta & nervosa*, ut duret adversus injurias externas, ad cujus etiâ tutelam intus addita sunt tria ossicula, & duo muscoli.

Vsus est meatum auditorium claudere, & aërem congenitum ab externo separando, intus cohibere. Deinde interiora tueri à pulvere, aqua, animalculis &c.

Intra membranam tympani *cavitas interna* est in osse, continens aërem quem

quendam, quem alij insitum vocant, *congenitum*, & complantatum, quia in primo ortu auribus inditus est, purus subtilis & immobilis: qui alijs *auditus* internum medium est, alijs ipsum *organum* auditus.

Musculos duos auris internæ statunt Anatomici.

Primum internum vocant, in osse petroso situm, duplicis tendinis: Unus infigitur mallei processui elatiori, alter ad ius cervici.

Ufus trahere mallei caput obliquum antrorsum, & ad interiora, ab incude deducere, recurvatoq; malleoli processu membranulam ad exteriora pellerè.

Secundus externus, à Casserio inventus, licet & Aquapendens ejus inventum nem sibi tribuat, minimus est, carneus & in superiori meatus auditorij regione consistens, tendine in membranulæ centrum implantatur, parte quâ malleolus intus membranæ jungitur.

Ufus est membranam cum malleolo extrorsum trahere.

Notandus est ductus quidam exiguus cartilagineus ab aure ad palatum abiens, *valvulâ* donatus.

Ufus est aerem congenitum expurgare

e. Nam hac via patet exitus excremen-
tis ab aure ad os, sed non è contrà, ob
valvulam. Unde in aurium affectibus
masticatoria admodum juvant.

Tandem occurrit *nervus auditorius*,
qui ex quinto cerebri pari est.

*Masticato-
ria in au-
rium affe-
ctibus cur
juvant?*

CAPVT X.

DE NASO.

Aliud sensus organum sequitur, vide-
licet olfactorium, *nasus*, datus homi-
ni & animalibus quadrupedibus vivi-
taris.

*Dividitur autem sicuti & auris in na-
sum externum & internum.*

Internus habet ossa & nervos, cum *Appellatio-*
processibus mammillaribus, de quibus nes partiū
quo loco. *nasi.*

*Externus dividitur extrinsecus in par-
tem superiorem & inferiorem.*

*Pars superior, quæ ossæa est & immo-
bilis, dicitur dorsum nasi, ejusq; pars acu-
minata, spina. Inferior pars cartila-
nea est & mobilis, cujus ima extremi-
as dicitur nasi globulus & orbiculus, par-
tes verò laterales, πτερυγία; ala & pinna:
pars carnosa in medio prominens, labio
micina, columna appellatur.*

In-

Intrinfecus dividitur nasus per *foramen* in duo foramina vel sinus, quos *nares* dicunt: ut uno foramine obstrueto, alio inspirare & expirare queamus. Vtrumque verò obstrueto, os vicem narium praestat. Quodlibet verò *foramen* rursus dividitur circa nasi medium in duas partes: una sursum ascendit, ad os spongiosum, rursus supra palatum abit in fauces & interiora. Hinc potus aliquando per os effluit: & naribus injecta naso per os elabi solent. Hinc etiam cerebri excrementa crassiora, dum deorsum feruntur ad nares, in os delabi possunt, aut screatu eò attrahi, & per os expurgari.

Situs est in loco altiori, videlicet inter oculos 1, ob venustatem 2. Quia omnino odor ad superiora fertur.

Magnitudo variat, uti & *figura*, nam alij maximum, alij parvum, alij finum, alij quiliunum &c. habent, qua de re Phylonomici.

SUBSTANTIA ejus constat ex cuticula, cute, musculis, ossibus, cartilaginibus, vasis, tunicis.

Cutis ejus tenuis est, & pinguedine carne ne nimium excreseat; sub septo in columbo crassa est & fungosa, ut cartilagineo

mic.

muletur, pilisq; vibriscis dictis cingitur.

Musculi nasi octo dantur, præsertim in nasutis, sed exigui, quia exiguus est nasi motus. Quatuor ad dilatationem faciunt, dum alis vel pinnis sursum tractis, narium foramina aperiunt. Et totidem ad contractionem.

Duo primi dilatantes, qui carnosì, oriuntur ab osse malarum, juxta labiorum musculum, quem tertium constituunt. Inferuntur partim in labij superioris partem, partim in pinnam exterio-rem.

Duo reliqui, qui ferè triangulares, initio acuto & carnosò nascuntur à frontis sutura, & nasi spina, alisq; implantantur.

Duo primi constringentes, qui parvi, oriuntur carnosì circa pinnarum radicem, transversim feruntur, & angulis alarum inferuntur. Usus est, pinnis depresso nares nonnihil claudere.

Duo reliqui firmissimi sunt & membranosi, latentes sub tunica narium parte interiore. Oriuntur ab ossis nasi extremitate, & pinnis implantantur.

Cartilagine, substantiam constituent inferioris partis nasi, suntq; quinque
duæ

Due supreme latiores nasi ossibus adherent, & quò magis descendunt, molliores fiunt, adeò ut nasi extremum substantiam habeat, quasi partim cartilaginofam, partim ligamentofam.

Tertia inter has media septum constituit vel interstitium inter utrumque nasi foramen.

His apponuntur *aliæ duæ* pinnae constituentes, & per membranofa ligamenta colligantur.

Vasa. Venæ adfunt ex jugularibus.

Arteriæ à Carotidibus.

Nervi à tertio pari, utrinque unum, qui per foramina nasi & oculorù communia, ad majorem angulum in tunicam nasi abit, & ad musculos, atque palatum vergit.

Tunica nares succingens à durâ matre est, & communis ori, palato, linguæ, laryngi, gulæ & ventriculo, sed in naibus tenuior est, & exquisiti sensus; naibus excitata sternutationem facit.

Sternutationis causa.

Ufus nasi externi est.

1. Ut per eum aer intret usq; in cerebri, pro spirituum animalium generatione.

2. Ut per eum aer intret in pulmones, pro refrigerio cordis, & vitalium spirituum generatione.

3. U

3. Ut per eum odores deferantur
usq; ad mamillares processus. Unde
quibus nasus ad radicem dissectus est, vel
non olfaciunt, vel malè.

4. Ut cerebri excrementa per eum
ceu canalem effluant.

5. Ad vocem quoq; aliquid con-
fert.

6. Ornatum faciei addit. Scribitur
in Chronicis Anglicis virgines honestio-
res ejus loci tempore belli cum Danis,
natos sibi amputasse; ut ab irruentium
Danorum militum impetu, pudicitiam
sartam tectam, hac deformitate conser-
varent.

CAPVT XI.

DE ORE, BVCCIS
ET LABIIS.

Restat ultimum organum sensus, gu-
stus videlicet LINGVA, quam ante-
quam explicemus, partes externas circa
os, & internas alias in ore, proponere o-
portet.

Partes externæ circa os variæ sunt, *Appellatio-*
Superior pars sub oculis inter nasum & *nes partiū*
aurem, ob ruborem tam solitum, quàm *circa os ex-*
insolitum in pudore, dicitur pudoris sedes, *ternarum.*
malum seu pomum, item circulus faciei.

T

Infe-

Inferior pars laxior, quæ inflari potest, ut apparet in tubicinibus, *bucca* dicitur. Pars labri superioris, *missax*. Cavitas ei impressa & dividens, *philerum* quasi amabile. Sunt verò labia duo: *superius* & *inferius*, ex quibus rima in medio constituitur, *os* dictum. Partes labiorum extremæ prominentes appellantur *prolabia*. Inferior pars sub inferiori labio *mentum* dicitur; carnosæ sub mento pars *buccula*.

Os verò constat ex partibus partim ossibus, ut *maxilla superiori* & *inferiori* cum *dentibus*, partim carnosis, ut *labijs*, *musculisq; labiorum*, *buccarum*, & *maxillæ inferioris*.

Oris tota interna capacitas succingitur crassâ *tunicâ*, quæ & *gingivas* & *labia* ambit, & reduplicari putatur, quando *uvulam* constituit.

U^sus oris.

1. Cibum & potum recipere, & ad ejus præparationem seu *Chilificationis* principium, quod in ore fit, facere.
2. Ad inspirandum & expirandum.
3. Ad vocem.
4. Ut per os excrementa ex *antrâ* *pulmonum*, *capitis* & *ventriculi*, per *screatum*, *expuitionem*, *vomitionem*.

Musculi

Musculorum paria duo sunt buccis & labiis communia, duo ab utraq; parte, *Musculorū labiorum*
Primus est latus ille musculus & quadratus tenuis, sub colli cute jacens, quem *paria buccis communia.*
 veteres à cute non distinxerunt.

Oritur circa claviculas & posteriorem colli partem; *Fibris* verò obliquis (quas diligenter notabit Chirurgus, ne transversim & liberaliter eas incidat, atq; ita buccas ad alterā partem avulsas faciat) *implantatur* in mentū, labia & radicem nasi, aliquando & aurium: quas etiam partes ad partem movet. Et hic primus in spasmō Cynico intenditur. *Ufus. Spasmus*

Secundus huic subjacens est qui buccas sua mole constituit, ideo *buccinator* dictus. *Cynicus.*

Rotundus est instar circuli, tenuis & membraneus; variis fibris intertextus, *Figura*
 oris tunicā inseparabiliter succinctus. *buccinator.*

In hujus centro observavit *Casseri.*
rius robustum quoddam vinculum exteriorius enatum, & os genarum perreptans, ubi in musculum quendam parvum & gracilem buccæ directè oppositum terminetur.

Oritur hic musculus à superiori maxillā, *infitur* in inferiorem ad gingivarum radices.

T

Ufus

U^sus est buccas cum labiis movere
estq; dentibus instar manus, dum huc
hic ad dentes cibos propellit, quo et
ctius comminuat.

Labia constant ex carne indigesta
fungosa, (Fallopia habet pro nono p
ri muscutorum labii) quorum cutis a
eo cum musculis miscetur, ut cutis m
sculosa, vel cutaneus musculus esse v
deatur.

Tremor labij in vomit
rurientibus unde. Teguntur *tunica* ori & ventricu
communi: unde in vomituriensibus i
ferius labium tremit.

Partes quæ invicem se contingun
rubent, ob sanguinis affluxum.

U^sus 1. Os claudere, & dentes, pa
tesq; interiores tueri à frigore & exte
nis injuriis.

2. Ad edendi & bibendi commodi
tatem.

3. Ad vocem & loquelam.

4. Ad rejectionem sputi.

5. Ad ornatum.

Musculi labiorum præter commun
supra explicatos proprii aliqui sunt, qu
tamen quo ad numerum variare poss
sunt. Aliqui plures, aliqui pauciores
numerant: nam quidam ab aliis simpl
ces habentur, ab aliis multiplices.

Pa

Par unum est illustre à Fallopio descriptum, quod ex oculorum & nasi intermedio angulo *delapsum*, rectà in superius labri corpus *immergitur*. *Musculorū 4. paria superius labrum movens.*

Alia duoparia sunt, quæ omnes alij pro unico habent; & *fundamenti locant* in osse malæ firma & carnosæ; atq; oblique deorsum (unum tamen magis altero) vergunt. Mutuus quidem horum in exortu amplexus est, sed in diversas labij partes manifestè *implantantur*, quare & inferius par magis ad latera trahit quàm superius. *ventia.*

Aliud par est carnosum, gracile, teres, pinguedine obvolutum, à cavitate malis subjecta *ortum & insertum*, ubi labia conveniunt: & hoc par deorsum movet. *Usus.*

Dicti hi omnes muscoli superius labium movent. *Musculorū par inferius labrum movens.*

Aliud par est inferius labium movens, latum & breve. *us labrum movens.*

Oritur carneum à maxilla inferiore ad latera menti: *inscritur* obliquè ad labij medium. Omnes vero labiorum muscoli cuti adeò miscentur, ut fibræ decussatim se interfecent. Quare valdè diversi fiunt labiorum motus.

Ad exquisitum labiorum sensum mittuntur nervorum propagines, & ex vicinis locis venæ & arteriæ.

T 3

Muscu-

MUSCULI MAXILLÆ INFERIORIS (hæc enim movetur, superiori immobili) aliis octo, aliis decem numerantur, dicti masticatorii, mandibulares, molares, quia ad masticationem seu ciborum contritionem faciunt. Unum tantum par maxillam deprimit, quia illas deorsum tendit. Reliqua paria attrahunt, quæ robustissima sunt.

Vsus in genere.

Primus musculus temporalis dicitur a situ, quia temporum cavitatem occupat.

Hic omnium maximus est, validus & robustus. Major tamen & robustior aliis animalibus, ut leonibus, lupis, canibus, porcis &c. quæ morfu forti uti debebant.

Vsus temporalis musculi.

Nam temporalis *finis* est in inferioris maxillæ, quam movet & sursum trahit, adeoque os claudit; & quidem processu acuto finitur, tendine nervo brevi & valido.

Oritur verò à temporibus initio a toto, carnoso & semicirculari, sensim descendendo arctatur.

Nervi utrinque tres in eum inferuntur, duo ex tertio pari, tertius ex quinto. Quamobrem læso vel contuso hoc musculo, periculum magnum adest *vulnere*

vulsionis & tandem mortis. Et ob hujus distensionem Hippocrates lethalem pronuntiavit maxillæ inferioris luxationem, nisi statim reponatur. *Cur periculum laesionum sculæ temporalis.*

Munimenti ergo natura dedit 1. *Membranam* crassam & duram, pericranium, adeò, ut interior pars musculi tota carnea ea parte ossi absq; pericranio adhæreat.

2. Os jugale supra inferiorem partem tendinosam & nervosam.

3. Tendinem carne munivit supra infraq;.

Secundus musculus mansorius primus dicitur, *masseter*, molitor & mandibularis, in buccis situs.

Oritur duplici capite: altero carnoso altero nervoso, ab osse jugali & maxillæ superioris osse primo: *Inseritur* in maxillæ partem inferiorem: quam in comedentibus circumagit. Etenim fibræ caput se interfecant, ut & antrosum, & retrorsum, & in latera maxillam moveant. *Vs.*

Tertium par quod Fallopio debetur, Vesalio verò temporalis musculi pars est, sub temporali situm est.

Oritur ab osse sphænoide & processu alari initio partim nervoso partim

carnoso: *Implantatur* in maxillæ cer-
cem & ejus capitis internam sedem.

Ufus, antrorsum movere & exere-

Quartus mansorius alter dicitur, cras-
sus & brevis;

Oritur nervosus ab ossis sphænoidi-
processibus alatis; maxillæq; *inserir*
parti internæ & posteriori, tendine laterali
& valido;

Ufus maxillam sursum trahere, &
temporalem adjuvare.

Quintus graphyoides dicitur, quia

Oritur ab appendice styloide, mem-
branosus & latus, mox verò teres & car-
nosus factus in medio tendinosus reddi-
tur, rursusq; carnosus factus in men-
tum *inserir*. Hinc duplicem ventrem
habere conspicitur, ideoq; *digastricus* et-
iam dicitur.

Ufus maxillam deorsum trahere &
os aperire.

Alij vero pro alio pari agnoscunt
partem musculi quadrati ad mentum
medium infixi.

CAPVT XII.

DE PARTIBVS IN ORE CONTENTIS;

Gingiva, Palato, Uvula, fauci-
bus, & osse gutturis.

Partes

Artes in ore contentæ sunt, præter
dentes: *gingivæ, palatum, uvula, fau-*
ces, os linguae, lingua ipsa, tonsillæ, larynx,
œsophagi principium. De tribus posteri-
oribus in libro secundo ob partium con-
tritionem actum est. De quinque; priori-
bus hoc agemus capite, & de lingua in se-
quente.

GINGIVA est caro dura dentes
star valli cingens, & in edentulis ali-
quid etiam ad ciborum contritionem
faciens: quâ vel exesâ, vel nimis relaxatâ,
vel nimis exsiccata, dentes vacillant aut
cadunt.

PALATUM est superior oris pars
star tholi leviter concavum, unde oris
celum dicitur, estque; cerebri basis, osse
ethenoide formata.

Investitur *tunicâ* crassâ à crassa me-
mbrana oriundâ, quæ buccas & totum os
intrinsecus cingit, estque; gulæ & ventri-
culi communis, quamobrem etiam in
his partes consensus est. Nec caput
asticatorijs expurgare possumus, nisi
simul ventriculū per palatum.

Nervulus ad sensum donatur.

UVULA à palato in os dependet *Situs Vvulae*
conitiū juxta narium meatus, supra la-
læ.
magis rimam inter amygdalas. Alijs

T *garga-*

gargareon dicitur à sono, videlicet *gargarisatu*; item *gurgulio*, *columna*.

Vvula quid Estq; processus ex SUBSTANTIA glandosa, spongiosa & rubra, quam vocat Columbus oriri ex palati tunica loci reduplicata.

Figura eius. Est rotundè oblonga, superius crassior, in acutum obtusè definit.

Aliquando ab humoribus delatibus nimis dependet, & dicitur *casus vvulae*.

Casus vvulae. *Vsus*, moderari aëris frigiditatem, subitò in pulmonem irruat.

Error vulgi. Alij falso putant facere ad vocis modulationem, unde vocant *vocis modulatorum*. At etiamsi lædatur & penitus sumatur, non tamen vox læditur, nisi vicinæ partes ad vocem conferant lædantur.

FAUCES aliquando dicuntur de oris hiato: strictè verò de posteriore & inferiore parte, quæ non nisi ore aperto & lingua depressa conspicitur. *Οάρυγα* vocant; quæ tamen vox Hippocratem sæpè notat faucium status ut inflammationem &c. Galenocitur *Isthmus*, ob loci angustiam.

In faucibus Os est, quod à frons

Græcæ literæ *υ* dicitur *υοειδές* *υψιλοειδές*, itē à forma literæ *λ* *λαμβδοειδές*. Di- Appellatio
 citur item *os gutturis*, & *os linguae*, de quo nes ossis Sy-
 hic agendum, non verò in osteologia, *oidis*.
 quia cum reliquis sceleti partibus non
 connectitur.

Est verò hoc os linguae basis &
 fundamentum super quo movetur :
 Laryngi verò præponitur.

Constat ex varijs ossiculis, ad mini-
 um tribus, ad summum tredecim, ali-
 quando ex quinq; septem, novem.

Medium ossiculum est maximum, fo-
 ris gibbum, intus cavum, processus habēs
cornua vocatos, utrinq; binos, ex ossiculis
 constantes pluribus vel paucioribus.

Processus ejus annectuntur ligamen-
 tis & extremitatibus styloidis, item cum
 cartilagine guttali.

Movetur hoc os, sed non nisi motā linguā
 ideò quatuor paria musculorum habet lin-
 guæ communia, nec nisi ijs remotis lin-
 guæ muscoli monstrari possunt.

Primum par antèrìus sub cute latet, in-
 cumbens tracheæ & cartilagini scutali.

Oritur lato & carneo principio ab altiore
 & interiore regione sterni: unde hoc par
 dicit *sterno hyoides*. Finis carnosus est in basi
 hyodis.

hyodis. Atq; in medio secundum longitudinem linea divisi sunt hi muscoli.

Usus deorsum rectà trahere.

Secundum sub mento & quinto pro maxillæ inferioris amplum, breve & durum carneum est.

Oritur à maxillæ inferioris interna parte vario fibrarum ductu : *finitur* medià sede hyodis. Dicitur nonnulli *geniohyoides*.

Usus sursum & nonnihil antrorsum trahere.

Tertium gracile & teres est, sub mento situm, *ortumq;* à styloidis appendicis dicitur; *finitur* in cornua hyodis. Aliquādo in medio perforantur pro musculo maxillam aperiante.

Usus, in latera movere & nonnihil sursum. Dicitur *styloceratoides*.

Quartum gracile & longum sub scapulae musculo, quem quartum faciunt, latet.

Oritur ex processu Coracoide, unde *Coracohyoides* dicitur : defertur sursum obliquè sub capitis musculo, quem primum faciunt. Estq; hoc par longum, duplici ventre præditum, & in medio interstar tendinis extenuatum, quemadmodum ille maxillam inferiorem detrahe

U

Vsus osi hyoidis est

I. Vt sit basis linguæ.

II. Vt ab eo oriantur muscoli multi
linguæ & laryngis.

CAPVT XIII. & ultimum.

DE LINGVA.

LINGVA à lingendo dicta in ore sub
palato.

Sita est, in homine

*Numero unica, in vitulis marinis du-
plex, in serpentibus trifida, in lacertis
bifida.*

In homine oblonga lata & crassa, &
ad radicem quidem crassior, in extremi-
tate tenuior & acutior.

Figura.

*Magnitudine mediocri & ori respon-
denti, quæ si nimia sit, ut moveri expe-
dit nequeat, blæsi fiunt & balbutientes,
et si nimia mollicie humiditateq; abun-
det, ut in infantibus, minus rectè articu-
latæ voces proferuntur.*

*Causa
loquelæ
depravatæ.*

Connexio. In piscibus tota adhæret.
In homine posteriùs nectitur laryngi,
& hyoidi, item faucibus & tonsillis. In-
teriùs in medio ejus corpore ligamento
alido & membranoso, ad robur & sta-
bilitatem, item ad insertionem propri-
orum

*Obstetricū,
mos pernicio-
siosus.*

orum musculorum: cuius extremitas
nulum dicitur; nec alius ab hoc diver-
reperitur funiculus. Hoc in plurimis
cens natis adeò totam linguam alligat
ut divelli obstetricis ungue (quod tam
perniciosum, nec admittendum) &
chirurgi scalpello soleat, ne suctioni
futuræ loquelæ impedimento sit, &
liberè volvi atq; moveri queat. Cæ-
rum imperitè omnibus indifferenter
fantibus interfecant.

Tunicā vestitur tenui, ut promptè
pores penetrent, in linguæ carnosam

Substantiam, quæ caro est peculiaris,
qualis nulla alia, interim mollis, la-
rara & spongiosa, ad imbibendos sa-
res humore aliquo vectos. In piscibus
nonnullis animalibus est ossea. Ad glo-
dosam substantiam, præsertim circa
sin magis accedit, quam ad muscu-
sam.

*Lingua an
musculus
sit.*

Lingua enim non est musculus, cor-
fibras non habeat, nec aliam partem
moveat, sed movetur à musculis. *Ap-
addunt hanc rationem; quia aliàs fieret
motus finem versus, & cauda muscu-
esset mobilis, caput immobile, sed
hæc ratio falsa. Principium enim*

est in laryngis vicinia, & quasi ex os-
hyoidis ortum.

Vasa. *Venæ* duæ insignes sub lingua con-
ciuntur, quæ secari solent, in faucium
ectibus, *raninæ* dictæ ob colorem, or-
à jugularibus. Has

Arteriæ duæ majusculæ comitantur à
rotidibus.

Nervi linguæ inseruntur tam motorij
am sensifici, omnes ab unica septima
njugatione non tertia aut quarta in
nicam & carnem linguæ.

Distinguitur lingua in superficie me-
a in partem dextram & sinistram per
eam quandam *candidam*, Hippocrati
medianam dictam.

Musculi LINGVÆ proprii, in ejus sub-
stantia definentes, recensentur ab Ana-
tomicis nonnullis sex, à quibusdam no-
em, ab alijs decem, ab alijs undecim, quæ
movent linguam sursum, deorsum, an-
tersum retrorsum, & in latera dextror-
am, sinistrorsum.

Primum par, quod in bobus est ge-
minum carnosum & crassum, *oritur*
b externa facie appendicis styloidis,
n homine gracile: *finitur* fibris trans-
versis in utrumq; linguæ latus.

Vfus

*U*us linguam introrsum ducere eo ob fibras intertextas linguam summi levant, si ambo agunt; sursum versus alterum tantum latus si alteruter. *I*scitur hoc par *styloglossum*.

*S*ecundum par *myloglossum* dicitur *o*rtum à lateribus maxillæ inferioris ad radices dentium molarium. *I*nsertum linguæ basi in ligamentum linguæ.

*U*us. Uno agente lingua sursum oblique ducitur; utrisq; apice recta ad palatum & superiores dentes.

*T*ertium par *o*ritur in interno ad mandibulum mento, unde *geneoglossum* dicitur; *f*initur in mediam ferè linguam inferius. Et ob fibras diversas videtur ad actiones contrarias edere: Fibrarum e maximâ parte, quæ linguæ radicem sustinet, ad exortum tracta, lingua erigit labia exseritur; minimâ verò partu fibrarum agente, introrsum. *I*nscriptiones habet hoc par ac si plures essent musculi.

*Q*uartum *o*ritur carneum ex superiore & media regione ossis hyoidis, *f*initur in medio, postquam productum est secundum linguæ longitudinem. *D*ividitur alicubi obscure, ac si plures essent musculi.

*U*sus est linguam rectà intrò trahe-
re. Dicitur vero basiglossum, vel ypsilo-
glossum.

Quintum Ceratoglossum vocatur;
quia *oritur* à superioribus cornubus hy-
poglossidis, & in lingvæ latera juxtà radicem
obliquè *inseritur*.

Oritur interdum ab inferioribus cor-
nubus, quando nimirum altiora defunt,
in mulieribus. Estq; hoc par in
canibus geminum.

*U*sus est linguam rectà deorsum in-
teriora versùs movere, quando ambo
adungunt; si vero alteruter contrahitur, in-
terius movet dextrum vel sinistrum.

Ab aliis additur *undecimus* musculus,
qui tamen musculus non est, siquidem
vibris non constat carnosus: sed est caro
ex plurimis glandulis & pingvedine ad
radicem lingvæ sita, atq; remotis dictis
musculis apparens.

*U*sus est, ut hac glandularum còpia
lingva inædeat.

*U*sus lingvæ est:

I. Gustus esse instrumentum.

II. Loquelæ.

III. Masticationem adjuvare, dum
cibos hinc inde volvit.

IV. Lambere.



LIBER IV.

De Artubus.

Artus quid.

Artuum nomine veniunt
membra ex trunco ex-
recta, superius MANUS
inferius PEDES. In quibus

præcipue considerantur, musculi, venæ,
arteriæ, nervi & ossa. De quatuor or-
dine anterioribus agemus in quatuor sequen-

*Cur in hoc
libro agen-
dum etiam
de musculis
capitis, cer-
vici, dorsi
etc.*

tibus libellis: DE MUSCULIS VERO
ARTUUM in hoc libro uti & de vicinarti-
partium, capitis, cervici, thoracis, dorsi &
musculis; non quod ad artus pertineant
sed quia in ordine secandi, ab Anatomico
ante musculos artuum demonstrari
non possunt.

CAPVT I.

DE MANU IN GENERE
& DE VNGVIBVS.*Manus u-
sus.*

MANUS Aristoteli est organum
ganorum, quo homo alias nudus
inermis donatur, ne brutis inferioribus
aut ab ijs vincatur, sed vincat, dum

parat, aliâq; instrumenta sibi necessaria.
Quare secus quàm bruta rationem
hominum homo accepit: & hæc quidem
est ministra est.

Est autem MANVS ex veterum signi- *Manus*
ficatione pars à summo humero, usq; ad *quid.*
extremas extremitates, diciturq; sum-
ma manus.

Et dividitur in brachium & manum *Manus in*
strictè sic dictam seu extremam. *partes di-*

Brachium rursus dividitur in hu- *visio.*
merum sive brachium strictè sumtum
cubiti.

Brachium in specie sumtum est pars
à humero usque ad cubiti flexu-
ram.

Cubitus est pars à flexurâ cubiti usq;
carpum.

Manus exrema dividitur in *brachiale*
carpum, quæ est pars inter cubitum
et palmam; in *postbrachiale* vel metacar-
pum, quæ est pars inter carpum & digito-
rum initium; & in *digitos*. *Postbrachialis*
interna dicitur *vola manus* & *palma*,
externa *dorsum manus*.

Digitus plures dati sunt, ut melius fie- *Plures di-*
manus actio, quæ est apprehensio: ut *gitur da-*
am minima cōprehenderemus, quod *ti.*
obus fit digitis, & alias itē multi for- *Manus actio*
mes

mes figuras; & quia omnia una manu
comprehendi non possunt, duę sunt co-
arę, ut ad se invicem inclinantes, au-
lium mutuū pręstarent.

Dextra verò manus agilior ut plurimū
& ad motum promptior est, non ob co-
sas, quas alii pueriliter citant, sed 1. quia
in dextro latere homini est vena sine
ri, quę fortē in ambidextris gemina
2. quia ossa graviora in scapulis, humeris
& totā manu dextrā esse aliqui habent
pro certo & comperto; quod fieri potest
ab impressione uberius caloris in utero
matris, cujus pars dextra calidior. Hic
docet Aristoteles naturā potiorem
manum dextrā sinistrā, & alibi; primum
impetum vel principium motus
in parte dextrā; ut homo progressus
prius moveat pedem dextrum, avis vo-
lens, prius moveat alam dextram.

*Digitorum
numerus.*

*Digit*i verò ob perfectam actionem
quinque facti sunt, longitudine & crassitie
differentes.

Primus pollex dicitur, quia robustior
pollet & unus opponitur quatuor reliquis
in apprehensione, ideoque crassus.

Secundus Index & demonstrator dicitur
quia ipso in indicando utimur.

Tertius longissimus & medius
pudicus dicitur, quia apud Medicos

sus est in locis sordidis & fœtidis; neq̃
annulis ornari solet.

Quartus medicus item *annularis*,
quod annulo aureo ante alios ornetur, *De digito*
ob communem, sed falsam & Anatomiae *annulari*
repugnantem nonnullorum opinionem, *error vul-*
gare si vena ex corde ad hunc potiss. digi- *gi.*
tū accederet; Cor verò auro cōfortatur.

Quintus *auricularis*, minimus, quia eo
ob parvitatē aures facilius expurgamus.

Apprehensio; ergo, quæ manus actio, *Apprehensio.*
vel uti alij indiscriminatim loquuntur,
usus est præcipuus, causa est totius ma-
nus apta compositio. Præcipuum tamen
hujus motus organum est musculus:
firmamentum ossa, quæ in digito quovis
aria sunt, quorum inferius tanquam su- *Manus cō-*
stinens superiori semper majus est & ro- *positio qua-*
bustius, & utrinque in juncturis cartila- *lis.*
gine donantur, ubi humor unctuosus
superfunditur ad humectationem & fa-
ciliorem motum.

Ungues exteriùs apponuntur di-
gitis, & etiam pedum extremitatibus: *De Ungvi-*
quorum pars summa alba dicitur *radix bus.*
ungvium, lunula candicans, & pellicula
radici adnata.

Materia est ex excrementis crassiorib9.

Efficiens, calor,

Finis & *Usus*.

I. Digitorum extremitates mollioribus mas rueri, & munimentum duricie præbere, ut commodius, melius & facilius fiat apprehensio. Sic etiam in pedibus ut in statione resistere queant.

II. Ad ornamentum: nam lætæ ungues regimus.

III. Secundariò ad fricandum, sed pendum & defendendum.

Formam venamur ex accidentibus

Figuram habent convexam non nihil, ut se applicent ad digitos.

Substantiam habent mediocriter firmam, ut resistent, sed tamen flexilem, cedant nonnihil, & non frangantur.

Color unguium & inde desumpta signa.

Pellucidi sunt, & ideò variè colorantur, nam pro ratione carnis subjæctæ, rubescunt, livent, &c. Hinc observare colorem unguium solent Medici, nam ungues exempli gratia, cordis calore deficientes pallescunt, & frigidioribus temperamentis pallidiores sunt ungues. At quibus calor justus est, rubescunt.

Connectuntur circa radicem *ligamentis*.

Cutis verò ijs extrinsecus circumnascitur, & caro subnascitur vel potius tendinosa musculorū ibi dilatati: undè exquisitus ibi sensus, & ex læsione magnus dolor.

Sensus unguium undè.

Hæc breviter ratione compendit unguibus.

CAPVT II.

DE MUSCULIS HU-

MERI seu BRACHII

specialiter dicti.

REmotis partibus continentibus communibus, cuticula, cute, pinguedine, membranâ carnosâ &c. occurrunt **MUSCULI**, per quos motus fit, de quibus in toto hoc libro agendum.

In genere verò *de actione* musculorum manus notandum, internos musculos potissimū flexionem facere, externos extensionem. Et musculos quidem totius manus internos & anteriores plures esse ac fortiores, quia flexio dignior est extensione.

Mouetur **HUMERVS** variè, ideò musculos varios habet partim thoraci incumbentes, partim scapulæ adnatos &c. Numerantur ab alijs septem, ab alijs octo, à Casserio novem. Brachium enim sursum movere dicuntur duo musculi: *Deltoides* & *supraspinatus*; deorsum duo: *aniscapitor* & *rotundus maior*: Antrorsum unicus, videlicet *pectoralis*; retrorsum tres, *infraspinatus*, *subscapularis* & *musculus transversus brevior*. Circularem verò motum,

*Musculi
humeri
quot?*

fieri putant ab omnibus successivè agentibus: at alii circumagi volunt brachium ab infraspinato, supraspinato & subscapulari. Sed in recensendo nos ordinem sectionis servabimus.

Primus PECTORALIS dicitur, qui pectus vel thoracis anteriorem partem occupat, magnus & carnosus, quem Galenus in tres vel quatuor dividi possit censuit.

Oritur ex osse pectoris ferè toto, & annexis cartilaginibus; *implantatur* tendine brevi, lato, nervoso & robusto in os humeri, inter Deltoidem & bicipitem.

Ufus est brachium pectori admove-
re & prout fibræ contrahuntur magis ad superiora vel inferiora, vel rectà, ita etiam inclinat. Hic musculus est, qui patitur in tormento, quod Itali vocant tratto de corda. Valdè enim distrahitur & divellitur, quando brachia retrahuntur.

Secundus dicitur DELTOIDES à figura Græcæ literæ Δ item triangularis humeralis, qui carnosus est & permanet, humeri capiti insternitur.

Oritur ex claviculæ mediâ parte, scapulam spectante, & ex summo humero. *Inseritur* in medio humeri.

Ufus

Vsus est brachium sursum tollere. In *Locus fontanella in brachio.*
huius mediâ parte solebant antiqui fontanellas facere; alij verò in exteriori parte ejusdem musculi: sed rectius fit in interstitio inter Deltoidem & bicipitem, uti docemus in tractatu nostro de Caverijs.

Tertius LATISSIMVS est & totum ferè dorsum cum suo compari tegit. Dicitur ANISCALPTOR quia brachium retrò deorsum trahit.

Oritur principio membranoso & latissimo, à vertebrarū spinæ apicibus: *inse-*
ritur inter pectoralem & rotundum. *Figura* est triangulari.

Fallopius ex Galeno contra Vesali-um docet hunc musculum quasi novo sed minimo principio donari, dum ex scapularum angulo inferiori plurimas carnosas fibras recipit.

Quartus dicitur ROTVNDVS MAIOR, estq; obliquè situs parte posticâ sub axillâ, carnosus, crassus, & alijs tere-rior.

Oritur carneus à costa inferiore scapulæ, & nonnihil ascendens tendine suo *implantatur* cum pectorali, in humerī partem superiorem & inferiorem.

V s

Usus

Vsus est brachium retro deorsum trahere, & Deltoidi contrariari.

Quintus brevis est & rotundus, tunc carnosus, qui initio acuto ex infimo scapulæ angulo pullulat; postea magis magisq; crassescit ad medium usq; ventrem inde sensim gracilescens, acuto fine finitur in ligamentum, quo humeri caput obvolutum est.

Situs habet obliquum, diciturq; alijs TRANSVERSUS musculus BRACHII VIOR, alijs rotundus minor. Et est octavus Fallopij: quem musculum alij putant esse portionem quandam quarti.

Sextus INERASPINATUS dicitur, item *super scapularis inferior*, quia scapulæ partem externam & gibbam totam regit, cuius etiam formam habet.

Putatur brachium ad exteriora circumagere.

Vsus.

Septimus SUPRASPINATUS, item *super scapularis superior*, alijs rotundus minor, supra axillam carnosus & oblongus, implet cavitatem inter costam scapulæ superiorem, & ejusdem spinam, è qua nascitur.

Hujus *usus* idem putatur, qui priorum.

Octavus, SUBSCAPULARIS dicitur, seu *immersus*, carnosus valde inter scapulæ

lam & costas habitat, & occupat partem internam scapulæ, inseritur verò lato tendine in humerum internum.

Usus, brachium introrsum circumagere.

Nonus. Noni musculi inventio A-
rantio & Placentino debetur, estque in
anteriori brachio **PERFORATIVS** di-
ctus.

Oritur à Coracoide processu Scapu-
læ, *inseritur* in internum humerum circa
medium, juxta tendinem Deltoidis.
Principium habet nerveum & breve, ob-
longum ventrem satis corpulentum, &
robustum tendinem. Venter ejus perfo-
ratus est & transitum nervis largitur,
qui ad cubiti musculos distribuuntur.
Hunc musculum alij saltem musculo-
sam portionem vocarunt

Vtilem ad brachium scapulæ proces-
sui adducendum.

CAPVT III.

DE MVSCVLIS SCA- PVLAE SEV HOMO- PLATÆ.

Quia

Quia movetur **SCAPULA** antro-
sum, retrorsum, sursum & deorsum.
Error aliorum. ideo *quatuor* accepit *musculos*, quibus ta-
men alij duos addunt. Serratum majorem & digastricum. Sed malè. Nam hic
est ossis hyoidis, ille vero thoracis proprius.

I. Dicitur **SERRATUS MINOR** estq; musculo pectorali substratus.

Oritur à costis superioribus quatuor exceptà primà, & sursum oblique ascendens, scapulæ *inseritur*.

Vsus antrosum ad thoracem adducere.

II. Galeno **TRAPEZIUS** dicitur alijs *cucullaris* ob figuram.

Oritur carneus & tenuis ab occipite. Sed ob varium ortum, variasq; fibras,

Vsus. Variè movet scapulam; sursum oblique, deorsum & rectà ad dorsum.

III. **RHOMBOIDES** à figura, sicut cucullari situs, tenuis & latus.

Vsus est nonnihil sursum ad posteriora trahere.

IV. **LEVATOR**, supra claviculam est.

Oritur à vertebrarum colli quinque transversis processibus, varijs principibus (unde plures videri possunt) quæ mœ-

cœunt

coeunt: & *infertio* fit in angulo scapulae al-
tiori & inferiori. *Vsus* est antrorsum sur-
sum trahere.

His musculus scapula per se, & bra-
chium per accidens movetur; sicut sca-
pula per accidens à brachij musculus.

CAPVT IV.

DE MUSCULIS THO-
RACIS SEV RESPIRA-
TIONIS.

Respirationi inserviunt plurimi mu-
sculi: ut diaphragma, omnes inter-
costales, aliqui abdominis, &

THORACIS proprij, qui recensentur *utringq; sex*; quibus tamen addit Fallo-
pius tres in cervice, qui Vesalio sunt par-
tes musculorum cervicem & dorsum
occupantium.

Proprij thoracis *musculi* thoraci ad-
nati sunt: duo parte anteriore, *subclavi-
us & triangularis*; Latera occupat *serratus
maior*; reliqui in postica sunt parte, nem-
pe *serratus posticus uterq; & sacrolumbus*.

I. *SUBCLAVIUS*, eò quod sub
clavicula situs fit, spaciū replet inter
claviculam & primam costam. Platerus
inter intercostales numerat.

Oritur

Oritur carnosus à parte interiorè & inferiore claviculæ: *Inferitur* carnosus in partem superiorem primæ costæ, quam sursum & extrorsum trahit. Et hic est primus musculus, qui thoracem dilatat seu distendit.

II. **SERRATUS MAIOR** magnus est, latus & undiq; carneus, cum abdominis obliquo descendente ferratam compagem efficit.

Oritur carnosus ex basi internâ scapulæ, *porrigitur* tendine ad costas, quas attollit.

III. **SERRATUS POSTICUS SUPERIOR** sub Rhomboide in dorso inter tramiq; scapulam habitat.

Oritur à spina, *inferitur* quatuor superiorum costarum tribus intervallis, tripartitus: & eas costas sursum trahit.

IV. **SERRATUS POSTICUS INFERIOR**, est membranofus & latus ferè in dorfi medio, sub musculo latissimo seu aniscalptore. *Inferitur* ad costarum inferiorum quatuor intervalla, velut in digitos divisus. *Vnus* thoracis partem inferiorè dilatare.

V. Præcedenti substernitur, & alijs *putatur* communis esse tam dorso quàm thoraci. Dicitur **SACROLUMBVS**, quia *oritur*

Oritur ab ossis sacri posteriore parte, & *in* *amborum* spinis *in* *feritur* costis inferioribus. Non facile separatur à longissimo co dorsi musculo, ut videri possit ejus articula.

VI. TRIANGULARIS, parvus est subtilis in macilentis vix carnosus, in *sub* *sterno* habitat, ex cujus parte *in* *rioriore* *ortum* habet. *In* *feritur* oblique carlaginibus inferioribus, quas adducit, & *thoracem* constringit.

CAPVT V.

DE MUSCVLIS CAPITIS.

MOVETUR CAPUT, vel secundario ad cervicis motum à cervicis musculis; vel primario supra secundam vertebra antrorsum & retrorsum flectendo, supra primam veluti axin circumducitur qui motus fit novem musculorum paribus.

Primum par longum & crassum est vertebris utrinque instratum. *Oritur* à spinis vertebrarum thoracis superiorum, & fertur per colli spinas ad mediam occipitis. *Usus* est caput ad posteriora recta

rectâ trahere. Si verò alteruter tantum agit, circulariter in latus motus fieri putatur.

Secundum implicatum & complexum est atq; dicitur. Videtur quasi ex tribus musculis constare; principia varia habent, variaq; ratione in occiput implatur.

Tertium par sub secundo pari firmum est, parvum & crassum, quod Vesalius vidit prioris musculi quartam partem esse. *Inseritur* in processus mammillares posteriorem radicem. *Ufus* est caput retrorsum leviter ducere; & si alteruter agat, retrorsum ad latus.

Quartum dicitur *rectum maius*, parvum, carnosum & gracile. *Oritur* à secundâ colli vertebrâ, *desinit* in medium occiput.

Quintum rectum minus sub priori par latet. Et *usus* est, ut tertij & quarti.

Sextum obliquum superius adhuc subter latet. *Oritur* è medio occipitis, & deorsum descendens *inseritur* transversis in apices processuum.

Septimū Obliquum inferius à secundâ colli vertebrâ *ortum*, processui transverso *inseritur*.

Octavum Mastoides, parte anteriori collo

colli, longum & teres, *oritur* à sterni &
claviculæ summâ parte, *inseritur* fine
carneo & crasso in mammillarem pro-
cessum, quem amplectitur.

Notum par Fallopius addit, sub gula
in anteriore colli parte, adjacens primo
cervicis pari. *Oritur* nervosum à liga-
mentis vertebrarum cervicis; *inseritur*
in basin capitis.

CAPVT VI.

DE MUSCULIS

CERVICIS seu

COLLI.

Musculi COLLI utrinq; *quatuor* sunt.
Duo primi flectunt, duo reliqui
extendunt.

I. LONGI duo sub œsophago lati-
ant, à quinta thoracis vertebrâ *princi-*
pium sumentes carneum & acutum, a-
scendunt in primæ vertebræ processum
extuberantem, aliquando & occipiti
propè magnum ejus foramen *inseruntur*.
Isus est, cervicem rectâ anteriora ver-
sus flectere, & unâ caput: si verò unus
trahat, in latus flectit.

II. SCALENI, qui quibusdam
thoracis musculi sunt, habentq; for-
amen peculiare, per quod in brachia veni-

X

&

& arteriæ exeunt. *Oriuntur* carnosæ à colli latus à primâ costâ; *inseruntur* i vertebrae colli.

III. TRANSVERSALES du in dorso siti *oriuntur* à sex vertebrae thoracis, *inseruntur* in omnes vertebrae cervicis transversos processus. Inter he verò nervi exeunt. *Ufus* est extendere vel in posteriora flectere; at si unus gat, oblique movere.

VI. SPINATI duo, inter spinorotam cervicem occupant, suntq; longi & ampli. *Ufus*, ut tertii paris.

CAPVT VII. DE MUSCULIS DORSI.

MOVETUR SPINA DORSI antrosum, retrorsum, ad latera, & circulariter. Atq; in histrionibus infinitos motus dorsi videre licet. Nam omnibus vertebrae offeruntur tendines, ac si plures & infiniti essent muscoli, quos tamen tendines Anatomici multi ad unum musculum referunt magnum, dicuntq; ut musculum habere multos tendines. Communiter verò quatuor paria de constituunt: ubi notandum, si alterum agit, spinam in latus moveri, si totum flecti vel extendi.

Primum par QUADRATUM appellatur, *adhaerens* processibus transversis vertebrarum lumborum, *ortum* ab ossibus ilio & sacro, latum & carnosum. *Ufus* omniumque vertebras flectere.

Secundum LONGISSIMUM, *oritur* ab extremo ossis sacri, *inseritur* vertebris lumborum & thoracis, *desinit*q; modò in primam vertebram thoracis, modò in os temporale. *Ufus* thoracem & lumbos extendere.

Tertium huic subjectum est, quod SACRUM appellatur, quia ab osse sacro posteriorius *oritur*, & in duodecimæ vertebræ thoracis spinam *finitur*. *Ufus* ut prioris.

Quartum SEMISPINATUM, *ortum* ubi præcedens *desinit*, omnes vertebrarum thoracis spinas amplectitur, & *desinit* in spinam primæ thoracis vertebræ. *Ufus* thoracem erigere.

Si omnes octo agunt, dorsum rectum detinent, & hominem quasi sustentant.

CAPVT VII.

DE MUSCULIS CUBITI & RADII.

Musculi CUBITI ordine sectionis *Secundo in sectione.*
 quuntur. Sectorem verò monemus, *Etione.*

X 2

non

non demonstrandos, statim post hos radii; sed omnium ultimo; post cubiti vero musculos, digitorum, pollicis & carpi.

Musculi cubiti quatuor sunt, & RADII eorundem.

Duo cubiti flexores sunt, ut *biceps* & *brachialis*. Duo extensores, *longus* & *brevis*.

Duo radii pronatores sunt, *rotundus* & *quadratus*, & duo supinatores, *longus* & *brevior*.

Cubiti namque proprius motus est flexio & extensio. Radius vero manum totam pronam vel supinam facit.

CUBITI primus dicitur *BICEPS* ob duplex ejus *initium* distinctum, quod est à scapula; *Inferitur* verò in cubitum & corpore suo brachii internam sedem occupat.

Secundus sub hoc latens, brevior *BRACHIALIS*, *oritur* ab osse brachii & antè *inferitur* in cubitum & radius.

Tertius *EXTENDENS* primus & *LONGVS*, *oritur* à scapulæ costa humiliori, *finitur* in olecranon.

Quartus *EXTENDENS* secundus *BREVIS*, *oritur* ab humeri cervice, posterius *miscetur* cum præcedente, & humeri os occupat.

Quo

Quintum addit Casserius, qui aliis
est portio quarti musculi, at ipsi distin-
ctus musculus. *Pullulat* ex posteriori ex-
tremitate humeri, juxta finem quarti
& tertii musculi, & cubiti articulum,
rætergressus, in os cubiti posteriore
quoque parte, non longè tamen ultra
olecranon *inseritur*.

Primus musculus RADII RO-
TUNDVS, ab apophysi internâ bra-
chii, obliquè in radium ferè medium,
cessat.

Secundus QUADRATUS ab imo
cubito in inum radium.

Tertius est SUPINATOR PRI-
MUS, ab inferiore brachii parte in in-
feriorem radii partem carnosus *inseritur*.

Quartus est SUPINATOR AL-
TER, ab apophysi externâ brachii in
medium ferè radium.

Inter musculos Radii invenit Casse-
rius aliquando duos parvulos, circà arti-
culum cubiti exiles, & opposito modo
incedentes atq; instar trochleæ in pro-
num & supinum radium moventes.

CAPVT IX.
DE MVSCVLIS CAR-
PI & DIGITORUM

X 3 Ad

*Musculus
palmaris.*

*Tendo la-
tus.*

AD CARPI musculos refertur PAL-
MARIS, ab apophysi internâ bra-
chii ortus, omnibus ferè musculis ma-
nus superjectus, expanditur in volam
manus, cuti firmissimè adhærens: ubi
sub cute in volâ manus est latus tendo
unde eximius ibi sensus.

Musculi CARPI quatuor sunt, duo
flexores & interni, duo extensores & exter-
ni.

Primus flexor à brachii internâ apo-
physsi ortus, cubitoque attensus, in
quartum os carpi crasso tendine implan-
tatur.

Alter ex eodem principio desinit
in os metacarpi primum, sub indi-
ce.

Primus extensor à brachii externâ a-
pophysi Radio instratus, in duplicem
desinit tendinem, ad os metacarpi pr-
mum & secundum.

Alter eodem principio, unico ten-
dine abit in os quartum, sub minimo di-
gitro.

DIGITI flectuntur, extenduntur, &
ducuntur & abducuntur.

Flectuntur sublimis & profundus.

Ille ab internâ brachii apophysi, a-
tequàm ad carpum perveniat, in quo

quor funditur tendines, ligamento instar annuli arctatos: in digitorum articulationem inferuntur.

Hic priori substratus & similis.

EXTENSORES pro uno numerat Sylvius, & digitorum tensorem vocat, cum tamen eorum varient & ortus & insertiones. *Oriuntur* ferè omnes ab apophysi externâ, & annulari vinculo prius colligati in secundum & tertium articulum *inferuntur*.

ADDUCUNT digitos muscoli quatuor, *lumbricales* seu *vermiculares* dicti à figurâ. *Oriuntur* à tendinibus profundius muscoli, & secundum latera digitorum protensi obliquè ad tertium internodium feruntur.

ABDUCTORES interossei sunt sex, in spaciis metacarpi, tres exteriores & tres interiores, qui cum vermicularibus coeunt, extensioni aliquantum inserviunt.

Musculi POLLICEM flectentes duo sunt:

Primus à superiore radij parte in alterum articulum inferitur.

Alter ab osse carpi sub pollice, in medium pollicem.

X 4

Exten-

Extendentes duo sunt à cubito orti.

Adducentes tres, duo à metacarpo orti, & tertius ab osse metacarpi indicem spectante.

Abducentes sunt tres ἀνόνομοι.

Sunt & alij in minimo digito, quos Aquapendens statuit minimum digitum abducere.

CAPVT X.

DE PEDE IN
GENERE.

Pes quid? **P**ES dicitur totum id quod est à nativitate tibus ad digitorum pedis extremitatem. *Eius in partes divisio.* & dividitur in suas partes, sicuti & manus, non absimili comparatione, nempe in femur, tibiam, & parvum pedem.

Pes minor rursus dividitur in pedum, metapedium & digitos.

Ambulatio quomodo fiat. **U**sus pedis vel cruris est, ut sit ambulationis instrumentum: quæ fit per motum & firmationem. Nam uno crure in terram firmato, alterum movemus & circumferimus, & ne in terram cadamus, pes fixus prohibet: atque ita fit ambulatio. *Firmatio* est totius corporis actio, *motus* vero pedis.

Hun

Hunc motum variè efficiunt varij
musculi femoris, tibiæ, & pedum. Itaq;
de musculis agendum.

CAPVT XI.

DE MUSCVLIS FE-
MORIS.

FEMUR *flectitur* duobus musculis.

Primus in abdomine est, diciturq;
Ψόας, vel musculus LUMBARIS; à lum-
borum vertebriis superioribus *oritur*,
& *inserirur* in trochantera parvum an-
ticè.

Secundus ILIACVS, ibidem *inserirur*,
ortus à tota cavitate interna ossis Ilij.

Extendunt femur tres musculi natium,

I. MAIOR, externus & amplissimus, à
Coxige in os femoris, sub trochantere
magno desinens.

Alter MEDIVS est in situ & magnitu-
dine.

III. MINIMVS, in trochantera ma-
gnum abit.

Adducunt & circumagunt femur intro
tres, qui à varijs pro uno habetur, &
TRICEPS vocatur, ob triplex ini-
tium i. A commissura summa ossis
X s pubis.

pubis. 2. Ab ima pubis commissurâ 3. A
eadem.

*Abducunt & circumagunt foras se
musculi: quadrigemini, & duo obturato-*
res.

QUADRIGEMINI sibi simili
sunt & parvi, quasi transversim positi, a
Ischij tubere enati.

OBTURATORES occupant f
ramē inter os pubis & ischij patens. Sur
que externi vel interni.

CAPUT XII.

DE MUSCULIS TI-
BIÆ.

FLECTUNT TIBIAM quatuor m
sculi postici.

Unus duo habet *capita*, *primum* à com
missurâ ossis pubis, *secundum* ab extern
femoris parte; & utrumq; uno tendio
in posteriorem tibiæ partem *inseritur*.

Reliqui *tres* à tubere Ischij *nascuntur*
unus exterior, & duo interni, nempe
minervosus & gracilis.

EXTENDUNT *quatuor*.

Primus *rectus* à spinâ externâ & inf
nâ llium oritur.

Secundus

Secundus & tertius sunt *vasti duo*:
Internus à radice totà trochanteris ma-
i & cruris osse subjecto: Internus à
trochantere parvo.

Quartus *Crureus*, ossi cruris affixus est,
quemadmodum brachius brachio.

Hi quatuor muscoli in unum tendi-
tem *finiuntur* qui molam amplexatus in
tibiae principium antèrè inferitur, ibi-
que genu pro ligamento est.

ADDVCUNT intro duo:

Primus *longus*, omniumq; musculo-
rum ferè longissimus, ab Ilij spina *exortus*
obliquè in tibia internam & anticam
descendit.

Alter *popliteus*, ab inferiore & exte-
riore femoris tuberculo, in interiorem
tibiae partem quadratus *inferitur*.

ABDUCTOR unus est, qui mem-
branosus & *fascia lata* dicitur. *Oritur* car-
nosus à spinâ ossis Ilium, & obliquè in ti-
biam exteriorem *fertur*, suoq; ten-
dine latissimo & longissimo, o-
mnes ferè femoris muscu-
los investit.

CAPVT

CAPVT XIII.

DE MVSCVLIS P
D V M.

Flectitur P E s & extenditur. **EXTENDVNT** duo.

Primus tibiaeus anticus dicitur, tibiae fixus, à superno tibiae processu ortus, feritur in os pedij, ante pollicem, tendit ad finem bifido.

Alter *peroneus biceps*, uno capite principio promanante à fibulae superioris epiphyssi, altero è peronis medio. Duplex habet tendinem; minorem in minimi digiti os delatum, & maiorem sub planta obliquè incedentem, & insertum in os pedij è regione pollicis.

EXTENDVNT quatuor. *Duo gemini*, internus & externus. *Tertius soleus* dictus his subditur. Tres himusculi desinunt in crassimum & validissimum tendinē plantae calcisq; principio inferendum, quo suspendi solent mactata pecora. Hippocrates vocavit *chordam*: ubi ex causa fractura febres vult contingere singulas & convulsificas.

Vltimus

Ultimus *plantarii* dicitur, & respondet
ulmari in manu, gracilis est, inq; tendi-
tem longum degenerat.

CAPVT XIV.

DE MUSCULIS DIGI-
TORVM.

VT manus, ita pedis DIGITOS muscoli
movent.

FLECTUNT duo muscoli, *magnus* pro-
undo respondet, *ortus* à superna tibiæ e-
piphyfi, & sub planta in quatuor tendi-
ces finditur, qui minorem perforantes,
in tertiam quatuor digitorum articula-
tionem *implantantur*. Minor sublimi re-
spondens, in planta pedis mediâ est, à
superna inferna *ortus*, in secundam quatu-
or digitorum articulationem *fertur*.

Quatuor digitos pedis unus *extendit*
musculus, *ortus* à summa & externa tibia,
quatuorq; habens tendines.

ADDUCUNT lumbrici quatuor.

ABDUCUNT *interossei*, à pedij ossibus
nati, & spacia metapedij replentes.

POLLEX pedis peculiares possidet
musculos.

FLECTITUR unico à fibula pro-
deunte.

Exten-

Extenditur altero, à mediâ fibulâ p
lulante, qui sæpè in duos tendines di
ditur.


ADDUCITVR uno, ossi pedij m
ximo, intus attento.

ABDUCITVR uno, à calcis inter
nâ parte carnosâ orto, & in primum
pollicis *ingrediente*.

Novus autem *reperitur musculus* supra
terosseos, cujus primus invētor est Cal
sius, qui *transversalem* vocat, ob situm.

Oritur nervosus & latus à ligamē
primi internodij minimi digiti, aliquā
& ab altero annulari; mox carnosus
ctus manensq; transversim defertur
pra digitorū primos articulos, & tendit
brevis latoq; in magni digiti primum
articulum nonnihil introrsum *implan*
tur.

Vsus est facere securam ambulati
nem, quādo per viam asperam rotund
silicibus refertam, aut per aliud aliqu
minutum, lubricum & volubile eund
est. Nam hujus musculi ope pes ad ej
modi corporis figuram se accom
modat, & id quasi apprehendit,
ut tutò gressum firma
re possit.



LIBELLVS I.

De Venis.

*Respondens*LIBRO I. DE INFIMO
VENTRE.

Vpra in procemio hujus
operis A natomici quatuor
libros, & quatuor libellos
promisimus. Quatuor li-
ros: de cavitatibus tribus, & de artubus.
Quatuor libellos: videlicet de venis, ar-
terijs, nervis & ossibus. Quilibet autem
libellus suo libro respondet. Quia ab in-
fima cavitate, ejus nimirum parte prin-
cipe epate oriuntur VENÆ; à corde in
mediâ cavitate ARTERIÆ; à medul-
la in tertiâ cavitate, Nervi; OSSA
verò artubus respondent. Et quem-
admodum ossa conjuncta peculia-
rem compagem seu σπίνδρον con-
stituunt,

stituunt : integram animalis formam in
ferens; sic etiam Venæ, arteriæ & Nervi
Et talem venarum totius corporis con-
pagem artificiosè separatam habet G.
lielmus Fabricius Hildanus, Chirurgus
Paterniacensis.

VENÆ & ARTERIÆ & NERVI
sunt organa vel vasa corporis commu-
nia per quæ spiritus aliquis cū sanguine
vel sine sanguine à membro aliquo prin-
cipali in varias corporis partes devec-
tur.

CAPVT I.

DE VENA IN GE-
NERE.

Vena quid. **V**ENÆ est organum commune,
res, oblongum; instar canalis ve-
stilæ cavum, vehendo sanguini & spi-
tui naturali idoneum.

Venæ nomen Veteres tam venarum
quàm arterijs tribuerunt; sed arterias
vocarunt pulsatiles venas, venas vero
non pulsatiles. Alij verò venam prin-
cipalem vocarunt maiorem venam: arteriam,
minorem venam & aortam.

Efficiens Venæ est vis venifica prin-
cipalis.

MATERIA Hippocrati est semen
lutinosum & magis frigidum. Et hoc
est principium originis.

At principium dispensationis unde ori-
ntur vena est epar (mittimus enim anti-
uos nonnullos nugatores, qui à cere-
ro venas derivarunt) non vero cor, ut
oluit Aristoteles. Nam

*Epar esse
principium
venarum*

non cor,

contra Ari-

stotelem

probat.

I. In epate est sangvificatio. Ergo
si verisimile est esse venarum principi-
um, In corde vero non fieri sangvifica-
tionem liquet, quia nullæ sunt viæ defe-
rentes Chylum ad cor; deinde nulla
in cordi apposita sunt receptacula excre-
mentorum alicujus coctionis. Quæ ta-
men omnia in epate adsunt.

In corde

fieri san-

gvificatio-

nem.

II. Ab epate defertur sangvis ad
cor; non à corde ad epar. Nam ex corde
sangvis ad epar exire non potest ob val-
vulas.

III. Pisces carent dextro cordis
ventriculo, in quo volunt sangvinem
ferri, & ex quo volunt venas oriri. Et
tamen pisces venas atque sangvinem ha-
bent.

IV. Si cor esset venarum principi-
um, non indigeret alia vena pro nutri-
tione, qualem tamen requirit & possi-
det, videlicet coronariam.

X

V. Ve

V. Vena portæ non attingit cor, se-
epar, quod cava etiam attingit: quæ du-
venæ maximæ sunt in toto corpore. A-
secundum Aristotelem omnes venæ d-
bent esse cordi continuæ.

Dices: Venam arteriosam non at-
tingere epar.

Respondeo, neq; debere: quia su-
stantiam habet arteriæ, ideoq; a coro-
orta est.

VI. In fœtu umbilicalis vena cu-
sangvine mittitur in epar, non in cor.

VII. Si à corde orirentur venæ, p-
sarent ut arteriæ, nam totum cor p-
sat.

VIII. Nunquam læditur sangvini-
catio, nisi læso epate, ut in hydrope, &

IX. Si cor esset venarum sang-
ficationisq; principium, duo in eodot
vase eodem tempore essent motus co-
trarii. Nam in diastole hauriret cor
venâ cavâ sangvinem, & in contrac-
ne sangvinem in eandem cavam effu-
deret, atq; ita crudus sangvis cum coo-
misceretur.

Hæ potiores sunt rationes pro
sententiâ: alias verò multas alioru-
contra Aristotelem tanquam imbeci-
& facilè refutabiles rejicimus uti & a-

cilè refutabiles Peripateticorum contrà
hanc sententiam rationes, quæ à quovis
vel leviter saltem cognitione Anatomica
tincto solvuntur.

Finis vel usus est.

I. Sangvinem cum spiritu & facultate naturali ab epate in omnes corporis partes pro nutritione adducere.

II. Eundem sangvinem nonnihil vel præparare, ut faciunt rami portæ Mesaraici, vel perficere, ut rami venæ cavæ, in quibus etiam pituita tempore inediæ in sangvinem mutatur.

III. Sangvinem custodire, sicut locus proprius locatum conservat. Nam sangvis extraventus seu extra locum naturalem suum videlicet venas effusus, concrefcit & putrescit.

IV. In specie nonnullæ venæ excrementa recipiunt, ut emulgentes serum, sangvinem menstruum venæ uteri; crassum, vel uti vocant melancholicum, hæmorrhoidales.

Forma venarum ex accidentibus hauritur variis.

Figura est instar canalis vel fistulæ.

Magnitudo variat. Magnæ enim venæ sunt in epate ceu principio,

Y 2 in

in pulmonibus, quia sunt calidi, molles
& in perpetuo motu, unde plurimo egent
alimento, cum multum substantię defluat.
In corde ob caliditatem: Emulgentes
item magna sunt, ob excrementum co-
piosum serosum. Ubi verò substantia
partis perdurat, nec facile dissolvitur
ob caloris inopiam, minores sunt venae
ut in cerebro, ubi non facile semper ve-
nae apparent; & in ossibus, ubi nu-
quam apparent manifeste, etiam si ar-
mal magnum sit. Et haec omnia secu-
dum Galeni doctrinam.

Connexio talis est cum arteriis,
omnis vena ut plurimum sociam habet
arteriam, cui incumbit, & quam co-
tingit. Rarius invenitur, docente Gal-
eno, vena sine arteriis; nulla verò arteria
sine vena.

Anastomoses venarum. Mutua verò in corpore est *ἀνασ-
τομὴ* venarum & arteriarum: ut inter
se conspirationem habeant, & trans-
mittant ex se invicem spiritum & sangui-
nem; quod patet: quia si venae pla-
tinantur, exinaniantur, evacuantur & arteriae
Sunt & multis in locis *ἀναστωμώσεις* co-
spicuae venarum.

In cerebro, in plexu Choroide:
pulmonibus venae arteriosae & arteriae
venae

nos) ex se & sua natura; non humorum contentorum acredinem, non incisionem aut unctionem. Unde Philosophus ait lib. 3. de hist. animal. c. 5. Nervus ignem non patitur, cum vena pariatur. Et Galenus 6. de usu part. c. 12. Venæ inciduntur, urantur, vel laqueis excipiuntur, uti & arteriæ, nequaquam sentiunt.

CAPUT II.

DE VENARVM SUBSTANTIA & VULNERIBUS.

SUBSTANTIA VENARUM membranosa, ut facilius distenditur, rursus concidere queant.

Tunicam unicam habent, quæ propria est (arteriæ duplicem) tenuem & elasticam; quia per eam transfundare debet sanguis pro nutritione partium.

Vene an fibras habeant.

Hanc putant aliqui triplici firmitate genere intertextam: sed admodum obscurè adesse fibras istas, & potius inesse, nec loco moveri posse ob assiduum contextum. Sed putamus contrarium cum Vesalio alios imaginari.

bras, quæ non magis adsunt quàm
 in corio: nam variè discerpendo vena-
 um substantiam, nullæ apparent fibræ.
 Quidam verò Autores fibras tribuunt,
 quia præconceperunt hanc opinionem;
 attractionem, expulsionem & reten-
 tionem per fibras varias fieri.

Intus in venis reperiuntur VAL-
 VULÆ seu OSTIOLA nonnulla, quo-
 rum mentionem sub nomine cellula-
 rum ab Avicennâ factam scribit Bau-
 hinus. Aquapendens primum se inven-
 torem asserit anno 79. Post eum,
 verò meminere harum valvularum,
 Salomon Albertus, Archangelus Picco-
 lomineus, & Casparus Bauhinus: vix
 verò eas attingit Laurentius.

Occasio inveniendi Aquapenden-
 ti fuit: si premere venas illas aut de-
 orsum fricando adigere sangvinem.
 tentes, cursus ejus retardari conspici-
 tur. Sed apparent etiam in vivorum
 brachiis, ad phlebotomiam ligatis no-
 di quidam conflati ab ostiolis; qui-
 busdam vero ut bajulis & rusticis, va-
 ricum modo in cruribus intumescere
 videntur.

Y 4

Atq;

*Varicum
caussa.*

Atq; videtur hic consistere caussa varicum, quod sanguis crassior in valvulis diutius retentus, dilatationem valvularum faciat: absq; his esset, uniformiter intumescerent venæ, & non varicum modo.

Quia vero hæc de valvulis venarum doctrina paucis cognita est, exactius more nostro in rarioribus usitato eas proponemus.

*Valvula
venarum
quid.*

VALVULÆ istæ, sunt tenuissimæ membranulæ (in orificiis vasorum communis crassæ) in internâ cavitate venarum, & quædam quasi portiunculæ venarum tunicæ; cum ibi venarum corpus tenuissimum sit, ubi abscedunt illæ membranulæ.

*Cur in ex-
ortibus ve-
narum non
reperiatur.*

Sitæ sunt in cavitate venarum, sed in venis potissimum artuum, videlicet brachiorum & crurum, post alarum inguinum glandulas. Incipiunt statim sub ramorum exortibus, non in ipsis exortibus: ne impediatur humorum refluxio: ne gurgitatio sæpè necessaria, ut ex revulsione constat. Reperiuntur verò in orificio venæ jugularis binæ, supernè deorsum spectantes; reliquæ infernè sursum spectant in Cephalica, in Basilicâ, in venis pedum & crurum multæ.

In Cavæ trunco non reperiuntur, *Cur non*
 eq; in jugularibus (ptæter modò dictas *reperian-*
 orificio) quia cerebrum, cor, pulmo, *tur in Ca-*
 par, renes semper debent affluere san- *vatrunco,*
 uine sine retardatione, ad spirituum ge- *iugulari-*
 rationem, & substantiæ deperditæ re- *bis, venis*
 titutionem. Sic neq; in venis externis *externis*
 xiguis: quia ob parvitatem non indige- *parvis, neq;*
 ant. In arterijs etiam nullæ, quia in ijs *in arterijs*
 t, & fieri semper debet sanguinis spiri-
 uosi fluxus & refluxus: deinde arteriæ
 er se satis robustæ sunt.

Ita verò sitæ sunt, ut sursum vena-
 um radices versùs orificia habeant, in-
 tra clausæ. Et notandum est in situ natu-
 æ artificium, quod adversam positio-
 nem habeant valvulæ, se invicem se-
 quentes, quemadmodum nodi in plan-
 tarum ramulis & caule, hoc est, in ò per li-
 neam rectam vel ex eodem latere sitæ
 sunt, ne totus sanguis rectà per vasis par-
 tē liberam deflueret. Ita inferiores val-
 vulæ, quod superiores reliquerant, re-
 morantur. Et si omnia ostiola ad ean-
 dem rectam lineam essent disposita, le-
 vis aut nulla facta fuisset mora. De-
 inde per intervalla sitæ sunt secundum
 vasis longitudinem, alibi duorum, tri-

Y

tini.

um, quatuor, quinque digitorum interstitijs; ut viam relinquunt, qua sanguis deorsum labi, & reliquis subsequenti valvulis etiam incidere possit.

Magnitudo. Majores sunt, ubi majori retardatione opus, ut in Basilica & in crurali ad inguina.

Numerus omnium variat uti & intervalla. Sunt enim plures valvulae in quibus plures valvulae.

I. Qui melancholico sanguine abundant, aut e contra bilioso & tenuissimo.

II. In corporibus magnis aut magis carnosus, ideoque plures venas habentibus.

III. In ijs, qui vasa habent laevissima.

IV. In ijs qui longas rectasque venas habent; nam in obliquis nonnihil retardatur ex obliquitate sanguis.

Deinde numerus valvularum in uno loco, non excedit binarium. Nam per intervalla modo singulatim, modo geminatim ad summum fixae sunt, ternae, ut in vasis cordis unquam recur-

antur valvulae: quia hic oportuit planè
 impediri recursum, ibi progressum tan-
 tum non nihil remorari. Vbi plus & di-
 utius sanguinem retardari conveniebat,
 quo ostiola facta sunt, ubi minus, u-
 num.

Figura est unguis in indice vel reli-
 quis tribus digitis, vel lunæ cornicula-
 æ, qualis est in sigmoideis cordis val-
 vulis.

SUBSTANTIA est tenuissima,
 sed simul densissima, nè rumpantur ab
 incurfu sanguinis valido. Et liquet hoc
 ex varicibus, ubi diutissimè possunt san-
 guinem crassum continere.

Vsus I. ad robur venis conciliandum;
 cum arteriæ aliàs ob duplicem tunicam
 robustæ sint,

II. Præcipuus est, sistere & remo-
 rari impetum gravis & fluidi sanguinis
 ἀτρώας & fluminis instar confluentis in
 brachia & crura, ob eorum declivem si-
 tum, tum præsertim in motu & exerci-
 tio vehementissimo, ubi vi caloris
 maximi in artus sanguis corrueret,
 atque ita 1. interiores partes & nobi-
 liores alimento defraudarentur; 2.
 Venæ artuum nimis distenderentur,
 & im-

& immineret ruptionis periculum, ad
eoq; pedes & brachia tumerent perpe-
tuo.

In orificio verò jugularis venæ adsum-
ad detinendum sanguinem; ne in decliv-
capitis situ ad cerebrum instar fluminis
irruat sanguis, & apoplexiam generet.

CAPVT III.

DE VENARVM CORPO-
RIS DIVISIONE ET DE VE-
NA PORTÆ.

OMnes Venæ totius corporis ad duas
referuntur tanquam matres: Venam
portæ & Venam cavam.

Venaportæ est vena *umbilicalis*, de qua supra in libro
nomina & primo, Venarum omnium prima ex se-
appellatio- mine orta.
nis ratio.

Dicitur autem *Venaportæ* vel quæ a
portas est, item vena *ostiaria*; quia per
ejus radices, vel secundum alios, ramorum
nempe venas *mesaraicas*, Chylus ex
ventriculo & intestinis exsuctus vel
per portas ad epar defertur. Arabibus
dicitur vena *lactea*, quia Chylum lactis
coloris attrahit.

Est hæc vena post cavam maxima, & cava epatis parte oriri communiter creditur. Estq; non ita densa ut cava, sed mollior.

Dividitur in *truncum* & *ramos*.

Rami alij *superiores*, alij *inferiores*. Et qui illos, aliqui hos *radices* appellant.

Illos vocant *radices*; quia ex epate *te in epate* itur hæc vena originem habere: hos, dicuntur a ut *radices* ex terra exsurgunt *radices*.

Et in truncum arboris devehunt: & venæ *mesaraicæ*, quæ sunt rami *mesaraici* superiores venæ portæ, instar radicum *in intesti-* nunt Chylum, atq; ad epar per truncum & ramos superiores devehunt; un- *nur Radi-* mesaraicæ *epatis manus* dicuntur. Di- *ces* *sinodè* ergo omnes & ramos & ra- *ces* *es* vocabimus.

Superiores rami, per epatis cavam tem disperguntur quatuor vel quinque, qui postea infra & extra epar in unum truncum coeunt. De his una cum stomosibus vide supra libri primi capitulum de epate.

truncus antequam dividitur in ramos superiores, mittit venulas duas ad vesicariam, quæ *cystica gemellæ* dicuntur; & *aliam*

aliam venam ad ventriculum, quæ ob
gastrica dextra vocitatur.

Postea *sinistrorsum* inclinans *truncus*
dividitur in duos ramos insignes inferio-
res: unum altiore, eumq; minore
sinistram latus petentem, alterum
miliorem, ampliorem & dextrum.

Venæ lie-
nis.

Ventriculi

Omenti.

Pancreatis

Lienis.

Omenti.

Ventriculi.

Ille *splenicus* dicitur, quia *splene*
adit. Et antequam dividatur *spansus*
de se ramos superiores ad ventriculum
duos, *gastricam minorem*, & *gastricam*
maiores, amplissimam omnium venarum
culi venarum, quæ postea *coronaria*
constituit. Deinde ramos inferiores
ad omentum duos, & ad pancrea-
num.

His constitutis dividitur *truncus*
splenicus in ramum supernum & inferi-
orem. Ille producit *vas breve*, aliosq;
multos in *splenem* delatos. Hic
duas venas pro Omento & ventriculo
quæ dicuntur *epiplois sinistra*, & *gastro-*
epiplois sinistra. Tandem reliqui ejus rami
in *splene* absumuntur.

Ramus dexter Venæ portæ antequam
dividatur producit venas duas:

entriculi & Omenti partem dextram. *Ventriculi*
 ad Intestina videlicet ad duodeni me- *omeni.*
 um & jejuni initium : unde ramuli *Intestino-*
 nonnulli capillares eunt per pancreas & *rum.*
 nentum *superius.*

Postea totus ramus amplius mesen-
 rium ingreditur, & in tres *ramos me-* *Mesenterij*
 entericos dictos insignes, inter duas
 mesenterij tunicas delatus distribui-
 tur.

Ramus mesentericus *dexter* est du-
 lex, qui in quatuordecim ramos anony-
 nos abit, & hi rursus in innumeras ve-
 narum propagines, *mesaraicas* dictas in
 jejunum, ileum, Cæco, & Coli parte
 varum

Ufus 1. Chylum exsugere ex intesti- *Vena Me-*
 nis, & per truncum venæ portæ in epar *saraica.*
 eferre.

2. Eundem nonnihil præparare, &
 prima sanguinis rudimenta ei tribuere.

3. Ab epate vicissim ad intestina san-
 guinem pro nutritione devehere. Quæ
 omnia non fierent, si valvulæ intus ad *Columbi*
 essent, sicuti Columbus fingit contra ex- *error de*
 perientiam: & impedirent valvulæ hu- *valvulis*
 norum à corpore in intestina regres- *mesaraica-*
 sum, in purgationibus vel spontè vel per *rum.*
 harum factis.

Mesen-

Mesentericus ramus *sinister* in sinistram & mediam mesenterij partem spargitur, & Coli partem à sinistro lobi ventriculi, & ad intestinum rectum. Hinc oritur vena hæmorrhoidalis & terna dicta, de qua sequenti & proprio capite.

CAPVT IV.

DE VENIS HÆMORRHOIDALIBVS.

Hæmorrhoides quid.

VENÆ HÆMORRHOIDALES sunt, quæ in ano vel recto intestino adsunt, & extrinsecus etiam conspiciuntur, quæ in nonnullis viris statim temporibus aperiuntur spontè & sanguine crassioris sit evacuatio sanitati multum conducens.

*Aliorum
Anatomico
rum error.*

Sunt hæ venæ non unius generis, veteres & recentiorum etiam plurimæ putarunt: sed aliæ internæ dictæ, quæ *Venæ portæ* oriuntur, aliæ externæ à *vena cavâ*.

Internas solas noverunt veteres, tamen quam in melancholicis & splenicis morbis commendatas: & aperiri possunt circa podicem, vel ijs hirudines moveri, cum aliàs venæ portæ intus lata

atentis rami nulli ad cutim exeant, qui
acidi queant.

Differunt inter sese venæ hæmorrhoidales internæ & externæ.

I. Ortu. Nam *oritur interna*, uti supra dictum, ex venâ portæ, & secundum coli finem sub recto intestino descendit, cujus terminum seu anum aliquot propaginibus exiguis orbiculatim amplexitur. Oritur aliquando à ramo splenico, unde vas breve. Rariùs verò quod semel observavit Casserius, ab ipso

*Differen-
tia octo ve-
narum hæ-
morrhoida-
lium inter-
narum &
externarum.*

Externa verò hæmorrhoidales oriuntur à Cavæ ramo hypogastrico.

II. In-ertione. Nam *interna* inseritur recti intestini substantiam, quæ membranosa est, sanguinemque requirebat rassiorem in liene genitum, & per venam portæ communicatum.

Externa inseruntur in musculosam coli substantiam, quippe quæ sanguinem requirebat puriorem, in epate elaboratum, & per ramos venæ cavæ adven- tum.

III. Numero. Vena *interna* una est, *externa* triplices.

IV. Contenti sanguinis qualitate. In-
ternarum

internarum sanguis est crassus & niger
 externarum tenuior, rubicundior, elaboratior.

V. *Ufu.* Internæ deplent venarum portæ, & splenis obstructions juvant; externæ deplent venam cavam, è parâimò earum evacuatio morbos sanguineos curat, capitis, thoracis &c. quod & Hippocrates in aphor. monuit: quare internæ dicuntur *Cacochymicæ* vel *cacochymicæ* mederi: externæ *plethorica* vel *plethoram* minueres.

VI. *Profusionis sanguinis copiâ.* Internarum fluxus non ita copiosus est, externarum adeò quandoq; largus, ut nimio fluxu homines interdum moriantur aut in morbos graves incidant.

VII. In *externarum* evacuatione non adest dolor & torsio ventris; alioquando etiam nullus dolor in ano; at in *internarum* fluxu affligit.

VIII. Internæ solæ descendunt non comitatæ arteriis.

Externæ cum arteriis ad musculorum ani descendunt. Unde externæ rectius dicuntur vasa hæmorrhoidalia, ut arteriæ simul includantur.

CAPVT V.

DE VEINÆ CAVÆ

TRUNCO ASCENDEN-

te, præsertim VENA

SINE PARI.

VENA CAVA item magna & MA. *Vena cava*
 XIMA veteribus dicta ob ejus ca- *quid?*
 acem cavitatem, vena est amplissima
 corporis nostri, & omnium aliarum ma-
 ter, quæ à portâ non proveniunt, ex
 patis gibbâ seu convexâ sede prodi-
 ens, unde Hippocrati *iecoraria* dicitur,
 amissis multis per superiorem epatis par-
 tem sparsis, & circa summum in unum *Eius divi-*
 collectis truncum conspicitur, qui sta- *sio in trun-*
 tim dividitur in: superiorem seu ascen- *cos ma-*
 dentem, & inferiorem seu descenden- *gnos.*
 tem.

TRUNCUS ASCENDENS | dia- *Truncus*
 phragma penetrat, & per thoracem, *ascendens*
 collum, caput & brachia disseminatur. *quid?*
 ertur autem indivisus usq; ad jugulum.
 nterea ab ea oriuntur quatuor rami.

I. **P**HRENICUS sive vena dia- *Vena dia-*
 phragmatica, utrinq; una unde etiam ra- *phragma-*
 ni ad pericardium & mediastinum mit- *is peircar-*
 untur. *dy, & me-*
diastini.

Z 2

Dein-

Deinde ascendit vena cava per
ptum, & pericardium perforans su
strorsum modicè vergit, seq; insinuat
dextrum ventriculum cordis, amplo fo
ramine, ubi undiq; dextræ auriculæ ju
gitur: ibi verò constituitur

Cordis ve-

na corona-

ria.

Valvula. I I. VENA CORONARIA, qu
aliquando gemina est, cordis basin ci
gens, ad cuius ortum posita est *valvula*
reditum sanguinis in truncum impeo
ens.

Deinde pericardium truncus asce
dens denuò perforat, & priorem for
mam, quæ sub corde erat, sed gracili
rem induens, per mediam pulmonum
divisionem (non super vertebrae tho
racis amplius, ubi jam gula & trachea
ascendit ad jugulum. Intereà gignit

III. VENA supra cor insignis
dicta, SINE PARI, quia
homine & cane communiter una est,
uno latere habitans, nec in altero co
jugem agnoscens. Gemina verò in rum
nantibus nonnullis, capris, suibus &c.

Oritur ex cavæ parte posteriore, sed
magis tamen dextrorsum, & per dex
tram thoracis cavitatem descendit: I
ovibus contra à sinistro cavæ latere oro
tur, & per sinistram descendit. In ho

min

line post ejus initium, quod est inter
 quartam & quintam vertebam thora-
 cis, nonnihil dextrorsum & extrorsum
 flectitur, usque ad octavam vel non-
 am thoracis vertebam, ubi planè in
 medio habitare incipit.

Hic truncus sine pari ad intervalla
 to inferiarum costarum mittit utrin-
 que ramos intercostales, qui per *anasto-* *Anastomo-*
ses, alicubi hinc inde junguntur, cum *ses*.
 vasis thoracicae inferioris a Basilica or-
 . Quare non semper secanda, ut
 ait Vesalius, in pleuritide dextri late-
 vena.

Propè costam octavam dividitur in
 os ramos : *Vesalius er-
 ror de secā-
 da vena in
 pleuritide.*

Unus aliquando major ad *sinistram*
 o diaphragmate ascendit, & inferitur
 odò in cavam supra vel infra emul-
 gentes, modò in ipsam emulgentem.
 namobrem pleuritici sæpe per urinas *Pleuritici
 quomodo
 per urinas*
 tice expurgantur, & puris copiam
 ngunt.

Alter *dexter* in cavam accedit, eiq; *expurgari
 queant.*
 ngitur, (rarò emulgenti) aliquando
 pra emulgentem. Sæpè ultimæ ali-
 ando primæ lumbari implantatur, *In pleuriti-
 de vane po-
 plitis sectio*
 us ratione in pleuritidis initio ve-
 poplitis aperiri potest.

Z ;

Quod cur utili.

*Error Amatus
ti Lusitani
& Hollerij
de valvulis.*

Quod verò somniant Hollerius Amatus, hanc venam in principio habere valvulas falsum est. Unde & falsum est, quod cavā evacuata, non evacuari venam sine pari, eo quod regurgitatio à valvulis prohibeatur.

IV. INTERCOSTALIS! SUPERIOR utrinque una, quæ ad quatuor superiorum costarum spacia mittitur quando *αζυγ* non ad omnia costarum interstitia ramos mittit.

CAPVT VI.

DE VENA SVBCLAVICULARI VIA EIUSQUE RAMIS ut jugularibus.

*Error aliorum
Anatomicorum.*

R Amis hætenus dictis constitutis, descendit vena cava ad claviculas, ubi suffulta, ubi dividi vulgò putatur, & in multis Anatomicorum tabulis ostenditur in quatuor partes, utrinque partem superiorem & inferiorem. Unde error ortus communis practico-

*Error practico-
rum in
vene sectione.*

scrupulosè secandi Basilicam in partibus affectibus infra collum; Cephalicam in affectibus capitis.

Sed ad claviculas dividitur truncus, non in quatuor ramos, sed in

antùm, utrinque unum, dextrum & nistrum, qui rami *subclavi* dicuntur. *liis Axillares.*

Quamobrem nihil interest in affectibus infra collum, siue Basilicam siue *Basilica an Cephalicam* feces: Nam æquè depletur *Cephalica* truncus venæ cavæ, siquidem ex una *quando sec* radice prodeunt Cephalica & Basilica. *canda.* Secari potius debet à Chirurgo magis conspicua.

In affectibus tamen capitis juvabit nonnihil magis Cephalicæ, quia in hanc inseritur ramulus à jugulari externa accedens; quod non semel in variis cadaveribus observavi.

Ex venis subclaviis oriuntur venæ tam supernæ quàm infernæ; & infernæ tam ante quam post divisionem: Ante divisionem quatuor

I. *Mammaria* (cujus tamen varius sæpè ortus) aliquando utrinque una, aliquando absque conjuge, descendens in mammas, cujus sæpe fecimus mentionem. Hæc per anastomofin aliquando jungitur cum epigastrica, sub musculis *Anastomosis* rectis abdominis.

II. *Mediastina*, quæ Mediastinum & thymum accedit.

Z 4

III. Cer-

III. *Cervicalis* pro musculis, qui vertebris incumbunt, & pro medulla spinali colli.

IV. *Muscula inferior*, pro musculis colli inferioribus, & pectoris superioribus. Oritur hæc etiam aliquando à jugulari externa.

Subclavius truncus egressus cavitatem thoracis propriè tum axillaris dicitur, & *scapularis duplex* inde oritur, pro musculis scapulæ externis & internis, & pro axillarum glandulis. Deinde axillaris dividitur in ramum superiorem seu venam Cephalicam, & inferiorem seu Basilicam, uti capite sequente de venis brachii dicetur.

Ab axillari post divisionem verò trunco Basilicæ oriuntur duæ venæ quod ob phlebotomiam in pleuritido notandum.

I. *Thoracica superior* in musculos pectori instratos, & mulierum mammas.

II. *Inferior*, (quæ aliquando ex thoracica superiore nascitur) totum thoracis latus perreptans, cujus rami per *anastomoses* junguntur, cum ramis venæ sinistri, extra thoracem prodeuntibus.

A parte superna trunci *Subclavius* vii oritur primò *Muscula superior* juxta jugulum

Anastomoses.

gularē externam in cutim & mus-
culos partis colli posterioris. De-
inde

VENÆ IUGULARES dictæ, quia *iugulares*
jugulo ad colli latera ascendunt, sunt- unde dictæ
ne vel internæ vel externæ.

Externa, quæ aliquando vel in orru vel
medio ductu duplex, sub cute sursum
repens, prospicit partibus externis capi-
bus, faciei, colli & faucium. Nam sub ra-
dice auris *dividitur in ramum* internam
interiorem. *Interior* adit musculos o-
culi, faucium, hyoidis &c. *Exterior* sub au-
glandulis suffulta bipartitur; una so-
les fertur in faciei anteriora, nasum
buccas, atque in frontis medio, cum
terioris lateris ramo juncta constitu-
venam frontis, quæ incidi solet.
altera per latus fertur ad tempora &
occiput. Interim rami hi variè in facie
et vertice miscentur.

Iugularis interna in homine ob cere-
bri copiam major est, contra verò in bru-
tis. *Apoplecta* dicitur, & ad tracheæ
atus ascendit, cui propagines mittit.
ad calvariæ basin pertingens parte po-
steriore dividitur in duos ramos. Vnus
major retrorsum fertur, cum arteriæ

Z s

Caro-

Carotidis ramo minori, per ossis occipitis foramen, quod pro sexta pari nervorum factum, & duræ matris sinum intrat. Alter minor, per tertij & quartij paris foramen ingressus in crassam Meningem absimitur.

CAPVT VII.

DE VENIS BRACHIORVM & MANVVM.

VENA AXILLARIS, uti præcedenti capite annotavimus, dividitur in initio brachij in duos ramos insignes, superiorem minorem seu venam Cephalicam & inferiorem maiorem seu Basilicam.

Superior dicitur vena humeraria, *Cubitalis inferior*, C E P H A L I C A vel capitulis, quia in capitis affectibus secari solet.

In brutis *oritur* à jugulari externa in hominibus semper ab axillari, ita ut men, ut à jugulari externa ramulus brevissimus in Cephalicam inferatur.

Fertur, superficialiter inter cutem & musculos non

per os collatam membranam & muscutorum tu-
ficam.

Ejus ramus externus funis brachii
confectus, ad carpimedium, parte infe-
core Basilicæ ramo jungitur, & deinde
externam carpi sedem conscendens,
inter digitum annularem & minimum
ergens dicitur SALVATELLA
quæ est siele Arabum, cujus illi, & ho-
liè alij sectionem in sinistra manu
contra Melancholicos affectus com-
mendant, sed frustra & absque funda-
mento.

Ramus internam Cephalicæ faciunt
eum, qui medianam constituit.

BASILICA, alijs cubiti interior,
Epatica, Iecoraria &c. quia in jecoris
affectibus secari solet: sed in sinistro
latere vocant lienarem, quod ejus sectio
commenderetur in affectibus lienis.

Sed caveant Chirurgi in ejus se-
ctione, ne nervus adjunctus lædatur, unde in Se-
de magnus cruciatus, febris, convulsio & mors.
Observatione ba-
siliæ.

Hæc vena in plures propagines dividit,
quam

quam capitalis. Sub tendine pectoralis musculi dividitur in tres ramos.

I. Fertur cum brachij nervo, quorum quartum faciunt.

II. Medius & profundus dicitur infra cubiti articulum diremptus in ramum externum & internum, parum a se invicem recedentes. Illi prospectit pollicis, indici & medio, nec non musculis manus externis. Hic cubiti ossi attensus medio, annulari, & minimo, nec non musculis manus internis.

III. Subcutaneus ad tuberculum brachij internum dividitur in ramum anteriorem & posteriorem: Hic sub ulna descendit juxta digitum minimum, ubi cum Cephalicæ ramo jungitur. Ille, dum fertur per cubitum, procreat aliam venam insignem, quæ pergit modò rectà, modò vario ductu ad carpum. Deinde dum defertur per cubitum, cum Cephalicæ ramo anteriore, sub cubiti flexura constituit venam communem, quæ dicitur

MEDIANA, Avicennæ nigra, dicitur media à situ, sæpè secatur absque periculo.

periculo, quia nullus subest nervus. Ab
 ac, vel potius à parte Basilicæ, unde
 odit Mediana, ramus mittitur, qui
 pra radiū divisus gignit propagi-
 em unam exteriorem, inter polli-
 em & indicem, quæ nonnullis *Cepha-*
a dicitur; quibusdam *ocularia*, alijs
lvatella. Alteram interiorem, inter
 edium & annularem, aliquando inter
 edium & indicem, quæ alijs est *Avi-*
nnæ siele.

Sed notandum de distributione *Variatio*
 enarum harum omnium, variari eam *venarum*
 varijs subjectis, & rarò se habere in *manus*.
 io homine atque in altero, imo e-
 fdem hominis dextra cum sinistra ra-
 concordat, sic & magnitudine in va-
 s hominibus variant.

CAPVT VIII.

DE TRVNCO VENÆ
 CAVAE DESCEN-
 dente usq; ad Crura.

[Runcus *Vene cava* ex epate pro-
 diens inferior seu DESCENDENS
 Superi-

superiora partes plures nutriente, angustior est, & indivisus comite arteria magna pergit usq; ad quartam lumborum vertebram Interea de se spargit sequentes propagines.

I. ADIPOSAS, pro renum tunica & adipe, quarum sinistra plerumq; superior.

II. EMULGENTES, ad renes breviter & obliquo ductu descendentes, exortu aliquando triplici, deducentes sanguinem ferofum ex vena cava in renes.

III. SPERMATICAS, de quibus libro primo.

IV. LUMBARES modo duas, modo tres, inter quatuor lumborum vertebra delatas. Ex his quidam scribunt observasse duas venas ascendentes, intra vertebra, utrinq; ad latus spinalis medullæ in cerebro, unde conjectantur portionem materiæ feminalis à cerebro deferri.

His constitutis truncus ad os sacrum contendens ad lumborum quartam vertebram, Aortæ, quæ antea subiecta fuit se subijcit, & dividitur in duos ramos quales dictos Ilios vel Iliacos quia super os Ilij & pubis ad crura abeunt.

Circa

Circa ipsam divisionem oriuntur
à venæ: *muscula superior* pro peritonæo
musculis lumborum atq; abdominis;
venæ, modò simplex, modò gemina,
ossis sacri medulla.

Postea bifurcatur utrinq; ramus
latus in exteriorem majorem, & inte-
riorem minorem.

Ab interiore pullulant duæ venæ:
muscula media extrinsecus, pro musculis
in coxæ exteriori sede, & cute nati-
væ; & *hypogastrica*, quæ insignis est non-
numquam gemina pro plurimis hypoga-
stri partibus, ut intestini recti musculis,
de hæmorrhoides externæ; vesica ejus-
dem collo, pene, & uteri inferiori sede
& collo. Vnde venæ, per quas virginis
& gravidis sæpè menstrua expurgan-
tur. Hic ramus, ubi cum ramo crurali in-
ter se junctus est, cessat.

Ab exteriori tres: duæ antequam
peritonæo egreditur, & una postea: pri-
ma *Epigastrica* (rarò à crurali oritur) pro
peritonæo & abdominis musculis pars
principua ascendit, sub musculis rectis
mammarias, quibus cum junguntur
sæpè circa umbilicum.

2. Pudenda

II. *Pudenda* pro partibus pudendis
in viris & fœminis, transversim ossis pubis
medium adit.

III. *Muscula* inferior pervadens &
tendicis articuli sedem, pro ejus loci mus-
culis & cute.

Postea ejus rami crurales dicun-
tur.

CAPVT IX. & VLT.

DE VENIS CRURALIBVS.

VENÆ CRURALES, uti & arteriæ
nervi transeuntes, in femoris plura
tura, frequentibus glandulis inter-
xuntur firmitatis ergo; Deinde à cru-
utrinq; oriuntur sex rami.

I. *SAPHENA* seu *mallooli*, longa
& insignis, fertur in interno cruris la-
re, cum nervo attenso inter cutim
membranam carnosam ad genu, &
tibiæ internam partem fertur ad malle-
olum internum. Atq; in pedis superio-
res partes digitos versùs, præsertim po-
cem, variè distribuitur. Hæc secatur
ca maleolum in affectibus uteri, præ-
tim in menstruorum retentione.

Ischi

ISCHIAS MINOR, huic opposi-
est. Est enim ramus ex crurali exterior
brevis: fertur extrorsum & transver-
sum in coxendicis cutim, & eius loci mu-
sculos.

I. Oritur à trunco inter musculos la-
nte, MUSCULA: ramus geminus &
signis, distributus inter musculos in fe-
more sitos.

7. POPLITEA ex duplici ramo cru-
rali misto confit, & sub cute testā poste-
rius per medium poplitis flexum excur-
rit usque ad calcem, aliquando ad mal-
leoli externi cutim. Hæc vena putatur
semper sub genu frequenter ab antiquis
secisa fuisse. Sed cum profundissima
& non videatur, putandum eam seca-
re non posse, nec fortassis esse venam po-
pliteam, præsertim cum Galenus in hu-
ius descriptione varius sit, & venam ap-
pellat modò in poplite, modò circa po-
plitem, modò ad genu, modò sub genu;
et intellexit forte venam malleoli, quæ de-
scendit ad tuberculum tibiæ internum,
descendit, & conspicua satis revera sub
genu est.

SURALIS dicitur, quæ magna vena
dividitur in ramum anteriorem mi-
norem, & anteriorem majorem, & rur-
sum

A a

sum

*Vena popli-
tis quæ.*

sum quilibet in anteriorem & interiorem. Distribuitur per suræ musculum. In pedis dorso, cum popliteæ furculæ commissus, varium illum venarum primum sub cute conspicuum constituit.

VI. ISCHIAS MAIOR partem dat rami musculis, deinde in decem propagines absimitur, singulis digitis binas tribuens.

Notanda de his omnibus: 1. Omnes ramos hos varios ad cutim furculos extrinsecus mittere, cutaneos tractos.

2. Omnes hos ramos diversimode se habere in variis hominibus, uti in Ischiis dictum; neque in eiusdem hominis pedibus, eundem semper ductum venarum esse.

3. Non adeò magnum habendum venarum delectum, etiam in venarum pedis sectione; cum omnes ex uno trunco propagentur.

LIBELLUS II.

De Arterijs.

Respondens

LIBRO II.

De Mediâ Cavitate sive
Thorace.

CAPVT I.

DE ARTERIIS IN
genere.

ARTERIA Græcis ἀρτηρία,
quod aerem vel spiritum
contineat & conseruet, *Appellatio*
antiquis, ut Hippocrati, *nes.*
Platoni & Aristoteli dice-
tur fistula pulmonis, quam etiam Hip-
ocrates arteriam magnam vocavit. Ga-
lius distinguit, & fistulam pulmonis vo-
cat asperam arteriam, nostras verò arte-
rias læves, quas Hippocrates arterias par-
vas vocat, Aristoteles modò venam
modò simpliciter aortam.

A 2 2

Est

*Arteria
quid.*

Est verò **ARTERIA** propriè acceptum organum commune, teres, oblongum, fistulæ in modum cavum: ex duplici tunica constans, ex corde prodiens, vehemens sanguini & spiritui vitali idoneum.

Efficiens est vis propria arterias generans, quæ ἀετηροποιητική dici potest.

MATERIA ex qua est semen glutinosum & magis frigidum secundum Hipp. Et hoc est principium originis.

Error Aristotelis.

Principium dispensationis, non est cerebrum, ut Pelops Galeni præceptum voluit, sed cor, ex consensu omnium Philosophorum & Medicorum. Et quidem prodeunt arteriæ ex sinistro cordis thalamo, non medio, quem sibi fingit & imaginatur Aristoteles, atque ex prodiere voluit aortam. Itaque arteria magna ex corde prodit, uti & venosa arteria, & vena arteriosa, sed hæc ex dextro vètriculo; de quibus suprà libro secundo.

Finis vel usus I. Quatenus canales sunt devehunt sanguinem & spiritum vitalem seu arteriosum in corde confectum (non enim solus spiritus absque sanguine in arteriis continetur) ad partes omnes, pro vita communicandâ seu cultate vitali, ut spiritus vitalis partibus infusus & calor natus sustineatur atque fovetur.

creatur. 2. ut spiritus animalis genere-
tur in vetriculo medullæ nobili.

Quatenus moventur seu pulsant
perpetuò; hunc usum præstant. Ut ca-
partium innatus ventiletur, refrige-
tur & attemperetur, & ita *suppurata*
doris conservetur. Hoc fit aere ratione
cui attracto in arteriarum dilatatione.
ad &, ne venarum, quibus conjungun-
t, sanguis quiescat & putrescat instar
ignantium aquarum. 2. Dum contra-
ntur, ut fuliginosum ex humoribus
catum exprimant.

Motus hic arteriarum pulsus di-
us, fit ex facultate non ipsis arteriis in-
a, sed à corde influente per tunicas ar-
tiarum, quæ excitatur deinde à spiritu
cavitate arteriarum contento. Nam *Pulsus un-*
rs arteriæ vinculo intercepta & subje- *de.*
a non movetur, donec auferatur vin-
dum. Deinde prout cor constringi-
& dilatatur, ita & arteriæ: uti patet
motâ unâ manu regioni cordis, alterâ
rpo, atque etiam ex vivi animalis se-
sione. Itaque falsissimè pronunciavit
asistratis, corde dilatato constringi
terias & contrâ.

Forma ex accidentibus patet, licet arte-
æ forma substantialis sit anima, una cū
oto.

A 2 3

Situs

Situs est profundior, sub venis, quo tiores sint.

Magnitudo satis insignis. Major pars est arteriæ descendens, minor ascendens, ob partium interiorum maiorem numerum.

Numerus paucior est, quam venarum.

Figura sunt instar canalis vel fistulæ, retes, rotundæ & longæ.

Meatus. Quædam arteriæ in intestinis terminantur, per quas fit attractio & pulsio; quædam ora habent in cutim terminata, per quæ aer externus attrahitur & fuligines expelluntur.

Membrana, uti venæ cinguntur aliquando crassa & communi à vicinis partibus. *Arteria an sentiant.* quando sunt extra viscera & musculos & tales arteriæ, quæ adjunctam habent membranam nervos recipientem, sentiunt; unde Galenus ait pulsum inflari mari, item sentire atque dolere arterias. Aliæ verò arteriæ sensu carent.

Substantia arteriarum membranosa ut distendi & comprimi possint maiorem quam venæ.

Constat verò duabus tunicis peculiaribus.

1. Exterior tenuis est, mollis & repleta uti venarum tunica.

Alia

Altera interior densa, dura & valde
assa, quintuplò videlicet crassior vena-
ta tunicâ: Vnde Herophilus dixit ar-
terias venis sextuplo crassiores, in hunc
modum, ut robur adesset in motu perpe-
tuo, & deinde ne citò evanesceret aut
vaporaret sanguis tenuis, spirituosus
vaporosus intus contentus.

Galenus tertiam addit tunicam in in-
terna superficie, telis aranearum ob te-
nitatem similem, in magnis arteriis cir-
ca originem apparentem.

*CAPVT II.**DE ARTERIÆ MA-
gnæ trunco ascendente.*

Distributio arteriarum, quæ venas fe-
rè semper comitatur, facilior erit
brevior; quia jam suprà intellecta ve-
narum disseminatio.

ARTERIA MAGNA seu crassa, alia-
rum arteriarum mater, patente orificio
ex sinistro cordis specu egreditur; ubi
intra pericardium de se progerminat ar-
teriam

Coronariam, basin cordis ambientem,
modò simplicem, modò geminam. Dein-
de capsulam cordis egressa dividitur in
truncum ascendente minorem, & de-
scendente majorem.

Aa 4

Truncus

TRUNCVS MINOR & SUPERIOR tracheæ incumbens, omnibus partibus supra cor habitantibus prospicit: & dividitur in subclavium dextrum, altius & multo ampliorem; & sinistram, humilioris & humilius ortum atque obliquius brachium accedentem.

Deinde totus truncus thymo suffusus in duas *carotides* abit seu *soporales* in pares, recta sursum tendentes.

Arteriæ *subclaviæ* antequam thoracem egrediuntur (egressæ enim *axillares* cunctur) ex parte inferiore progignunt *intercostales superiores*, ad tria vel quatuor interstitia superiorum costarum: ex parte superiore. 1. *Mammarias*. 2. *Cervicæ*. 3. *Musculas*.

Ab axillari, antequam brachium accedat, parte inferiore nascuntur *thoracæ superior, thoracica inferior, & scapular* parte superiore *humeraria*. Reliquum axillari utrinque brachium accedit.

CAPVT III.

DE ARTERIIS CAROTIDIBUS.

ARTERIÆ CAROTIDES sursum ascendunt ad caput recta secundum tracheam

Arteria cheæ latera, jugularibus internis con-
iuncta: nam internæ venæ non comitan-
tur arterias. Vbi ad fauces veniunt, ante-
quam in cranium ingrediantur, dant ra-
dices laryngi & linguæ: deinde divisio
fit in ramum exteriorem & interiorem.

Exterior gracilior prospicit buccis &
faciei musculis, deinde ad aurium radi-
cem finditur in duos ramos; *Vnus* ad au-
dis posteriora mittitur, unde rami duo
maxillam inferiorem intrantes pro la-
bio & omnibus inferiorum dentium ra-
dices dant. Alter ad tempora, frontem &
faciei musculos.

Interior ad ossis sphœnoidis sellam sub
matre rete mirabile constituit, de-
inde duram matrem pertransit, & du-
licem de se mittit propaginem. 1. *Minorem*
cum nervo optico ad oculos. 2. *Majo-*
rem ad glandulæ pituitariæ latus ascen-
dentem, & per piam matrem, cerebrique
substantiam distributam.

CAPVT IV.

DE ARTERIIS TO-
tius manus.

ARTERIA AXILLARIS per bra-
chium defertur inter musculos de-
scendens,

A a s

scendens, cum vena & nervo brachii
quem quartum faciunt.

Sub flexura cubiti dividitur in duos
ramos insignes; superiorem & inferior-
rem.

Pulsus ubi Superior secundum medium ad car-
expleretur pum recta fertur, ubi pulsum Medici ex-

I.

plorant, deinde sub annulari ligamento
progrediens, digitis pollicis, indici & me-
dio ramos invertit.

II.

Inferior ulnam percurrans ad carpum
prospicit medio & annulari & minimo
atq; ad carpum pergit, ubi arteriae me-
tum inferius perferimus, praesertim i-
macilentis, aut pulsu magno praeditis.
Sed priorem ramum melius pulsare sen-
timus, quia minus a tendinibus occult-
tur.

CAPUT V.

DE ARTERIAE MA-

gnae trunco descen-
dente.

TRUNCUS aortae DESCENDENS
major est, quia de se ramos spargit
in Ventrem medium & inferum, nec non
in crura.

In thorace vel medio ventre a trunco
majore duae arteriae prodeunt.

1. Inter

Intercostales inferiores, ad octo costarum inferiorum intervalla & vicinos musculos. Nam rarò contingit venam, ne pari habere comitem arteriam sine rari a trunco oriundam.

I. *Phrenica*, pro diaphragmate & pericardio.

Reliqua pars trunci septi fissuram penetrat, & ramos per infimum ventrem spargit, quorum alii comitantur ramos venæ portæ, alii ramos venæ cavæ. Qui comitantur ramos venæ portæ, sunt tres:

Celiaca arteria, Mesenterica superior & inferior.

CÆLIACA ita dicta, quòd plurimos ramos mittat ad ventriculum, antè prodit ex aorta, omento suffulta, & dividitur in *ramum dextrum* graciliorem, atque *sinistrum* ampliorem, qui sub ventriculi regione postica nectuntur venæ portæ in pancreate.

Dexter ad epatis cavum ascendens, & nò nihil progressus, à parte altiore generat gastricam dextram, & cisticas gemellas; Ab inferiore *ἐπιπλοὴν* dextram, intestinale, & gastroepiploin dextram, ad imitationem venæ portæ: ideò quæ ibi diximus, hic repetantur. Reliquum ex ramo dextro abit in superficiem epatis cavam.

Sinister

Sinister, vel arteria *splenica*, dextro major est, ne facile obstruatur à crassis succis, & ut sufficientem spiritum vitalem spleni impertiat. Hæc arteria splenica venæ attensa flexuoso & obliquo ductu ad splenem abit, deinde eodem modo quo vena splenica, ramos spargit.

Arteria mesaraica. *M E S E N T E R I C A S U P E R I O R* in totum ferè mesenterium distribuitur & arterias *mesaraicas* constituit, in jejunum ileo, & coli parte.

I N F E R I O R in inferiorem Mesenterii partem, colique sinistram partem.

Arteriæ verò aliæ, quæ cavæ ramo comitantur, sunt sequentes, excepta mesenterica inferiore. Nam hoc ordine procedunt rami ab arteria magna in imo Ventre 1. Cœliaca. 2. Mesenterica superior. 3. Emulgens. 4. SpermatICA. 5. Mesenterica inferior. 6. Lumbares : ex quibus duæ arteriæ putantur comitari venas deorsum ad cerebrum. 7. Muscula superior.

Postea verò *Aorta* ad ossis sacri initium venam cavam conscendit, & non amplius subjacet: ne ad os allidens in perpetuum suo motu lædatur: & hoc loci dicitur

Iliaca, ubi dispescitur in star cavæ in duos truncos iliacos, & horum quilibet in ramum interiorem minorem & e-

terio

riorem majorem, ad crus euntes.
Sed antequam crurales fiant, de se
mittunt utrinque sex propagines. *Sacram,*
itim sub bipartitione: ab interiore
trunco *musculam inferiorem, hypogastricam,*
arterias umbilicales: ab exteriori, *epiga-*
stricam & pudendam. Reliquum arteria in
crus fertur, & constituit arteris crura-
les.

CAPVT VI.

DE ARTERIIS CRU-
ralibus.

EX arteriis cruralibus utrinque con-
stituuntur hæ ARTERIÆ:

Suprà poplitem, à trunci parte exteriori,
muscula cruralis externa, ad musculos
femoris anteriores; ab interiore, *muscu-*
cruralis interna, ad musculos femoris
posteriores; & hæc ad genu cum hypoga-
stricæ ramulo miscetur.

Sub poplite oriuntur tres rami:

Primus *popliteus,* in musculos femoris
posteriores.

2. *Suralis,* qui dividitur in tibieum
exteriorem, posteriorem altum, & po-
steriorem humilem pro tibiæ musculis.

3. Reliquum absumitur in pede minor
eiusque digitis.

LIBEL.



LIBELLVS III.

De Nervis.

Respondens

LIBRO III.

De Capite.

CAPVT I.

DE NERVIS IN
genere.

*Nervi si-
gnificatio-
nes.*



NERVUS aliquando de e-
gamento dicitur ab an-
quis, aliquando de tene-
ne: Propriè verò dicitur
de organo communi d-
ferente cum spiritu animali facultates
movendi & sentiendi.

*Nervus
quid.*

Nervus itaque est organum commune
oblongum & teres, pro facultate anim-
li vectore spiritu animali in partes ded-
cenda.

Efficiens est vis nervifica.

Materia

Materia Hippocrati est seminis pars
 minosa & frigida, calefacta, non ta-
 men perusta: & Galeno est materia alba,
 & lenta. Atque hoc est princi-
 pium originis.

Principium dispensationis, vel pars,
 ignota origo nervorum immediata, est me- *Nervorum*
 dulla oblongata, prout partim est intra *principium.*
 minium, partim extra in spina. Intra
 minium oriuntur quæ vulgò dicuntur à
 cerebro oriri septem nervorum paria:
 & in spina verò triginta. Et hæc verissi-
 ma sententia non tantum ex similitudi-
 ne substantiarum medullaris & nervalis,
 sed etiam oculari experientia ratifica-

Aristoteles voluit à corde oriri, *Aristoteles*
 sequuntur Alexander, Averroes *error.*
 ponensis, qui tamen dicunt fieri hoc
 diante cerebro,

Alii voluerunt nervos nihil esse ali-
 quam venas & arterias continuatas,
 in nervos degenerantes: ut olim
 xagoras, & nostro seculo Cæsalpinus
 Reusnerus.

Erasistratus putavit à dura matre pro-

odiè cum Galeno statuunt Medici cō-
 res, alios nervos oriri à cerebro, alios
 à me-

à medullâ spinali. Quos omnes refut
αὐτοψία.

Finis & usus est, facultatem animal
 cum spiritu animali à cerebro acceptam
 instar canalium adferre ad partes

1. Sensorias, ut oculos, aures &c.
2. Motorias, ut musculos, ad motum
3. Ad omnes ferè partes; ut in genere
 sentiant & dignoscant: quæ dolorem
 ferunt.

Itaque nervi partibus inserti, dant
 vel solum sensum, vel solum motum
 vel utrumque: nec ullus motus volun-
 tarius aut sensus absque nervi fit opere
 unde nervo inciso, statim privatur
 pars sensu & motu.

Nervi mo- *Nervi ergò, inquam, dant partibus*
torij an *sensum vel motum, prout in has vel in*
sensorijs *à partes disseminantur, cum nervi ex*
differant. *sentientes aut motores non sint. Ut si*
 motus organa, musculos implantantur
 dicuntur nervi motorii; si in instrum
 ta sensus, sentientes. Item sæpè pro
 tione partis unum par nervorum & solum
 sum & motum affert. Ut sextum
 vulgò dictum nervorum cerebri, com
 municatur visceribus imi & medii vi
 tris ad sensum tactus, recurrens verò
 etus, laryngis musculis fert motum.

Idud Opticum dictum, solum sensum
at, quia in oculos implantatur. Alterum
verò par, quod mororium dicitur, & æ-
què à medulla ortum est ut prius, dat
motum, quia in musculos oculorum
ibit.

Situs nervorum securitatis gratiâ est
magis profundus quàm arteriarum.

Magnitudo varia est, pro organorum
conditione & actionum dignitate, assi-
mitate, atque magnitudine. Optici ma-
ni sunt, ob oculorum actionem talem.
sic crassissimi sunt nervi, qui ad partes re-
motas & plures mittuntur, ut artûs: me-
diocres in sensoriis; nam quia molles, i-
deo nimis tenues esse nequibant: Mini-
mè proximarum partium nervi, ut in fa-
ciei musculis.

Numero statuuntur esse vulgò triginta se-
tem paria; septem paria à cerebro, quæ
nos dicimus oriri non à cerebro, sed à
medulla oblongatâ intrâ cranium & tri-
ginta à medulla in spina. Septem verò il-
la paria nos rectiùs dicimus decem esse
paria, ut patebit sequenti capite: & ita
nos quadraginta paria nervorum facimus:
decem intra cranium orta: & triginta extra
in spina.

Priora Veteres septem tantùm fecêre

B b

& quia

De nervo-
rum nume-
ro Autoris
nova opi-
nio.

& quidem à cerebro orta, hoc versu
prehenſa:

Optica prima, Oculos mover alter
tertia guſtat,

Quartaque, Quinta audit, vaga ſeſ
eſt, ſeptima lingua.

Sed tertium par ab illis factum dupl
eſt & diſtinctum, ſic quintum eſt dupl
cuius duplicitatis unum par alii etiam
ctavum par fecere: nam Archangelus
cto ſtatuit paria, Columbus novem,
decem, ut dicetur infra.

Triginta vero paria medullæ ſpinæ
ita dividuntur, ut ſeptem ſint cer
ſeu colli, duodecim thoracis ſeu dorſi
liis undecim) lumborum quinque (aliqu
do quatuor) oſis ſacri ſex.

Hi omnes nervi ab utroque latere
ducuntur, unde dicuntur paria nervor
συζυγία, conjugia vel conjugationes.

Uſus in Me- eorum origines atque diſtinctiones
dicina hu- Medico neceſſarium eſt, ut ſciat, quin
ius doctri- ſpinæ partibus topica applicanda ſit
na. quando motus vel ſenſus vel uterq;
tur in facie, collo, manibus, muſculis
dominis, pene, podice, utero, veſicâ

Præterea quoad numerum, ſciendum
Nervus ſi- quemlibet nervum habere ſuum
ne pari. parem vel coniugem, excepto ultimo
infimo à medulla dorſali proſiliente

Fi.

Figura nervorum est oblonga, rotunda & teres, instar canalium; sed absque cavitate, fecus quàm venæ & arteriæ: *Cur nervi absque cavitate.*

omnia hæc una cum spiritu sanguinem veniunt, nervi solū spiritū absq; sanguine.

Excipit Galenus nervos opticos, quos ait cavos esse & perforatos sensibiliter *An optici nervi cavi.*que manifestè: ad quod conspiciendū

obus putat opus esse, videlicet ut 1. Animal sit magnum. 2. statim post mortem necetur. 3. Aer circumfusus clarus sit lucidus. Huic subscribit Cornelius Celsus, qui porū magis instar puncti concicū internæ nervorū cavitati tribuit.

Alii porositate melius conspicuamitant in opticis nervis elixatis.

Omni verò talem cavitationem contra alenum his nervis denegant Vesalius, Columbus, Eustachius & Coiterus, atq; experientias producunt, quibus nos subribimus.

Voluntq; cōstare nervos omnes, nullo cepto, ex multis fibris nervosis vel filamentis, sibi mutuò permembranulas cōnatis.

Substantia nervorū putatur esse triplex: interna, alba, medullaris; (per quā tanquā trū actio perficitur) à medullā cerebri, d compacta magis & densata: & externa duplex tunica: exterior durior à dura matre, & interior tenuior à pia matre.

Bb 2

Quæ

Quæ membrana idem præstant nervis
quod dura & pia mater cerebro. Causa
rum hæc substantiarum distinctio, ratio
ne magis quam sensu investigatur.

*Nervi duri
vel molles.*

Sciendum nunc non æquè duros &
molles omnes nervos esse; unde Galenus
alii nervi molles, alii duri. Illos *sensitivos*
vocat, hos *motorios*. Fiunt verò *duri*
nervi

1. *Ob productionem*, ut qui longius per-
gredi debuerint aut per durum corpus
obliquo ductu. Et quo longius à cere-
bro abeunt, eò duriores fiunt. Hinc bre-
ves nervi, ut visus, gustus, auditus, mol-
les sunt, & odoratorii mollissimi.

2. *Ob usum*. Duri enim ad motum
magis aptiores statuuntur, molles ad sensum. Vnde
sensus organa nervos molles accipi-
unt, ut nervi affici possint, & à sensibili
motu occurrente pati. Omnes verò per
motum voluntarium habentes duri

*Cur nervi
motorij du-
riores.*

accipere nervos, quia durum
agendum est magis aptum,
molle ad patien-
dum.

CAD

CAPVT II.

DE DECEM PAR-
tis Nervorum intra Cra-
nium à medullâ oblonga-
ta ortis, eorumque
progressu.

PRIMUM PAR olfactorium faci-
mus, cuius processus *mammillares* di-
cuntur. Hi verò processus satis cogniti
sunt ab omnibus: at nervi, quibus illi
adnascuntur, ponè, & firmè continuantur; ne-
que aut paucissimis.

Nervi hi circa sellam sphœnoidis ex
medulla elabuntur, & ductum, colorem,
nummum nervorum habent, quamobrem
non nervis numeramus.

Nervorum enim nomen ideo eis de-
bui non debet, quòd extra calvariam
non egrediantur, & crassam meningem;
aque postea non investiantur: alioquin
omnes reliqui nervi quàm diu intra cra-
nium sunt, non essent nervi dicendi, quod
absurdum.

Nervis his adjunctæ sunt duæ crassius-
culæ portiones vel PROCESSUS dicti,
MAMILLARES, papillares

*Processus
mammilla-
res.*

Bb 3

Numero

numero duo, albi, molles, lati, oblongi in
minibus tenuiores & minores, in br
maiores, præcipuè in canibus, & ani
libus olfactu exquisito præditis Nam

*Organum
olfactus.*

Vsus horum processuum est, ut sint
ctus vera organa, non nasus aut eius
nica.

Hi processus in anteriore cerebri
te locantur, post os colatorium, huic
dura meninge vestito faciem appon

SECUNDVM PAR, quod aliis pri
est opticum vel visorium, quia spiritus
vos ad oculos defert, Herophilus vo
poros opticos vel meatûs, quia cavi putat

Hi nervi inter decem hæc paria
maximi, crassissimi, sed aliis molliore

*Error alio-
rum de o-
pticorum
ortu.*

Oriuntur, non ut communis est opi
ex anteriore parte basis cerebri; na
ulteriùs occiput versùs quærendum
rum initium, ubi feruntur inter c
brum, & spinalis medullæ principiu
atque ex medullæ oblongatæ trunco
priorum è cerebro natorum princ
oriuntur. Hoc est, ubi medulla pro
gari incipit.

*Unio opti-
corum &
eius vera
causa.*

Paululum verò progressi, in medio
rè viâ uniuntur, supra sellam ossis sp
noidis, nō per simplicem contactum
intersectionem in homine, sed totius
substantiæ confusionem, ut minùs in

via longioris tractu ob molliciem
nantur.

stratum deinde separati exeunt extra
variā in oculorum centrum in ho-
ne, in brutis longè inferiùs, cum ad la-
a magis prospiciant.

Intra calvariam tenui tantum menin-
vestiuntur; à foraminibus verò, quæ
rtranseunt, usque ad oculos, simul
assà meninge obducuntur.

TERTIUM PAR, aliis secundum, est
motorium oculorum, priori proximum.

Oriri putatur vulgo Anatomicorum
opè primi originem à cerebro. Sed ac. *Error alio*
edit mediam capitis sedē, infra opticos *rum de*
egreditur, intercussationē faciens, & *motoriorū*

Oritur ad intimam partem principii *ortu.*

medullæ oblongatæ, ubi in ortu sic u-
rinque uniuntur hi duo nervi motorii, *Cur uno o-*
t se mutò tangant, immò continui sunt; *culo moto*
quæ causa est, quod uno oculo moto al- *moveatur*
er etiam moveatur. *& alter.*

Hoc par priori minus est & durius, atq;
visorio attensum per alia foramina calva *Cur ali-*
riæ egreditur ad musculos oculorum & *quando læ-*
palpebrarum. Rariùs ramulum mittit ad *so musculo*
musculum temporalem; unde aliquan- *temporali*
do hoc læso, læditur oculus, & e contra. *ledatur o-*
culus.

Quartum, Quintum & Sextum paria
confunduntur valdè ab Anatomicis.

B b 4

Nam

Nam alii quartum & quintum par uni-
cum faciunt, & Tertium par vocant, ex
duabus radicibus constans, quarum mi-
norem alii tertium par faciunt, qui ipsi
quintum & sextum pro unico videlicet
pro quarto iis dicto pari habent. Qui ve-
rò pro unico habent Quartum par nobis
dictum, iis est tertii paris radix minor, &
sextum par pro quarto habent. Nos hæc
omnia paria distinguimus.

Itaque QUARTUM PAR aliis, ut
Bauhino, Tertium; aliis, ut Fallopio, c-
etavum par dicitur; aliis verò ma-
tertiis paris minor radix: nam cum se-
quenti pari nihil habet commune, neque
in principio, neque in progressu cum eo
iungitur, & extra ordinem aliorum pa-
rium enascitur; aliis quidem

Ex latere initii medullæ oblongatæ,
iis ex infimâ & posteriore sede medullæ
cerebri exiguo *oritur* nervulo: deinde a-
trorsum defertur, & secundo pari atte-
sum, cum eo per commune foramen exi-
oculi orbitam subit, atque de se rami-
dat

In oculi adipem, musculum quintum
atque per foramen peculiare ossis fro-
tis ad cutim frontis exit, & palpebram
superiorem. Atque his *primus* eius rami
prospicit.

Secu-

Secundus verò musculus superioris labii, & nonnullis nasi, & ipsi labro & gingivis.

Tertius per narium cavitatem, harum nervarum.

Quartus musculi temporalis parti inferiori. Quos omnes ramos subsequentiis duabus conjugationibus tribuit Fallopius: at nostram distributionem proponunt Vesalius, Columbus, Platerus & Bauhinus.

QUINTUM PAR, aliis tertiæ conjugationis crassior radix; aliis quartæ conjugationis major radix; putatur communiter facere ad linguæ sensum seu gustum.

Hoc propè sequentem conjugationem mittitur, ex medullæ oblongatæ lateribus, statim à transitu per os sphænoides, propagò instar vitis capreoli contorta introdit: quòd aliqui putant facere ad duciem conciliandam, & cum auditorii nervi duobus ramulis unitur.

Prospicit musculus faciei, temporali, manforio buccarum, cuti faciei, gingivis & dentibus (nam horum beneficio dentes quem sensum habent, obtinent) musculo in ore latitanti, inferiori labro.

SEXTUM PAR alis quarta conjugatio, aliis quartæ conjugationis gravior radix

Originem minorem habet, priori proximam, paulò duriorem.

An sextum par idem sit cum quinto. Per commune foramen exit cum priori. Non tamen idcirco cum priori unum erit; nam & per unum foramen transeunt paria nobis dicta tertium quartum & septimum.

Fertur in palatum. Alii volunt h quoque par facere ad sensum gustus.

SEPTIMUM PAR, quod aliis octavum, aliis nonum, aliis quinti par minor portio, cum tamen peculiare par, quinto gracilius & durius, item origine & progressu distinctum à quinto.

Nam oritur paulo ante quintum dictum in medietate medullæ oblongæ, & tertium par conscendens, ad angulos interfecans, progreditur actu suo inter tertium & quartum par sursum & anteriùs latera versùs fertur.

Egreditur per foramen cum tertio quarto pari, & ferè totum in musculo oculi abducentem absimitur. Dubium verò est, quod alii dicunt, ferri in sculum temporalem, atque in eum in ore latitat.

OCTAVUM PAR aliis

mm, quod *auditorium*, proximè ad latera
riorum paulò inferiùs *oritur*. Os petro-
ram ingreditur, & *dividitur* in ramum
majorem, quem expansum tympanum
ncere volunt, & minore deorsum latum,
c si sextam cōjugationē comitari veller.

Propagines per primam & secundam
vertebram mittit ad laryngis musculos
proprios. Unde aures profundius par-
obando sicca tussicula excitatur. Putatur
liquando ramos mittere in brachium,
um quarto, quinto & sexto brachii, &
liquando in totum pedem, cum nervis
spinæ, postquam spinalem medullam
deorsum vergendo comitata est.

NONUM PAR aliis *sextum* & *va-*
gum, quia plurimis hinc inde partibus
prospicit, etiam omnibus internis in me-
dio Ventre & infimo sitis, quibus ad sen-
sum rami dantur, cum molliora sint cor-
pora, nec durioribus à spinali medulla
ortis gaudeant. Et ob longum ductum
membranis fortibus *vestiuntur*, atque par-
tibus vicinis connexæ feruntur.

Oritur hoc par paulò infra præcedens
varis fibris statim unitis.

Egreditur per foramē occipitis, per quod
ascēderat ramus major iugularis internæ:
& non procul ab egressu prospicit mu-
sculis in cervice sitis, præsertim cucullari.

Deinde

Cur in au-
rium pur-
gatione
profunda
tussicula.

Deinde descendit truncus, & connectitur cum ultimo pari, arteria Carotide & Venâ jugulari, per membranam, atque ad laryngis musculos internos transversim mittit propagines, item ad musculos hyoidis & faucium.

Mox inter Carotidem & jugularem ad tracheæ latus descendens supra jugulum utrinque dividitur in ramum anteriorem & posteriorem.

Nervi re- Exterior constituit **NERVOS RECURRENTES**, seu *vocales* dictos, quia iis lædatur animalis vox, ita ut altero præfecto semivocale reddatur animal; utroque murum. Dicuntur item *reversi*

Curvati sive *recurvi*; nam primò descendunt deinde utrinque quasi circa axin circumvolvuntur: *dexter* circa arteriam axillarem, *sinister* circa truncum arteriæ descendentem; & postea ascendunt usque ad musculos laryngis, quibus ramos numerosos impertiunt. Quæ recursio fieri debet, quia musculi laryngis capita habent non superne, sed inferne.

Itaque *Exterior dexter* sexti paris statim à divisione prospicit musculis è sternoclaviculari ortis, deinde constituto recte dextro ut plurimum ex tribus musculis reflexis & unitis, sub jugulo ob-

suè descendit, & in transitu pro tunica
 pulmonis, pleura, pericardio & corde
 ramos progerminat, & deinde stoma-
 chicum dextrum efficit, sub oesophago
 cum sinistro junctum; atque per septum
 transiens abit in orificium Ventriculi si-
 nistrum ad sinistram.

Exterior sinister eodem modo partibus,
 ut prior, prospiciens, atque recurrente
 sinistro constituto, stomachicum fini-
 trum generat, qui orificium ventriculi
 cum compare instar retis amplexatur, re-
 liquum verò janitorem accedit & jecoris
 cavum.

Interior dexter primò ad radices costa-
 rum quolibet nervo intercostali ramu-
 lum de se largitur; deinde cum arteria
 magnà septum pertransit, & infimo ven-
 tri toti prospicit, dum ad os usque sacrum
 pergit. Abit verò in tres ramos.

I. Ad Omentum contendit, à quo alii
 tres ramuli 1. ad Colon. Hinc post diu-
 turnam Colicam raucedo 2. Minimus &
 vix conspicuus ad initium intestinorum.

*Raucedinis
 post colicā
 causa.*

3. Ad ventriculi fundi partem dextram,
 superiorem Omenti membranam, epatis
 tunicam, & folliculum fellis.

II. Inferior ad renem dextrū. Hinc so-
 lent dare causam vomitus in Nephriti-
 cis.

*Cur in ne-
 phriticu vo-
 mitus.*

III. Ma-

III. Maximus ad mesenterium intesti-
na, & vesicæ dextrum latus.

Interior sinister in suo latere eodem
modo distribuitur, nisi quod loco epati
ad lienem pars abeat: Sed ab utroque
interiore aliquando propagines mittun-
tur ad uterum.

Hæc est distributio sexti vulgò dicti
paris, nobis noni.

DECIMUM & VLTIMUM PA-
nervorum intra cranium in postremum
occipite ex medulla oblongatâ jam jam
in spinâ illapsura ortû, aliis septimum est.

Hoc reliquis *durius* est, variisque pro-
dit radicibus postea unitis, & per propri-
um atque obliquum foramen cranii
greditur. Statim verò fortibus membra-
nis jungitur (non commiscetur) cum
præcedente pari, munimenti ergo. Deinde
de verò rursus sejungitur, & in lingu-
abit maxima sui parte, minimâ verò in
hyoidis & laryngis musculos.

CAPVT III.

DE NERVIS EX SPIN-
nali medulla prodeuntibus
& primò de Nervis ex Cervice,
adeoq; totius manus Nervis.

HActenus decem paria nervorum in-
tra Calvariâ ex medulla oblongatâ
ga

ita prodeuntia : sequuntur reliqua PA-
 AIA, quæ TRIGINTA, nonnunquam
 ginti novem, ab eodem principio, vi-
 licet medullâ longâ emanantia, sed
 out illa iam extra cranium IN SPINA
 orsi est, ubi *spinalis* vel *dorsalis* dicitur.

EX MEDULLA, dum IN CERVICIBUS
 oriuntur nervorum *paria*, aliis *septem*,
 aliis *octo*, in totum caput externus & mu-
 sculos vicinos disseminata.

Primum & Secundum par præ reliquis
 omnibus hoc peculiare habent, ut non
 elatere, sed partibus anticâ & posticâ pro-
 eant, ob peculiarem articulationem pri-
 mæ & secundæ vertebræ.

Primum verò par oritur inter occiput
 primamque vertebram,

Secundam par inter primam & secun-
 dam vertebram, & sic deinceps.

Primum & Secundum par disseminan-
 tur in capitis musculos, & ad aures.

Tertium & quartum in musculos gena-
 rum, item qui capiti & collo communes
 sunt.

Quintum cum quarti & sexti propagi-
 bus faciunt nervos diaphragmaticos
 asignes : & quintum cum prædictis par-
 tem retrorsum mittit, partem antrorsum
 musculos caput inclinantes, brachio-
 scapularum, & cutim ibidem.

Sextum

Sextum ad brachia & scapulæ cavum

Septimum cum vicinis duobus, nempe
sexto colli & primo thoracis jungitur
cujus præcipua portio ad brachium
cedit usque ad manus extrema.

Feruntur enim *IN BRACHIA* quatuor
vel sex paria nervorum, videlicet ex quinto
sexto & septimo cervicis paribus, item primo
& secundo paribus thoracis.

PRIMUM PAR ex quinto pari Cervicis
NERVI in Deltoidem potiss. & brachii cutis
MANVS abit, partem relinquens quæ venam
totius: merariam comitatur.

SECUNDUM crassius, per medium
cubiti & anticam partem fertur, ubi
capiti prospicit, unde cum tertio nervo
jungitur, postea deorsum vergens, su-
natorem longiorem ramulo salutat :
flexuram verò cubiti dividitur modum
duos, modo in tres ramos.

1. Superior minor, per brachii sedem
externam pergit, ad pollicis internam
primi vel secundi regionem externam

2. Medius & crassior intra cubitum
scendit oblique ad carpum.

3. Inferior, Basilicæ ramo inter-
attensus, in cutem cubiti & manus ab-
mitur.

TERTIUM cum priori jungitur,
bicipite

scapulae incipite; prospicit brachio & manus in-
tendens, nœ sedi.

QVARTVM crassissimum cum venâ
profundâ & arteria progreditur, postea
briè finditur. Prospicit autem muscu-
lucubitus extendentibus, carpo, polli-
indici & medio, musculisque digitos
endentibus.

QUINTVM priori attenuatum inter cu-
musculos, quibus providet, descen-
s, per cubiti inferiora & posteriora
nonnunquâ impingentes vel nervum
nprimantes, stuporem in digitis per-
timus) in cubiti medio bipartitur.

Vnus ramus externè per ulnam pergit
medium, annularem, & minimum.

Alter interne per ulnam pergit
er musculos digitos flectentes usque
carpum, & in eisdem partibus propagi-
mittit, quibus prior.

SEXTVM in cubiti cutim evacuatur
er cutim & membranam progredi-
entibus.

CAPVT IV.

E NERVIS THO-
racis, Dorsi & Lumbo-
rum.

X MEDVLLA IN DORSO orien-
tur paria duodecim, quibusdam unde-
cim:
Cc

cim : quæ omnia & singula ab egressu di-
viduntur in ramos majorem & minorem
quorum alter antrorsum fertur, alter re-
trorsum, ad posteriora recurvatus,

Rami anteriores mittuntur ad singula
spacia intercostalia, pro musculis inte-
costalibus, internis & externis, pro mi-
sculis thoraci incumbantibus, item prae-
oblique descendente abdominis.

Posteriores rami & minores retrorsum
abeunt ad vertebrarum spinas, inter mi-
sculos vertebrae adnatos, in quos parti-
m absumentur, partim in eos, qui ab api-
bus his spinarum oriuntur, ut in Rhom-
boidem, cucullarem &c.

Ex spinali MEDULLA, quando
LUMBORUM VERTEBRIS est, oritur
paria nervorum, aliquando quingenti, aliquando
quatuor : quæ paria *majora* sunt di-
scalibus. Et horum quodlibet dividitur
ramos anteriores & posteriores, qui parti-
tim in musculos lumborum & hypoco-
strii, partim in crura disseminantur.
Nam

I. Paretur furculum ad diaphragma
carnosas partes; deinde prospicit mus-
culis abdominis & lumborum.

II. Ramos concedit nonnullis fersa
ris & tibiae musculis, atque ex ple-
moram

orum sententia, surculum ad vasa sper-
matica.

Ad genu abit, eiusque cutim, pars
Saphænam comitatur, pars verò abit
in musculos lumbis incumbentes.

Inter lumbaria maximum est, ad
anteriores musculos femoris & tibiæ us-
que ad genu procedens,

Foramen transit, quod est inter os
coxendicis, pubis & Ilii, ramosque im-
mittit nonnullis musculis femoris, pe-
dis, collo uteri & vesicæ.

Maximi verò rami ab ultimis tribus
partibus ad crura abeunt, ut sequenti
capite dicemus.

CAPVT V.

DE NERVIS EX OS-
s Sacri Medullâ prodeun-
tibus, & de nervis to-
tius pedis.

EX MEDULLA spinali IN OSSE SA-
cro existente oriuntur quinque, a-
lis sex nervorum paria, ex quorum
quatuor superioribus, & tribus lûborum

Cc 2

infe-

inferioribus oriuntur NERVI CRURALES, inter pedes descendentes, qui in exortu instar reticuli conjuncti mox de se quatuor ramos spargunt, uti statim dicetur de nervis pedis.

Nervorum verò ossis sacri *par primum* dividitur instar lumbarium in ramum anteriorem & posteriorem. At sequenti quinq; paria aliter. Nam antequàm exiunt, utrinq; gemina sunt, & utrinq; nervus unus in anteriora & unus in posteriora excidit. Posteriores rami disseminantur ut lumbares posteriores, in paria videlicet posticas vicinas.

Anteriores tres superiores ad CRURABEUNT, duo inferiores ad musculos & vesicæ, in nonnullis ad cervicem utriusque, vesicæ & penem; Alique ad interfemineum & scrotum.

Finis porrò medullæ dorsalis *unicus* de se fundit propaginem, ideoque *si* pari dictam; aliquando verò cum *ne pari.* est. Abit in cutim inter nates & anum, atque aliquot femoris musculos.

Sequuntur jam NERVI IN CRURIBUS, qui suprà dicebantur quatuor et

Primum

Primus & *tertius* breviores sunt, & ad fe-
dentes, qui tantum perveniunt, *Secundus* longi-
us & ad tibiā quoque fertur, *quartus*
maximissimus.

PRIMVS ex tertio & quarto lum-
barum paribus conflatus, ad parvum
perforatam chancera descendens, abit in femoris
cutim & musculos, atque aliquot tibiæ,
suprà genu finitur.

SECUNDVS ex eodem loco natus,
perforatam venā & arteriā ad crus descendit,
per inguina in femur, adit femoris mu-
sculos anteriores, & circa genu spargitur.
Maximum verò insignem intus cum sa-
cræ ad malleolum demittit.

TERTIVS oritur in articulatione
quartæ & quintæ vertebræ, pubis ossis
perforatam pertransit ad aliquot superio-
res femoris, & penis, à pubis osse natos
musculos, atque ad femoris cutim in in-
line.

QUARTVS omnium est crassissimus,
maximissimus, durissimus, ficcissimus in
corpore, ex ossis sacri quatuor pari-
bus conflatus, qui prospicit cuti femo-
ris, eiusdem aliquot musculis, uti & ti-
biæ atque pedis.

Cc 3

Trun-

416 *Libellus III. De Nervis.*

Truncus verò ille magnus sub finem
steriore genu sive poplite dividitur in
mum externum & internum.

Externus ad poplitem, pedis exteriori
musculos peroneos, & externum n
leolum vergit.

Interior & major secundum tibiam
musculos pedum & digitorum, mal
lum internum, pollicem & plantam
digitis singulis duos largitur fun
los.

Quocirca ferè omnes nervi, qui in
gam tibiam, & totum pedem minor
abunt, ab hoc solo crurali maxi
mo nervo enascun
tur.

LIBI

LIBELLUS IV

& Vltimus

De Ossibus.

*Vbi simul*E CARTILAGINI-
bus & ligamentis.

STEOLGIAM tandem Ratio or-
ultimo loco, compendiosè, dinis
uti hactenus alia, explana. Cur ul-
bimus. mò de ossi-

Ultimo verò loco, quia bus agatur

notis & separatis omnibus alijs Ossa
in unum in conspectum venientia exa-
minare possumus, cum quibus

Conjungimus doctrinam de CARTI-
LAGINIBUS & LIGAMENTIS,

1. Ob substantiæ similitudinem. Proxi-
mè enim ad se invicem accedunt tres hæ
artes similes: Qs, CARTILAGO, LI-

AMENTUM, ut ratione minoris & ma-
gis tantum inter se differre videantur.

Est enim os durissimum, cartilago
autò mollior, quæ in os tamen abire

potest, uti in infantum tenellis ossibus
videre est, quæ initio cartilaginea sunt.

Cur cum
ossibus de
cartilag.
& ligam.
agatur.

Cc 4

Lga

Ligamentum cartilagine adhuc mollius est, quod & ipsum aliquando in os abiit ut in decrepitis. Hinc eandem multi tribuunt materiam ossi, cartilagini, ligamento, imò & tendini.

2. Ob loci vicinitatem. Os enim cartilago & ligamentum ut plurimum se invicem comitantur, simulque reperiuntur conjuncta. Nam ligamenti alligantur ossa, quæ ubi alligantur, circa capitula cartilaginea crusta ceu operculo obducuntur,

CAPVT I.

DE OSSIBVS IN genere.

OSSUM natura de facili innotescit, si eorum causas & accidentia ordinè proponamus.

Materia ex quâ in utero generantur ossa, Hippocrati est excrementum terreum cum pinguedine & humiditate adjecta. Aristoteli item excrementum seminale: Galeno crassior & durior pars elementinis exsiccata.

Quædam verò ossa perfectè generantur in utero, ut auditoria, quæ minimè quædam imperfectè, ut dentes & reliqua.

ad omnia, in quibus aliquid deest, vel
processus, vel appendix &c.

Deinde alia omnia ossa præter dentes
tam crescendi metam habent: den-
tes vero semper crescunt, siquidem op-
erum. Os enim ablatum alter oppositus fit longior:
quod fieri natura voluit, quia in attritu
eorum semper imminuuntur.

Materia nutrienda remota putatur, san-
guinis pars crassior, terrestrior, & veluti
crementitia per venas influens in me-
dullam, ubi in cavernis ossium excoqua-
tur. Hinc in istis cavitatibus ossium ani-
mulum nuper natorum medulla adhuc
inventa est.

Medulla

an ossium

fit alimen-

tum, an ex-

crementum.

Proxima statuitur Hippocrati & Ga-
leno medulla in ossibus contenta (qui-
bus contrarius est Aristoteles, alique
peripatetici, qui medullam excremen-
tariam potius ossium esse volunt) sicut in
cartilaginibus mucosum quod circum-
datur, proxima est nutrienda materia:
ligamentis, membranis & nervis len-
is ille humor inspersus.

EFFICIENS est vis ossifica, seu vis
ad calorem adjuvante agens.

FORMA ossis, est anima, cum toto.
unde ossa mortuorum non sunt ossa, nisi
quivocè. *Accidentia* ossium sunt figu-

Cc 5

ra va-

ra varia, soliditas, robur &c. de quibus
postea.

FINIS vel usus.

1. Esse fundamenta vel sustentacula
totius corporis, sicut columnæ vel fun-
damenta in ædibus.

2. Esse partibus nonnullis loco mun-
damenti, quæadmodum calvaria munit
rebrum.

Reptilia
cur serpent 3. Progressioni inservire, quod liquet
in cruribus. Hinc serpentes, vermes
alia reptilia, quæ cruribus carent, serpen-
tibus coguntur.

4. Privati sunt usus variorum ossium
nonnulli, de quibus in speciali ossium
historia.

Situs ossium est profundior, quia fun-
damenta sunt & stabilimenta corporis.

Magnitudine variant, pro varietate
litarum. Magna sunt ossa, tibiæ, femora
brachii, scapulæ &c. Parva auditoria,
samoidea, dentes, ossa carpi &c.

Cur ossa
plura in a-
nimali.

Numero plura sunt, non unicum, ad
tuum varietatem; & ne uno læso sta-
totum lædatur.

Monstruosum autem est, hominem
sci αὐόσεων, absque ossibus, cuius
puelluli meminit Hippocrates, man-
tudine quatuor digitorum, sed non
viventis.

N

Numerus verò omnium ossium non
idem in omnibus. Nam in pueris plu-
rimum, quæ paulatim coalescunt, & in-
teriora abeunt. Alii seorsim epiphyses
numerare possunt, & ita numerum ma-
ximam conflare. Alii omittere possunt
sesamoidea, aliaque parva, aut quæ ra-
re reperiuntur, ut in arteriis Carotidis
ossibus: & ita facit Archangelus tantum 279.
numerans: Alii communiter 304: Alii
vero, quot unius anni dies.

Figurâ variant. Alia enim sunt rotun-
da, plana, acuta, obtusa &c. ut in specie
determinetur.

Color in naturaliter constitutus est can-
didus, cum minimo rubore admixtus.

Cinguntur extrinsecus, (non intrinse-
cis) periosteo omnia ossa, exceptis den-
tibus & ossibus sesamoideis, atque sedi-
bus reliquorum ossium, quibus mutuo
articulantur. Et periosteum exquisitè sen-
sitivum: ipsa verò ossa sensu tactus carent, ex-
ceptis dentibus, quibus sensum aliquem
tribuere possumus, cum sentiant aerem,
vel aquam frigidissimam,

*Periosteum
sensitivum, non
ossa.
Dentium
sensus.*

Connexio ossium varia est. Dicitur au-
tem mutua omnium ossium coherencia
græcis σκέλετον, quasi exsiccatum cada-
ver, ἀπὸ τῆς σκέλεως ab exsiccatione.

Et

Connexio

Et hæc cohærentia vel connexio Galeno fit vel κατ' ἄρθρον vel articulum seu articulationē, vel κατ' σύμφυσιν seu colescentiam.

Galeno.

Ἄρθρον facit duplicem; διάρθρων vel per articulationem; ut sunt ἐνάρθρῳσις, ἀρθρωδία & γύγγλυμος: vel συνάρθρων, ut vult esse futuram, harmoniam & Gomphosin.

σύμφυσις porro statuitur vel sine medio, vel per medium.

Divisio connexionum Sed nos ita dividimus ossium connexiones:

ossium Austeris.

Ossa connectuntur vel per articulationem vel per σύμφυσιν.

Articulatio quid.

Articulatio cum motu est, eoque obscuro (quam alii vocant neutram seu dubiam articulationem) ut est costarum cum vertebris, item ossium carpi & pedis; vel evidenti laxo & manifesto, dicitur que

Eius species tres.

διάρθρωσις, cuius tres species:

Enarthrosis

I. Ἐνάρθρωσις, inarticulatio est, ubi signis quantitas adest; tam cavitatis recipientis, quam capituli ossis, quod recipitur: ut in articulatione femoris cum Ischio.

Arthrodia

II. Ἀρθρωδία, est ubi cavitas excipiens est superficialis, & capitulum, quod excipitur

capitur, depressum: ut est maxillæ inferioris cum osse temporum.

γύγγλυμος, cum os idem excipit
capitur, ut se invicem subintrent ossa contigua. Fitque tripliciter. *Ginglimos*

Cum idem os ab unico osse
capitur, quod vicissim excipit: ut fit in humeri cum cubito.

Cum excipit unum, & excipitur ab
alio, ut fit in vertebris. Vertebra enim
medio sedens superiorem excipit, &
inferiorem excipitur.

In modum rotæ: ut est vertebræ secundæ colli cum primâ, ubi quasi circa
unius vertebræ altera voluitur &
rotatur.

σύνφυσις seu *coalitū*, connexionem
voco, quæ fit absq; motu, & duo
ossia se invicem tangunt, vel ad se
appropinquant, ut in prioribus. *Simphysis*
quid.

Estque coalitus vel absque medio, vel
medium. *Eius species*
absque

absque medio. *medio.*

ράφη, *sutura*, ut in ossibus capitis. *Sutura.*

ἁρμονία, id est, compages ossium,
lineam simplicem; rectam, obliquâ
circularem: ut in ossibus maxillæ superioris & nasi. Ita epiphyse ferè omnes
nectuntur. *Harmonia*

ζ. γόμφωσις

Gomphosis 3. γόμφωσις, hoc est, conclavari quando os ossi infigitur instar clavi, ut dentibus videre licet.

Has tres species Galenus, & alii eum secuti, sub Synarthrosi, tanquam generis complexi sunt.

Species per medium. Per medium fit triplex etiam coalitio intercedente triplici corpore:

Synchondrosis. 1. Cartilagine, & dicitur συνχόνδρωσις ut in ossibus maxillæ inferioris, & ossibus pubis;

Synneurosis. 2. Ligamento, & dicitur συννεύρωσις Exemplum in osse coxendicis cum more.

Symphysis. 3. Carne vel musculo, & dicitur σφύψις quasi concarnatio, ut in osse hyoide cum scapulâ.

Substantia ossium dura est; sed non cum ariditate in naturaliter constituta, verum cum pinguedine splendescit.

Ossa fracta. Durities hæc quò minor, eo melius: ita quæ mesa fracta coalescere possunt, & unitiorius coalere recipere.

Callus quid, At in adultis non verè coalescunt, sed regenerantur, sed interventu alterius substantiæ ceu glutinis agglutinantur, quod callum vocant: callus verò aliquando venit præter naturam, etiam ex multâ

menti copiâ & malâ nutritione: nemo quant

quando callo osseo ita agglutinatur tres
superiores colli vertebrae, ut una videatur
aut quando prima vertebra calvariae
terminatur: atq; ij annuere & renuere ne-
queunt.

Induricies major est in nonnullis ossibus, ut
scapulae &c. Alia vero ossa molliora sunt,
ut quos spongiosum, digitorum ossa extrema &c.
Partes ossium sunt solidae vel cavae.

Cavitates aut intus adsunt, ubi medulla
est, tamen cavitates non ubiq; conspi-
ciuntur, vel extra ad articulationem, quae si
profunda sunt, dicuntur κοτύλαι, vel κο-
τύλιδες, (non κοτυληδόνες) item acetabula.
Cotyle enim antiquis fuit mensura
vuidorum, vel hemina, aliis poculi ge-
neris. Si superficiales sunt sinus, dicuntur
ὄφθαλμοι καὶ γληνοειδείς, à forma ocularium
uulgi, qui clausis palpebris apparent.

Partes ossium solidae sunt tres.

PRIMA & praecipua os dicitur, estq; pars
rissima, & in medio locari solet.

SECUNDA Graecis ἀπόφυσις dicitur,
cant item προβολήν, ἐκφύσησις &c. La-
tis dicitur processus, productio, proiec-
tionis extuberantia &c. est pars ossis non con-
cava, ut epiphysis, sed continua, protu-
rans ultra planam superficiem: quales
ultra sunt in vertebrae dorsi, item ma-
lula inferiore.

Vfus

Vsus præcipuus est ad partium, ut musculorum, ortus atque insertiones.

TERTIA ἐπίφυσις, seu appendix, adnascens, additamentum, est os ossi adnatum, per contiguitatem simplicem immediatam, quamvis non adeò plani superficie, sed nonnihil mutuò capituli sinuumque ingressu instar ginglymi, licet absque motu.

Substantia ἐπιφύσεων est rara & laxa primo ortu fere cartilaginosa; sed induratur in adultis, atque in os abit: immo in senioribus adeò unitur ἐπίφυσιν cum osse, ac si unum continuum os esset.

Extremitatibus ἐπιφύσεων cartilaginosa adponitur.

Sed non omnibus ossibus datae sunt hæ adnascentiæ: variæ tamen reperiuntur; ut in scapula, in osse tibiæ fibulæ utrinque videlicet ad genu & pedem &c. Item dens secundæ vertebrae rotator magnus, styloides appendices epiphyses sunt.

Vsus ἐπιφύσεων.

1. In medullosis ossibus esse instar opusculorum, ne effluat medulla.

2. Ad firmitatem. Nam firmior est dens, quæ latior & amplior.

3. Ut ex his ligamenta oriantur infra

capophyses dicuntur alicubi *capita*, alicubi *cervices*, alicubi *tubercula*, alibi *spinae*, alibi *mucrones*. Partes verò ad sinuum or-
 dinatas in instar labrorum prominentes, & si-
 ne profunditatem augentes, dicuntur
verrucae & labra.

CAPVT II.

DE CARTILAGINI-
bus in genere.

CARTILAGINES post ossa sunt
 partes similes durissimæ, & ferè
 eisdem cum ossibus naturæ: nam quæ
 animalia ossibus carent, illis cartilago
 ossium vicem gerit, inquit Aristote-
 les.

Differunt tamen, quod molliores sine
 ossibus, ligamentis verò duriores: Et
 nec cartilagine plurimæ in ossa pro-
 cessu temporis convertantur, non ta-
 men omnes, ut ensiformis, pubis, spina-
 rum dorsi, narium & aurium: quæ ta-
 men aliquando in senibus ossificantur.
 Deinde cartilago est absque medulla,
 osq; cavitatibus & cavernulis.

Efficiens est vis *χονδροποιτική* carti-
 ginifica.

D d

Mare

Materia eadem est Aristoteli quæ omni-
um, à quibus differre vult tantum secun-
dum magis & minus. Galeno est semina-
ta parsterrea, sed humida simul, mollis
partim viscosa & glutinosa, partim pin-
guis; sed magis viscosa quàm pinguis.

Vsus.

I. Et primarius est, motum faciliorem
reddere in iuncturis, & diuturniorem
dum partes ossium subungit, ne attri-
buantur mutuo. Hinc in quibusdam
articulis reperiuntur cartilaginee inco-
stantes duo ossa inter se articulata.

II. Partes ab injuriis externis tueri.
Non enim facile contunduntur aut rui-
puntur, siquidem duræ sunt & friabile
nec facile contunduntur aut inciduntur
quemadmodum mofles & carnosæ pa-
tes. Hinc narium & aurium extrema car-
tilaginea sunt. Hinc sterno & costis car-
tilaginee apponuntur, ad defensionem
cordis & pulmonum, atque cartilago ec-
siformis ad diaphragmatis orisque ven-
triculi tutelam.

3. Connexionem facere ossium *συν-
χόνδρωσιν* dictam.

4. Partes prominentes efficere, vel co-
vas formare; ut liquet in auribus, nari-
bus, larynge & tracheâ.

s. C.

5. Cavitates explere, præsertim in articularibus, ut patet in genu.

6. Operculi operam præstare, ut in orbitide.

7. Loco fulcri aliquid sustentare, ut faciunt cartilagine palpebrarum, quibus insiguntur.

Situs est varius, nam in diversis partibus reperiuntur cartilagine, in palpebris, ore, aure, larynge, trachea, spina, thorace, auriculis, de quibus singulis suo loco loquar.

Magnitudo itidem variat: sic &

Figurae diversae sunt, ut annularis, scutiformis, ensiformis &c.

Connexio. Aliæ cartilagine per se constituunt partes, ut nasi, Xiphoidis, xiphocostalis: aliæ connascuntur ossibus, quæ connectunt vel absque alio medio, ut in articulis pubis & sterni, vel interjectu communium ligamentorum, ut in connexione per διαρθρωσιν.

Substantia aliæ duriores sunt, ut quæ sæpe evadunt cum tempore, aliæ molles articulos colligantes, & ligamentum naturam ferè referentes, unde ἀρθρῶνδεσµὸς vocitantur.

Quamvis autem dura sit substantia tamen flexilis est & lenta; quia minus rigida siccaque quam os, deinde mucositatem circumfusam habet.

*Cartilagine
nes non sen
tiunt.*

Estque hæc substantia sensus experientia quia nervorum & membranarum confortium non agnoscit. Nec sentire debet, ne in motu, quando invicem colliduntur cartilagine; dolor causatur.

Reliqua cum ossibus conveniunt.

CAPVT III.

DE LIGAMENTIS in genere.

*Appellatio
nes.*

LIGAMENTVM vel vinculum Gr. *σύνδεσμος* dicitur. Antiqui ut Hippocrates Aristoteles & alicubi etiam Galenus vocant *nervum*, item *nervum colligamentum* quia figura & colore nervum mentitur & alioquin latè ligamenti vox recipere potest cuius parti, quæ plures colligamenta habet. Item ligamentum Galeno dicitur principium musculi, cuius pars in tendine abire putatur. Hæ omnes improprie acceptiones. Propriè dictum ligamentum jam explicabitur.

Efficiens est vis ligamentifica.

Materia est seminis pars lenta & tenax.
Sus: Corporis partes, præsertim ossa
per funiculi mutuò colligare, & ita cu-
dire; in capite, thorace, dorso & artu-
bus, ne fiat luxatio.

Ratione tenacissimæ adhæſionis di-
citur ligamentum *oriri* (cum aliàs ex se-
ne nascatur) ab osse primariò, aliàs ex
cartilagine, osse cartilaginoso vel mem-
brana: & *inferi* dicitur in os, cartilagi-
nem, musculum vel partem aliquam.
ut si mavis, inter ossa nascuntur liga-
menta, vel in ossibus.

Situs. Alia intrinsecùs sunt inter ossa ut
ligamenta cartilaginea dicta, quæ crassa
ferè rotunda; alia extrinsecùs ossibus
volvuntur, quæ tenuia & membrano-

Figura alia sunt latiora, quæ membra-
sa vocant Anatomici, ut modò di-
xi, alia longiora, quæ nervosa. Atq;
vocat ob similitudinem, non quòd
ligamentum membranosum sit aut ner-
vum. Sic membranosa dicuntur la-
ta & tenuia, quæ articulos cingunt, item
et tendinibus musculisque obvolvun-
tur.

De ;

Substan-

Substantia est solida, alba, ex sanguine
cartilagine mollior, sed durior ne
membranisque: est enim quasi media
inter cartilaginem & nervum.

Est absque cavitate, sensu & motu.
Absque sensu esse debebat: ne perpetuo
doleret in motibus; cū aliquādo longiora
vel breviora reddantur ligamenta, id est
contrahantur & extendantur,

Nam substantia hæc divisibilis est in
fibras, teste experientia & ipso Galeo
sensibiles, hoc est, sensu conspicuas.

Est verò hæc substantia alibi mollior
membraniosior, ut in omnibus ferè
ligamentis, quæ articulos in orbem
plectuntur; & in his mollior circa
meri articulum quàm circa coxendicis
adhuc mollior, ubi ambit digitorum
intermedia: Alibi verò est substantia durior
& quasi ex parte cartilaginea, unde etiam
dicuntur ibi ligamenta cartilaginea, sicut
que illa, quæ inter ossa latent, ut quæ
ex femoris capite in articulum
coxendicis.

CAP

CAPVT IV.

DE CRANIO IN
genere.

Dividimus omnia ossa sceleti, in CA. Divisio sce-
PVT, TRUNCVM, & ARTVS; leti.
verò in manus & pedes.

Compages ossium capitis dicitur CRA-
M, quod sit veluti *κράνος*, galea, aliis
& calvaria.

us & magnitudo sequuntur cerebrum.
gura alia est naturalis, alia non natu-
rali vocant, vel magis deprava-

aturalis figura rotunda est, ut capax
sed non nihil oblonga antèrius & po-
stèrius, ubi protuberat, ut cerebrum &
bellum contineat; ad latera utrin-
compressa, sed magis anteriora ver-
unde pars postica capitis capacior

figura depravata & non naturalis mul-
ex est.

Quando deest anterior capitis pro-
erantia sive projectura; & tales ho-
mines putantur insulsi & amentes ob in-
am cerebri, quod anteriore parte esse
per copiosius.

Figura Ca-
pitis depra-
vata. 1. 2.

D d 4

II. Quando

II. Quando posterior desideratur.

III. Cum utraque deficit, & fit figura rotunda. Atque has tres figuras depravatas agnoscit Hippocrates.

Quartam figuram addit Galenus, quam fingi posse putat, sed non dari, cum longitudo in latitudinem mutatur. Vesalius vero Veneriis & Bononiæ se talem observasse asserit.

Quinta addi potest etiam ex Hippocrate, acuminata, vel figura ovalis, quando caput in acutum superius ascendit, quam figuram apud quasdam gentes estimationis & generositatis locum obtinuisse monet Hippocrates, fierique potest ab obstetricibus, quando fasciæ caput in acutum comprimunt, & ita conservant, & tandem natura talia caput a parentibus in liberos transfert. Eadem talis etiam figura caputum hodie in nonnullis regionibus frequentior est quam aliis.

Alia capitis figura secundum Autorem. Sed jam adjiciemus alias figuras, quas multis craniis observavimus, præsertim in Italiâ.

VI. Cum pars lateralis dextra protuberat.

VII. Cum pars lateralis sinistra protuberat.

VIII. Cum

III. Cum anterioris projecturæ pars extra deest, & sinistra admodum prominere, magis vel minus.

. Cum pars sinistra non conspicitur anterioris protuberantiæ, prominente parte dextra.

. Cum posterioris projecturæ pars extra deest.

I. Cum sinistra.

Atque ita in universum *duodecim* figuræ capitis constituo: unam *naturalem*, & undecim *depravatas*.

Substantia Cranii ossea est, ad securitatem cerebri mollis. Sed in nuper natis mollior est, alicubi cartilaginosa & membranosa, præsertim circa suturas, & magis in mediâ atque supremâ regione caluitis: & hæc omnia ob partum facilitatem, ut nonnihil compressioni cedat. Sed est substantia cranii

1. Crassa, non tenuis, ut fortiùs externis injuriis resistat.

2. Rara, non densa 1. ne nimis ponderet 2. Ut succum pro alimêto contineat.

. Ut exhalare queant vapores.

Constat verò hæc cranii substantia ex *duplici tabulato*, pariete, squamâ, laminâ seu tabulâ. Alii *diploas* vocant: Et utraque hæc lamina *exteriùs* & *interiùs* fere po-

Dd 2

lio

luta est, lævis atque densa. Hinc apparet
crassities calvariae, cum ubique ferè du-
plex sit.

Dico ferè, quod alii non animadver-
tunt: nam in quibusdam locis cranium
est simplex, tenue & pellucidum, abs-
que mediotullio. Vnde falluntur Chirur-
gi nonnulli, qui in abstractione laminae
*Error Chi-
urgorum.* primæ putant tam diu secandum & pun-
gendum, donec sanguis exeat. Externam
laminam aliquando lues Venerica ex-
dit.

Raritas verò cranii apparet ex *medi-*
substantia inter utramque laminam, quam
mediotullum vocant. Hæc, inquam, sub-
stantia rara est, laxa, venulasque recipi-
ens: quod & Hippocrates agnovit.

Superficies cranii externa est vel interna.

Externa superior lævis est & æqualis,
inferior vel basis, aspera & inæqualis, ob
appendices & processus varios.

Interna superior concava æqualis est
nisi quod inscriptiones habet venarum
& aliquor sinus, quibus dura mater in-
nascitur: Inferior maximè inæqualis est
ob varias protuberantias.

Ubique verò per cranium *foramina* cre-
bra sunt, exigua & inordinate disposita
per

per quæ venule & arteriole transeunt ad
 vitatem ossium interiorum, & duram
 meningem. Aliquando tamen desunt.

Tandem, ut ad partes cranii veniamus, *Cranium* ex
 tendum non ex unico osse constare cal pluribus os
 sibus, ne ex uno vulnere frangatur, sed sibus con-
 pluribus; quæ per *suturas* connectun- *flatus*.
 t, de quibus sequenti capite.

Suntque alia ossa cranii, alia maxil-

CRANII ossa in adultis sunt octo, quo-
 rum duo communia sunt cranio cum ma-
 xilla superiore, nempe cuneiforme &
 congiolum; Sex verò propria sunt ossa,
 quæ cranii scutellam constituunt: V-
 nam frontis (in recens natis duo) duo sin-
 gulis, unum occipitis (infanti quatuor)
 duo temporum. Et latent in meatibus
 auditoriis alia sex ossa, utrinque tria par-
 a: malleus, incus, & stapes.

Atque ita quatuordecim sunt ossa cra-
 ii.

Usus Cranii.

Esse domicilium & propugnaculum
 cerebri aliàs mollioris.

I. Ut per illud vapores transpirent.

Ad illud facit crassities & durities, ad
 hoc raritas unà cum suturis.

CAPUT

CAPVT V.
DE SVTVRIS
Cranii.

*Caput sine
securis.*

SUTURA est connexionis species, in-
stans compagem duarum serrarum
vel vestium ex pluribus pannis laceri
compositionem.

Tales in humano capite plures sunt
rarò enim absque omni futurâ reperitur
caput, quale visum refert Aristoteles, &
hodie Helmstadii atque in Francorum
monasterio Heilbrunnensi tale mon-
stratur.

Atque eiusmodi homines externis in-
juriis caput non ita obnoxium habent, a
internis maximè, cum transpiratio su-
difficilior.

Aliquando diuturnitate & siccitate
in senibus ita coalescunt futuræ, ut vi-
adpareant; cum in junioribus interim
manifestius videantur. Aliquando cor-
nalis sola oblitterata observatur; non ve-
rò facile abolitæ temporales deprehen-
duntur, nisi omnes reliquæ prius perici-
rint.

*Error Ari-
stotelis.*

Numerus & situs futurarum idem est in
fœminâ atque in mare, contrâ quàm pu-
tauit Aristoteles; neque mutatur pro ra-
tione

one figurarum, ut voluere Hipp. & Galenus; nisi rarissime.

Sutura propria ossa nimirum cranii in-
nem connectentes, alia dicuntur *veræ*
impropria, alia *mendosæ* & *spuria*.

Vera dicuntur, quæ pectinatim coeunt,
more dentatæ serræ.

Spuria squammarum modo & imbric-
im agglutinantur; unde dicuntur
iamosæ conglutinationes, & magis
missuræ dici possunt, cum & ad
rmoniam magis accedant, quam ad
turam.

Vera tres sunt.

Anterior est, & dicitur *coronalis* 1. *Coronalis*
quod antiqui ea capitis parte coronas *sutura cur*
staverint. 2. Quia coronæ vel circulo *ita dicta.*
quomodo similis apparet:

Nam à temporibus utrinque ascendit
transversum ad summum capitis. A-
bibus *arcualis* dicitur hæc futura & *pur-*

Vsus est connectere os frontis cum os-
bus sicipitis, adeoq; ab invicem distin-
gere.

1. Huic opposita posterior est, & in-
ccipite: dicitur *λαμβδοειδής* à figurâ
ræcæ literæ Λ, aliis *ψιλοειδής*, item
ore futura,

Hæc

Hæc à basi occipitis ad utramque auram oblique ascendit, & in angulum coit. Aliquando cum occiput amplius est, vel alias, transversa sutura dividitur simplici vel gemina: aliquando duplex vel triplex sutura est, ac si trigonus minor unum minorem, vel duos minores contineret: ubi ita comprehensa dicuntur ossicula triangularia, in epilepsia commendata.

*Ossa triangularia
Cranij.*

Vsus huius futuræ est, os occipitis distinguere à temporum & sincipitis ossibus.

III. Inter has media est, *sagittalis* dicta, quia recta vel per rectam lineam inter sagittæ projicitur per longitudinem capitis inter coronalem & lambdoidalem.

Aliquando per coronalis medium frontem medium pergit usq; ad nasum præsertim in infantibus: in quibusdam etiam ossis occipitis partem secat.

Dicitur sutura hæc *virgata*, item & *stria*.

Vsus duo sincipitis ossa dividere & coniungere.

Cur squamæ. Duæ membra communiter statuuntur, quæ squamose corticales & temporales dicuntur, quæ solent, quia temporum ossa circumferuntur.

nt. Debuit autem fieri hæc connexio
tar squamarum, quia ossa tempo-
n parte inferiore crassissima nimis
nderassent, nisi superius sensim atte-
ta fuissent, & ossibus sincipitis pau-
m instat squamarum attenuatis jun-

Cæterum plures ubique in calvariâ
s reperiuntur spuria suturæ, item
monia varia, ubi ossa invicem con-
tuntur.

sis futurarum.

Ad liberam fuliginum transpiratio-
n. Hinc Hippocrates pronunciat il- *Suturarum*
homines esse sanioris capitis, qui plu- *numerus*
as futuras habent; & qui capita hæ- *bonus.*
at absque futuris, Cephalæa infestan-

Vt iis dura mater suspendatur & al-
tur, ne interiores cerebri partes cõ-
nantur.

Vt eadem dura mater emittat
fibras pro pericranio & periosteo con-
uendis.

Vt vasa alia intrò, alia foràs exci-
t, pro partium nutritione & vitâ: quæ
a Fallopius venas puppis vocat.

Ne unius ossis fractura alteri com-
nicetur.

VII. Vt

VII. Ut topica exterius applicata facilius penetrarent.

CAPVT VI.

DE OSSIBVS CRANII propriis in specie.

PRI-MUM OS est OS FRONTIS, a coronale, inuerecundum, os puppis: quod Figuram habet imperfecte circumferentiam; perfectius nimirum, ubi sutura frontali circūscribitur, imperfectius iungitur oculorum sedem.

Substantiam habet tenuiorem quam occipitis, crassiorem quam ossa sinetis.

Duplex est in recens natis, sutura gittali distinctum.

Ad nasi summum supra supercilia sunt CAVITATES vel sinus ampullari (sed non ad sunt 1. in puellulis usque ad annum: 2. In quibus facies est depressa & sima. 3. In quibus frons est dilatata ut plurimum gemini inter utrumque bulbaturum, interdum membrana viridibundis cincti & separati, corpus quoddam molliusculum & medullosum continetur.

habet hi sinus *foramina*, quæ desinunt in narium amplitudinem, & aliud quod in narium desinit, suprâ septum ossis ethmoidalis, quo olfactus organa distinguuntur.

Processus harum cavitationum.

Ad canoram reddendam vocem. Sinus hi in ijs, qui malè loquuntur, non reperiuntur.

Aliis, ut in ijs elaboretur aer ad animalis spiritus generationem.

Ut aerem odorum vehiculum per os attractum contineant, unde ad olfactus organa sensim transeat, & ad cerebrum, quod alteret, & mutatum ad sensum naturalem reducat. Unde odor non per integrum diem in narium summitate persentitur.

Aliis, ut ibi colligantur excrementa non modò crassa, sed etiam aquea, quæ in glandulam lachrymalem delata lachrymas efficiant.

Alii volunt materiam medullosam ibi contentam foramen Canthi majoris oculi transire, oculumque humectare & lubricare, ut moveatur faciliùs.

Processus habet hoc os: Unum ad oculi antrum majorem; alterum ad minorem, pro orbitæ parte superiore constituta.

E e

Fora

Foramina tria habet; unum interiùs, quo suprà, quod in cranium definit; ceteri exteriùs, ad supercilliorum medium, nervorum ad frontem transitu.

SECUNDVM & TERTIVM
sunt duo OSSA SINCIPITIS

verticis, aliis parietalia, arcualia, valis, rationis seu cogitationis Græcè γυαρος ὄστυ, quia sub ipsis cerebrum humidissimum & mollissimum est tum.

*Vulnera
sincipitis
Cur lethalia.*

Figurâ sunt quadrilatera.

Substantia rarior & infirmior quâlior, quia caput hac parte plurimè diger evaporatione: unde vulnera sincipitis lethalia.

In infantibus (hominum non brutorum) pars ea, quæ ad commissuram frontalis & sagittalis est, membranosa, peritur & mollis, & ultimò inter ossa sincipitis, in os induratur; Aristoteli quædam vocem articulatam edere puer. Hinc eo loci in pueris hiatus seu fontanella observatur, aliis fontanella dicta & pulsabilis, ubi quoque cauteria in raris catharris inurere consueverunt. Hanc partem in adultis membranosa ut in infantibus, necdum osseam facit semel tantum & quidem in viro quodam genario observavi.

apertures intus superficiales adfunt, &
insecus foramina exigua.

VARTVM OS OCCIPITIS,
basilare, os prore, os memoriae, os pxi-
Græcis ὕψος; totam ferè posticam &
internam calvaria partem constituit.

Quod in adultis communiter unicum,
in pueris duplex vel triplex, in pueris com-
muniter ex quatuor ossibus, rarius ex
tribus constare constat.

Figura est trianguli sphaerici.

Substantia est crassissima omnium &
tenuissima (quia ibi situs est Venti-
cus nobilis, & ibi quasi à fonte nervi
emanant) præsertim ad basin cranii, ni-

l latera magni foraminis, ubi tenuis-
sima est (quare rectè dixit Aristoteles, hu-

respectu hoc os esse tenuissimum,
sed Columbus taxat) ideò ad tutelam

superius medio prominentia oblonga est.
Foramina quinque habet, unum maxi-

m prope primam vertebra, per
od egreditur medulla oblongata; re-

lia minora, ad nervorum egressum,
venarum atque arteriarum ingressum.

Foramina habet novem, interius septem,
exteriorius duos.

Processus habet anteriorius ad basin du-
os (in pueris sunt epiphyfes)

cartilagine tectos, interius magis
Ee 2 eminent-

Columbus
immerito
Aristos.
taxat.

eminentes, in primæ vertebræ sinus a
capitis motum insertos. Alius processu
parvus est posterius vertebræ primæ jun
ctus.

Os trian-
gulare in
canibus.

In canum occipite aliud os est inter
cerebrum & cerebellum, quod *triangu*
lare.

QUINTUM & SEXTUM sunt ossa
TEMPORUM, ad aures, aliis ossa *lapid*
sa, *petrosa*, *saxea*, *squamiformia*, *mendos*
item aliis *parietalia*, & *arcualia*.

Figura eorum inæqualis est (magis
men circularis quàm trilatera) ob
stantiam multiplicem, quæ est instar
pium & inæqualium asperitatum; un
etiam dicuntur, ossa *petrosa*. Sed pa
superiore paulatim attenuantur, ut tra
pareant, ubi musculis temporalibus
dunt, & ossibus sincipitis squamarum
istar committuntur.

Foramina habent externa sex, inter
duo. Primum externum amplum
videlicet meatus auditorius; reliqua
igua, pro transitu vasorum.

Sinus duos. Exterior cartilagine ob
ctus maxillam inferiorem recipit. Inter
or oblongus, ossi occipitis communis

Appendicem habet quodlibet acuta
oblongam & gracilem, unde *stylus*
dicitur.

atur, *Belenoides*, *Graphioides*, *plectrum*
 Levi occasione abruptitur, unde
 in omnibus calvariis, præsertim è
 effossis adest. In adultis ossea est. in
 infantibus cartilaginea. Nonnihil cur-
 vat, ut calcar galli.

processus tres.

Externus est & obtusus, crassus, bre-
 vis & cavernosus, *mammillaris* dictus à
 mamma, uti.

Etiam externus est ossis jugalis por-

ti s⁷ enim *JUGALE* sive zygomatis *Os jugale.*
 oculo situm, non est peculiare os, sed
 duorum ossium processibus constitui-
 tur uno modò dicto, altero maxilla,
 futuram obliquam commissis, ut fiat
 si pontis forma: cuius usus, musculi
 temporalis tendinem tueri, cum alias eo
 calvaria sit tenuis.

Internus in longum protuberans, in-
 triplex cavitas adest: *tympanum*, *laby-*
rus, & *cochlea*, item ossicula auditus.
 Sed exterior meatus ante tympani
 membranam adnumeretur, quatuor e-
 unt cavitates meatus auditorii, licet Ve-
 teres unius tantum cavernæ memine-

Cavitas TYMPANVM seu *concha*, *Cavitates*
pelvis, *Aristoreli cochlea*, est statim *in ossibus.*
 Ea 3 post *petrosi.*

post membranulam tympani sita
quia aer congenitus, tria item officia
ligamentum & musculi, fenestella
aquæ ductus: & ab hac cavitate canalis
in palatum abit.

Fenestre sunt duo parva foramina
hac cavitate: *unum ovale*, in medio cavitatis
anteriorius & altius est, cui *stapedis*
incumbit, & magna ex parte clauicula
parte posteriore in cochleam se aperit
signi amplitudine, & conjungit se etiam
foramini posteriori, quod *humilius* est
homine minus atque angustius, &
in duos canales scinditur, squammâ
se a tenuissimâ divisos: uno cum *fenestella*
stellâ ovali cochleam perit, altero *labyrinthum*,
& posterior quidem canalis
dicitur *aquæ ductus*, item *meatus cochlearis*
tortuosus, cecus, capreolaris, ob tortuosum
ductum, per quem variè deducitur per
nervi auditorii major cum arteriâ.

II. Rotunda & priori minor *LABYRINTHVS* dicitur, & *fodina*, ob
multos anfractus: post fenestram ovalem
cavitate sequenti se jungit. Ab hac *membranula*
vix excurrunt, quas vocant *femicirculos* *os excavatos*,
vel *funiculos*, initio amplius
deinde sensim angustatos, tenui *membranula*
vestitos, ut soni acutiores fiat.

senfim fracti in cerei rum ascendant.
 COCHLEA dicitur, ob flexuo-
 nam circumgyrationem, aliis *cavitas co-*
eat a, buccinata, antrum buccinosum &c.
 am gyros tres vel quatuor se mutuò
 cipientes habet, & tenuissima atque
 olissima membranula succingitur.

CAPVT VII.

DE OSSIBVS AV-
ditus.

Equuntur sex alia ossa capitis, quæ
 minima, utrinque tria; *AVDITVS*
SSICVLA, dicta à formâ: *MAL-*
EVVS, INCVS & STAPES, antiquis
 anè incognita, quorum duo priora in-
 venit Iacobus Carpus, quem postea secu-
 Massa, Sylvius & Vesalius: hic verò à
 allopio monitus tertii tandem quoque
 teminit, cuius primus inventor est In-
 crassus; licet Eustachius & Columbus
 hi inventionem arrogent.

SITA sunt in cavitate prima seu con-
 cha.

Substantiam habent duram & densam,
 ntus cavam, ut leviora sint & medullam
 ro nutritione contineant, nullo perio-
 tio cinctam. In recens natis æquè perfe-
 ta sunt & magna atq; in adultis; licet nō
 ra dura, sed magis humida: unde infantes

J. 1717

F. 1717

Con-

Connexio. Malleus processu suo pertinaciter adhæret membranæ tympani ultra medium, instar reflexæ caudæ, cuius caput incudis cavitati inarticulatur, parvum habens processum, ut muscoli tendendo applicetur.

Incus molarem dentem referens malleo subjacet, habens infernè duos processus: unum breviorē, ossi squamoso innitentem, alterum longiorē sustententem verticem stapedis sive ossis angularis, quod cochleæ insistit, dum bisi latiusculā fenestræ ovali immergetur.

Tria hæc ossicula ligamento tenuissimo junguntur, quod toti membranæ, nervus tympano bellico, circumtenditur.

*Auditus
quomodo
fit.*

Vsus ossiculorum est: Non quod invicem percussa strepitum edant, sed ut species soni excepta ad inferiora permeet, & aurium excrementis via pateat. Nam stapes fenestram ovalem seu superiorem claudens, ab incude movetur (unde aperitur fenestra, ut species soni in nervum transmittatur, & excrementa per canaliculum cartilagineum repurgentur) incus à malleo, malleus à membranula tympani aëris externi appulsu percussa (quæ

in intro pellatur, malleus propugna-
 (io est) quod dum fit, intro pellitur
 & gibba redditur, unde aer congeni-
 tificatur: qui per cochleam errans
 fit, ut nervi auditorii propagines so-
 lum species per fenestellas delatas
 recipiant, & cerebro subministrent. At-
 ita malleus tantum intro commove-
 In recursu verò extrorsum movetur,
 in membrana tympani, a musculo illo
 minimo, à Caslerio invento.

CAPVT VIII.

DE OSSIBVS CAPI.

& maxillæ superiori com-
 munibus, Cuneiformi
 & spongio-
 so.

OS SPHOENOIDES seu CUNEI
 FORME dicitur à Cuneo, cuius
 formā referre volūt, antiquis πολύμορ-
 φον, *multiforme*, ob varios, quibus exa-
 peratur, intus & extra processūs: aliis os
 maxillare, os basilare, os colatorii, os palati
 &c.

Situm est in media basi capitis, & cere-
 bro instar basis substernitur, ita ut omnia
 erè capitis, & maxillæ superioris ossa
 angat.

Ecce

Os

Os unum est in adultis: at primò co
Et ex quatuor postea unitis.

Processus varii sunt.

Exteriùs duo insignes ad palati lato
Mespyocidēs aliformes, quia vesperiti
num alis assimilantur, & sinu oblon
donantur.

Interiùs quatuor parvi sunt, urrine
duo, habentes formam ephippii vel
la turcicæ, diciturq; sella sphæroidis. in c
processu quadrato & lato sinus est
glandula pituitaria excipienda.

Ad sellam antrum est foraminul
rum, ut aer inspiratus ad animalis nu
tionem elaboretur.

Foramina habet varia, pro tran
hinc inde vasorum.

OS SPONGOIDES, spongio
vel spongiforme in mediâ frontis basi
tum, & narium cavitatem opplens. d
tur etiam ἡδμοειδὲς, cribriforme vel
brosum: quia

Pars eius interior, quâ capiti jungit
multis foraminibus, cribri instar, sed
tuosis & anfractuosis, non rectis, per
est; atque hæc pars propriè est dici
debet cribrosa.

Habet in medio acutum processum, cris
galli referentem, quo tanquam septo
terminatur hoc os in duas partes

De processui superiori alius inferne
conitur nares distinguens, ubi pars os-
tius exterior est, quæ in narium ca-
te extra calvariam continetur, rara
ungosa; ubi spongiosa propriè dicitur.
Habet & aliam partem planam, tenu-
am, solidam & lævem, quæ oculorum
orbitæ committitur, cuius portiunculam
constituit, non verò maxillæ superioris
pars est, ut voluit Vesalius.

Ufus partis spongiosæ est, inspiratum cu-
loribus aerem alterare.

Ufus partem cribrosæ primarius est,

1. Ad aeris introitum pro spiritu ani-
ali generando.

2. Ut odorum species cum aere feran-
tur ad processus mammillares, olfactus
organa, quæ in hæc foramina desinunt.
Inde in Coriza, obstructo hoc osse, pe-
rit odoratus actio.

Secundarius usus est cerebri expurgatio.
Non enim tantum per glandulam pitui-
ariam ad palatum expurgatur pituita, sed
illat etiam in os cribrosum atque nares,

si superiores dicti cerebri ventricu-
li nimia pituita affluant. Cate-

rum præternaturalis
est hic fluxus.

CAPUT

CAPVT IX.

DE OSSIB VS MA
xillæ in genere.

OSSA MAXILLÆ sunt fundame
ta totius faciei, & supra os, quide
maxilla superior, infra *inferior*.

*Maxilla su
perior
quid.*

Superior enim, quam Celsus *malam*
cat, est faciei pars ossea, comprehe
dens oculorum orbitæ partem inferi
rem & laterales, nares, malas, palatum
& dentium superiorum ordinem.

Atque hæc maxilla in homine brev
ior & rotundior est, quàm in brutis, &
venustatem; item immobilis, ut & in
animalibus, exceptis psittaco, & croc
dilo fluviali:

Inferior.

Inferior verò maxilla in homine aliis
animalibus sola mobilis est, except
Crocodilo, quæ hanc cum ossibus ten
porum adeò unitam habet, ut nullo mo
do moveri queat; psittacus verò utran
que mover.

Connexio est absque motu in maxilla
superiore, per suturam vel harmoniam
cum ossibus propriis multis, ex quibus
conflatur, & aliis circumjectis ossibus
in inferiore per *συγχώνδεσιν*, quæ in
medi

olio mento est. Sed in adultis ita car-
go in os mutatur, ut unicum os esse
creatur maxilla inferior, cum antea ex
tribus confliterit.

In margine vel circuitu utriusque
maxillæ (Galenus hanc regionem vocat
τρίγων) *cavitates* occurrunt, quibus
dentes infixi, quas Galenus *σώδηρα* ap-
pellat, Latini *alveolos*, *loculos*, *fossulas*,
sepiola, *mortariola*.

Hi alvei pro radicum dentium ratione
aut modo simplices, vel triplices: ali-
quando obliterantur & constringuntur,
dentibus cadentibus vel evulsis. Aliquan-
do renascuntur & excavantur novi, a no-
vis dentibus exeuntibus. In senio non
modo amissis dentibus alvei obliterantur,
circuitus acutiores facti, durique, in
quibus ad manducandum dentium vi-
am subeant.

CAPVT X.

DE OSSIBVS MAXIL-
læ superioris propriis.

OSSA MAXILLÆ SUPERIO-
RIS PROPRIA sunt undecim,
trinque quinque, & unum est sine
vari.

PRI.

*Locus affe-
ctus in a-
gilope.*

PRIMUM ferè triangulare, constituit partem orbitæ oculi inferiorem. Canthum minorem, partemq; ossis galis & malæ.

SECUNDUM efficit Canthum majorem, ubi foramen est in nares pervium cui adstat caruncula.

Hic fiunt abscessus, quos agilope vocant, qui si imperitè tractentur aut negligantur, ad os penetrant, unde fistula lachrymales.

Est hoc os parvulum, & inter ossa maxillaria superiora minimum, tenuissimum pellucidum, laxè hærens, ut facile fragatur & deperdatur: undè rarò reperitur in calvarijs è terra effossis.

TERTIUM maximum est, unde constitutuuntur, palati maxima regio, & orbita inferior magna, dentes continens. Sæpius habet amplos, (& foramina, quæ vasa transmittunt) utrinq; & insignes, tum ad levitatem, tum ut medullam contineat pro nutritione ossium & superiorum dentium. Alijs ad producendam vocem. In pueris primum excavantur post annos aliquot, & tenui membranula succi obducuntur.

QUARTUM cum suo compari constituit partem nasi eminentiorem osse

tenue, durum, solidum & quadratum.

Suntq; externa hæc duo nasi ossa rã divisa. Internè aspera sunt, ut re-
annectantur nasi cartilagines.

Aliud interius os est (quod nasi ter-
(i) adhærens processui ossis spongio-
sod *septum narium*, quia nares distin-
dicitur.

QUINTUM ad palati extremum, u-
arium foramina ad fauces tendunt,
m est. A se invicem distinguuntur
rã palati mediã, & efficiunt amplitu-
s palati nariumq; partem posticam.
tenuia, solida & lata.

His decem addit Columbus unde-
um aratro simile, supra palatum inti-
m & medium, partem imam narium
ar septi discludens.

CAPVT XI.

DE MAXILLA
Inferiore.

MAXILLA INFERIOR in adultis
unico osse constat; in puerulis
ad

ad septimum usque annum ex duobus
per συγχώδισιν junctis.

Figura eius est Græce literæ υ vel
eus.

Substantia est durissima & validissima
ut in mordendo & manducando per
ret; intus cava, ubi medulla continetur
pro nutritione sui & dentium.

Foramina habet utrinque duo, quæ
sunt fistulæ continuæ per maxillam
runtur, ita, ut setum inditum per unum
& per alterum emissum, exire queat.

Aliud est interius posterius & maxillæ
intromittens partem nervorum nati
dicti quinti paris, ad dentium radicem
cum venulâ & arteriolâ.

Aliud est exterius, minus rotundum
per quod dicti ingressi nervi propagati
trâ emittitur ad labrum inferius.

Asperitates habet & sinus varios, ob
sculorum ortus & insertiones.

Processus item utrinque binos, com
dictos, sursum delatos.

Vnus antrorsum fertur, latus & tenuis
cuius cuspis vel acuta pars dicta
κορώνη, in quam muscoli temporales

olo implantatur. Unde inferioris ma-
le luxatio Hippocrati lethalis.

Alter posterior *retrosum* fertur, tu-
culum referens, & dicitur *κονδύλω-*
habens capitulum cartilaginea cru-
obductum, sub quo cervix oblon-

Per hunc processum fit articulatio
osse temporum, ubi adhuc alia *car-*
reponitur, inter sinum & capitu-
cartilagineum, ad faciliorem mo-
u. Obvolvitur etiam hanc articulatio-
n *ligamentum* membranofum com-
ne.

CAPVT XII.

DE DENTIBVS
IN GENERE.

EN T E S quasi edentes, Græcis *ἐδόν-*
τες quasi *ἐδόντες* dicuntur, suntq;
propriè dicta, uti alia, dura & soli-
lævia item & candida, ut alia ossa.

Habent aliqua peculiaris præ aliis
bus, quæ tamen ideò non excludunt
ab ossium numero.

i. Duriora sunt ossa quàm alia, ut
iora etiam conterere possint; & la-
bus vix cedunt, nec facilè igne cre-

*Dentes ab
alijs ossibus
quomodo
differant.*

Ff mari

mari possunt, & cum Sarcophago intra
40 dies totum corpus absumatur, den-
tes immunes à læsione manent.

2. Nudi sunt dentes, & absq; perio-
stio, nè inter manducandum doleant.

3. Et tamen sentiunt, sed magis
qualitates primas quàm secundas, & in
primis magis frigidum (unde ham-
dia sive dentium stupor) quàm ca-
dum, e contra quàm caro.

*Dentis pars
quæ sen-
tiat.* Sentit autem non totus dens, per
sed pars interior, mollior & magis in-
dulsosa; cui obvolvitur alia durior
exterior; quæ non dolet, neq; ab igne
nec à ferro: sicut in ense sub cortice
chalybis durissimo medulla ferrea in-
latet minùs dura, & ut cutis per cuti-
lam non sentientem sentit, sic pars in-
terna per exteriorem, in quam intima
cum cava sit, ingrediuntur nervuli
les, & membranulæ succingentes. Hi-
monialis quædam Patavii dentem qui
habebat præ aliis longissimum cum
cari curasset; ad deformitatis cura-
statim convulsa & epileptica decidit
parte autem dentis abscctâ nervi vo-
gium apparebat.

4. Hinc secus quàm alia ossa nervi
intrà cavitatem admittunt.

5. Dentes,

3. Longiore tempore vitæ augen-
ferè usq; ad extremum senium, quia
delicet quotidie minuuntur ex man-
uatione & attritione; sicut

*Dentes
semper au-
geri.*

Gutta cavat lapidem, non vi, sed sæ-
cadendo. Quantum ergò atterun-
t, tantum rursus augescunt. Lique-
inde: si dens aliquis decidat & non
ascatur, oppositus tantò crescit lon-
r, quantum spacium vacuum est pri-
s dentis.

Hæc considerans Fallopius uti &
bd novi dentes nasci putentur, caden-
us aliis, colligit vim formatricem in
tibus remanere vivificam, ad extre-
um usq; senium.

GENERANTUR dentes in utero,
t maxillarum generationem, in qua
et maxillâ duodecim: quatuor inci-
ii, duo canini, sex maxillares: qui
quamdiu in maxillis imperfecti latent
rum enim est statim dentatum nasci
antem) ne infans fugens papillam
lat. Unde in abortu vel infantulo
ntes exigui erui possunt.

*In utero ge-
nerari den-
tes.*

Erumpunt extrâ gingivas citius in
tis, quia citius solidiorem cibum ca-
unt: in homine mense septimo vel se-
s; & citius superiores, nonnullis citius
feriores, & in his

Ff 2

Ano

Anteriores prius: 1. Quia hi magis cuti sunt.

2. Quia minores reliquis.

3. Quia os eâ parte est tenuius.

4. Quia horum major est necessitas, & ad vocis formationem, & ad ciborum divisionem.

*Dentientes
cur egre-
scant.*

Atque eo tempore quo erumpunt dentes in infantulis, docet Hippocrates oriri febres, convulsiones & alia profluvia, maximè cum canini egrediuntur: quia dentes gingivas perforantes, plus quam stimuli in carne affligunt.

Hi dentes habent SUBSTANTIAM osseam duram & cavam partem qua erumpunt, parte verò posteriore mollem, membranâ tenui & pellucida vestitam.

*Dentes iu-
nioribus
cur & quâ-
do cadant.*

Circa septimum verò annum & octimum quartum solent alij erumpere (dentibus prioribus) in utraq; maxilla decem, quatuor incisori, duo canini & quatuor maxillares. Et priores cadunt quarto, quinto atque sexto anno quia alveoli crescunt & ampliantur unde dentes tum temporis molliores vacillant & cadunt. Si non excidunt per novos alveolos prodeunt posteriores, superius ut plurimum extra, in-

Quia intra, ac si novus esset ordo den-
 Frequentius ad latera oriuntur,
 numerum augent.

Hi vero non nascuntur de novo
 uterum: aliàs etiam nascerentur *An post ca-*
 novo membranulæ, nervi, vasa & *sum dentiũ*
 alla: sed intus in maxillis seminaria *in pueris*
 et. Observavit enim Eustachius *novi nascã-*
 Hobres nonnullos à tergo reliquorum, *tur extra*
 excidunt, remoto interstitio re- *uterum.*

nimo, quod inter utrosq; dentes
 ritur. Rarum autem est dentes re-
 post annos multos & in senectute.
 Sed nunc de dentibus in adultis ho-
 nibus agemus.

Siti sunt dentes in ambitu utriusq;
 illæ, in homine intra os conclusi,
 pro exerti.

Magnitudine cedunt aliorum anima-
 dentibus, ob oris angustiam. Et in
 mine alii majores, alii minores.

Figurâ variant. In homine triplicis
 figuræ: incisores, canini, & mo-
 es, ut dicetur in sequenti capite: In
 inantibus duplicis, incisores & mola-
 In piscibus planè acuti sunt omnes.

Superficies lævis est & æqualis:

Color candidus nitidusq;, nisi impe-
 diant negligentia, senectus & morbus.

Ff 3 Nemo

Numerus non est idem omnibus. Nam ut mittamus quæ rara sunt, videlicet quod nascantur homines uno continuo dente in superiore maxilla, ita duplici vel triplici ordine dentium, qualem in piscibus nonnullis vidi, commune est homini *unicum ordinem* dentium habere in qualibet maxilla, & in unum *viginti octo* dentes ad minimum, quando *triginta*, in superiori sedecim in inferiori quatuordecim, ut plurimum *verò triginta duos*, in qualibet maxilla decem.

Rarò vero mutatur hic numerus præterquam in molaribus, qui aliquando in quolibet latere quinque, aliquando quatuor, aliquando supra quinque, in quolibet quatuor, aut quinque in dextrâ pauciores quatuor in sinistrâ & c. contra.

Multi dentes longævitas notant.

Major autem numerus longævitas denotat, minor brevitas, ut testibus Hippocrate & Galeno. Et ratio est enim raritas & paucitas dentium la ut signum, & ut causa. Ut signum: denotat materiæ inopiam, & formæ imperitiam imbecillitatem fuisse. Ut causa: pauciores dentes cibos non rectè præparant, unde vitatur coctio prima, hanc secunda. Sed intelligendum, brevitas vitæ denotari ut plurimum.

minimâ ex parte, non semper ut rectè
statat Scaliger Exerc. 271. contra Car-
m. Nam Augustus, qui annos 76
vixit, dicitur habuisse dentes raros, pau-
& scabros.

Connexio est per γόμεσιν; nam in-
videntur in alveolis suis, quemad-
modum clavi in ligno. *Vinculis* quoq; ro-
tis, quæ radicibus adhærent, alligan-
t præsepis sive locellis suis; & dein-
cingunt *gingivæ*, de quibus supra.

Substantia exterior est solidior &
prior, non sentiens; *interior* paulò mol-
lior, sentiens, ob nervi & membranæ
ciniam, habetq; in se cavitatem, am-
plius in puerulis, & ad septimum an-
num *tenuisquama*, instar faborum apum
circumseptam, mucosq; repletam; In
adultis, resiccato humore diminutam.

Succingitur cavitas hæc tenuissimâ
membranulâ exquisitè sentiente, quæ si
humorem aliquem à cerebro defluen-
tem imbibit, dolor maximus fit denti-
am. In hac incipiunt erosiones, putre-
dines, cariesq; dolorificæ; & aliquandò
in hac vermiculi minimi generantur, ad-
modum hominem excruciantes.

Vasa ad hanc cavitatem feruntur
per foramina radicum dentium.

Ff 4

Venit

*Dentium
affectus &
dolores.*

Venule pro nutritione & augmentatione continuâ. Quæ in homine non ita manifeste (uti nec venæ tunica oculorum adnatæ) sed in bove manifestissimè conspiciuntur, & ex sanguinis asperione in sinu colliguntur.

Arteriola pro dando calore nativo. Unde ex inflammatione dolor aliquando pulsatorius fit dentium, quem Galenus in seipso expertus est. Hinc multum lucidi sanguinis ex dente perforato aliquando emanat, & nonnunquam ad mortem usque.

Nervuli molles & tenues ex quinto pari nobis dicto eò feruntur, qui per radices in cavitatem intrant, ubi intus disperguntur, & parvulis propaginibus cum substantia quadam mucosa in dente medio reperta miscentur.

Uſus dentium

Primus & primarius est ad cibos comminuendos.

II. Ad vocem formandam (hinc infantes non loquuntur, antequam oris dentibus plenum) præcipuè ad literas quasdam exprimendas, incisarii confecerunt. Hinc edentuli literas quasdam pronunciare nequeunt v. g. T. & R. ubi lingua ampliata prioribus dentibus innititur.

Vocis læsio.

soni debet. Alioquin incisiorum
 latio lædit vocis explicationem, teste
 Plinio, ut sermo tardior, & minùs cla-
 rificilisq; fiat.

III. Ad ornatum. Edentuli enim de-
 ntes sunt.

V. Homerus putat ad compescen-
 tiam garrulitatem.

V. In brutis etiam ad pugnam, ubi
 manibus utitur.

CAPVT XIII.

DE DENTIBVS
 IN SPECIE.

Divisione triplicis figuræ, situs & offi-
 cij *triplices* in homine *dentes* sunt: PRI-
 MARI, CANINI, & MOLARES.
 PRIMARI sive anteriores ab of-
 ficio in cibis incidendis dicuntur *incisores*
incisores, item *γελᾶσται*, quia inter ri-
 gum primi nudantur.

In medio, parte anteriore, reliquo-
 rum *siti* sunt, in qualibet maxilla *quatuor*
quatuor (duobusdam duo, latitudinem tamen
 quatuor habentes) acuti & lati instar gla-
 dium, caninis breviores, & simplicibus
 molibus infixi alveolis; ideò facilius ex-
 tinguunt, præsertim superiores. Succedunt
 molaresq;

FF 5

Canis

CANINI dicti, ob acutiem, duri-
ciem, & usum; nam quod superiores scin-
dere non possunt, hi confringunt. Vulgo
oculares dicuntur, non, ut quidam putant,
quod oculorum ambitum ferè attin-
gant, cum vix alarum nasi infimam par-
tem; sed, quia in eos deferitur portio ner-
vi oculos moventis, undè eorum extra-
ctio periculosa putatur.

Sunt hi dentes in qualibet maxillâ
duo, utrinq; unus, in basi lati & crassi
reliqua parte acuti. Non enim multis ca-
ninis egebat homo, cum sit animal ma-
gnæ suæ, & manibus utatur.

*Cur paucos
Caninos
homo ha-
beat.*

Infiguntur simplicibus radicibus,
primores, sed altiùs infiguntur & firmi-
us: nam radices eorum superant alias
omnes proceritate, & superioribus quo-
dam longiores radices sunt.

MOLARES dicuntur reliqui & p-
stremi, tum à figura molarum, tum
usu; quia instar molarum conterunt
bum præcisum, undè asperi & mag-
ni sunt, duri & lati. Germanis Buccarus
dentes vocantur.

Plures sunt homini quàm incisores
econtra in brutis ferocibus, quæ ad
ignam etiam utuntur dentibus acutis
Commo

Communiter sunt viginti, utrinque, in
 quolibet maxillâ quinque, quamvis nume-
 rus variet, uti supra dictum.

Ex his duo postremi dicuntur *dentes*
scientia, item sensus & intellectus, quia
 cum primum erumpunt, (subinde cum
 maximis cruciatibus, aliquando indolenter)
 quando sapere incipiunt homines, circa an-
 num vigesimum octavum vel trigesi-
 mum, aliquando in summâ senectâ; non-
 nunquam vix prominent, aliquando vix
 creantur; Latini *genuinos* vocant.

Hi dentes pluribus *radicibus* nitun-
 tur, aut binis & ternis, ut maxillares in-
 teriores, aut ternis & quaternis, ut supe-
 riores, quæ plures habent radices.

1. Quia aliàs pendulæ sunt, secus
 quàm inferiores, quæ etiam gravitate
 suâ incumbunt.

2. Quia substantia superioris maxil-
 læ est rarior & mollior.

Atque ita prima pars sceleti, videli-
 cet caput absolutum est: sequitur

secunda pars vel TRUN-

CUS.

Cur supe-
 riores ma-
 xillares plu-
 res habe-
 ant radia-
 ces.

Transitio.

CAPUT

DE SPINA EIVSQVE VERTEBRIS IN GENERE.

IN TRVNCO vel altera parte sceleti examinandæ erunt omnes *vertebræ spinæ*, præterea *ossa Ischij, costæ, sternon, claviculae, & scapulae.*

Spinæ quid

SPINA dicitur omne id, quod à prima cervicis vertebra est usq; ad os coccygis: ita dicta, quia posterior ejus pars est spinosa seu acuta.

Partes spinæ dicuntur *σπόνδυλοι* Latine *vertebræ*, quia per eas corpus varie vertitur.

Et dividuntur hæc ossa spinæ in *vertebras colli septem, dorsi duodecim; lumborum quinq; & ossis sacri quinq; vel sex; quibus additur os coccygis.*

Excavatæ sunt omnes *vertebræ*, pro medulla spinali continenda, *plures facietæ*, non unica, tum ob motum, qui antrotrorsum & retrorsum fieri debuit, tum ne unius læsio totam spinam in consensum traheret.

Figura totius spinæ est, quod *modico introrsum* inclinet, ut *vertebræ colli*, ac susten-

contentandam gulam atq; tracheam; & modum pro trunco Aortæ & Cavæ ascendētis; *modo extrorsum*, ut dorſi, non nihil ossis ſacri: ut locus amplius pro corde, pulmonibus, veſica, ano, & ſtero.

Et hæc quidem partes magis extrorsum ſeſtuntur in ſœminis, in gratiam partus.

Figura cujuſlibet vertebræ ſuperioris & inferioris plana atq; lata eſt, ne facile luxatio, interioris rotunda, convexa & prominens, ſed in cervice latior & æqualior, ob incumbētes tracheam atque gulam. Exterioris ſeu poſterioris varijs prominentijs donatæ ſunt vertebræ.

Nam *proceſſus* in qualibet vertebra ſunt triplices.

I. *Obliqui quatuor*, duo ſuperiore partem aſcendētes, duo inferiore deſcendētes.

II. *Transverſi duo*, pro muſculorum artu & inſertione. Illi verò in cervicis vertebris ſunt lati & perforati, in dorſo aſſi, ſolidi & rotundi, exceptis undecima & duodecimâ.

III. *Acutus unus* in poſticâ parte, quæ proprie *ſpina* dicitur, & in prima vertebra eſt.

Appen-

Appendices quinque habent. Infrà & supra duas, ad ipsarum corpus; totidem in processibus transversos, & unam ad spinam extremam.

Foramen est amplissimum, in quo perbet vertebram per medium, pro medulla reservanda: deinde alia sunt foramina lateralibus, quæ minora, pro nervorum ingressu.

Vertebrae cujuslibet *substantia* internam partem crassior & fungosior: conadnascuntur *epiphyses* & *cartilagines*. Nam vertebrarum extremam, primam cervicis exceptam, appendicibus donantur, quas *cartilagines*, ut facilius moveantur; intercedunt, crassæ & molles, ita ut supra infraque habeant cartilagines, quæ in osse cervicis duriores & sicciores sunt, quia hoc os immobile.

Connectuntur vertebrae per articulationem à parte posteriore, videlicet per *γίγγλυμον*, at parte anteriore per *σύνφυσιν*, & quidem per *vincula* validissima:

Duplicia verò *ligamenta* sunt vertebrarum.

Alia superius & inferius connectuntur vertebrae, suntque *figure* lunaris, crassa, valida, fibrosa & mucosa.

Alii

Alia oriuntur ab epiphyfis tam
transversis quàm acutis, quæ membra-
ta sunt, quibus processus firmiùs alli-
antur.

CAPVT XV

DE SPINAE VERTEBRIS
IN SPECIE.

Cervicis seu COLLI VERTEBRÆ
communiter *septem* sunt; quæ præ a-
liis peculiaribus quædam habent:

I. Bifidos aliquæ habent processûs
transversos.

II. Eosq; perforatos, pro venis &
arterijs cervicalibus, in cerebrum ad-
pendentibus.

III. Spinam bifidam.

Due primæ per ligamenta junguntur
occipiti, ut firmissimè capiti adhæreant,
præ reliquis quinq; peculiare quid ha-
bent.

I. *Atlas* dicitur, quia caput sustenta-
re videtur, quod sibi incumbit, *spinâ ca-*
pituli, nè parvi duo muscoli capitis à secun-
dâ vertebra oriundi in extensione capi-
tis lædantur.

Substantiâ habet tenuiorē sed densiorē.

Exci-

*Cur prima
vertebra
spina ca-
pituli
sustentat.*

Excipit, non excipitur : unde finum l
bet cartilagine obductum, ad excipien
dum sequentis vertebræ dentem.

II. *Επισφῶδης* dicitur a vertebra
do: nam ex medio ejus corpore assurgit
appendix (alijs processus) rotunda & co
longa instar dentis canini, circa qua
caput cum primâ vertebra vertitur.

Hinc dicitur appendix illa dens; i
mò tota vertebra Hippocrati ita, di
tur, ex cuius luxatione sæpe vult fieri
anginam insanabilem.

*Angina in
sanabilis,
ex dentis
luxatione.*

Dentis superficies aliquo modo aspi
ra est, quia inde prodit ligamentum, q
occipiti alligatur; cui etiam solidum
resq; ligamentum, nervi figuram res
rens, & miro artificio contextum c
cumducitur, ne comprimatur medulla

Cum primâ verò jungitur hæc
cunda vertebra, ligamento lato in orbe
circumjecto.

III. Dicitur *ἀζων*: reliquæ nomi
carent.

Ultima cum thoracis vertebris m
gis convenit, & processum posteriore
non semper habet bifidum.

DORSI VERTEBRÆ sunt plerum
duodecim; quibus totidem costæ à quov
latere articulantur: raro una deest; rar
ùs una superest.

CRA

Crassiores sunt quàm cervicis, minus
da, & pro vasorum nutrientiũ tran-
foraminibus exiguis plenæ.

I. Antiquis dicitur λοφία, quod
aliis emineat.

II. μαχαλιςήρ, Axillaris.

Reliquæ πλευρίται costales.

Undecima ἀρρεπής, quod ejus spi-
recta sit.

Dodecima διαζωτήρ præcingens.

LUMBORUM quinq; crassissimæ
& maximæ, foraminibus crebris
via, quarum motus laxior quàm dor-
ut facilius ad terram inclinare que-
us.

Transversi processus longiores sunt,
tenuiores, exceptis prima & quinta;
næ verò crassiores sunt & latiores,
abus musculi & ligamenta dorsi ne-
antur.

I. Dicitur νεφρίτης à renibus, qui
incumbunt.

Ultimæ, quibusdam ἀσφαλίτης fir-
ans vel fulciens.

Reliqua cum reliquis conveniunt.

OS SACRUM sequitur, ita dictum, *Os sacrum*
od sit omnium in spina maximum. cur ita di-
atiqui enim magnum sacrum voca-
ctum.

Gg

Est

Est latum & immobile, dorſi ba-
constituens.

Figura est ferè trianguli. Anter-
cavum est, laeve & æquale; posterius g-
bum & asperum.

*Os sacrum
proprie non
habet ver-
tebras.*

Vertebrae ejus ita dictæ, non ob-
sum, sed similitudinem, sunt *quinq;*
liquando s. x, in puerulis facile separa-
les, in adultis ita conglutinatæ, ut uni-
os esse videantur.

Galenus os sacrum ex tribus con-
tuit ossibus; quia reliqua ossis sacri
osse coccygis comprehendit, & epiph-
sin vocat, quod alii os coccygis.

Foramina non ut in prioribus late-
lia sunt, sed antica (quæ majora, ob n-
yos ibi majores) & postica: quia ad-
tus est os Ilion.

Tribus superioribus sinus exscul-
sunt, ubi ossa illi adhærent.

Os coccygis, dictum à figu-
rostri cuculi, huic subest, ex tribus
quatuor ossibus & duabus cartilaginib-
constans. Majorem verò ossium & e-
tilaginum numerum adfuisse puto in
ero illo Danico, cui cauda exereverat.

Connexio est laxa, & in fœmi-
laxior, ut retrorsum cedere queant.

1. In excretionē majorum excretionum.

2. Partu tempore, ut amplior fiat *Os coccygis* macitas. Deinde antrorsum cedere in *laxari* positione, & spontē deinde in locum su- *test.* redire.

Tendit hoc os in viris magis introrsum, ad sustinendum intestinum rectum, in mulieribus magis extrorsum, collo collum uteri, & ut cavitas major

CAPUT XVI.

DE OSSE IN-
NOMINATO.

OS INNOMINATUM, aliis *Os COXÆ* vel *ILII*UM, ad latera ossis sacri est, constans ex tribus ossibus: *pubis* & *Ischio*, per cartilagines junctis, usque ad septimum annum, ut tricipiti linea distinctum appareat, sed in adultis unum.

Os ILION, quod *Ilium* intestinum contineat, est prima pars, quæ superior & latissima, sacro connexa, per *ligamentum* commune membraneum valissimū, quāvis & cartilago intercedat. *Ambitus* ejus, vel circumferentia semicircularis & inæqualis dicitur *spina*

G 2 ossis

ossis Ilii cuius pars interior cava & la-
costa dicitur, exterior in æqualibus lin-
formata *dorsum*.

Os ilion
cur in mu-
lie ribus
amplius?

Amplius est hoc os in muliere,
spina eius magis in latera educitur,
gravida uterus melius innitatur. Id
de hac parte nonnihil pręgnantes co-
queruntur, ac si divelleretur ab osse
cro & vicinis, quibus adhæret.

Ossa pubis
laxari in
partu.

Os. PUBIS vel *pectinis* est secun-
pars, media & anterior, quod os cū al-
rius lateris osse per *συνχόνδεσσι* nec
tur, id est, per mediam cartilaginem;
mulieribus duplo crassiorē & laxiore
ut dehiscere & laxari, (non dislocari
dearticulari) in partu hæc ossa queant
ad impetum infantis egredientis, un-
in modo fœtis facile hæc ossa separantur
cultro dorsi tenuis, secus quam in aliis
Deinde licet per cartilaginem jung-
tur ossa pubis, tamen duo etiam

Ligamenta habent: 1. Circulari-
ea ambiens. 2. Membraneum, quod
foramen occupat.

Magna for-
amina in
ossibus pu-
bis cur?

Tenuia sunt, & levitatis ergo ma-
mis *foraminibus* donata, in mulierib;
ampliora & capaciora, ob uteru-
& fœtum: nam processus interiores

rioriores magis extrorsum, protube-

Ossa pubis

Cum osse sacro constituunt cavitas *ampliora*
 a, quæ pelvis dicitur, in qua sunt, ve- *in mulieri-*
 bus, uterus, & pars intestinorum.

O s I S C H I O N vel coxendicis est
 alia pars, quæ inferior & exterior, in
 ea est ampla & profunda cavitas (ace-
 lulum vocant & pixidem) pro femo-
 ris capite insigni excipiendo. Cujus ca-
 vatis processus cartilagineus dicitur
 percilium.

Partes infimæ hujus ossis in mulie-
 ribus magis distant, quæ idcirco pelvim
 habent ampliorem.

Connechtur hoc os cum osse sacro,
 duplici ligamento, ex osse sacro enato:
 unum inferitur in processum coxendi-
 cis acutum; alterum posterius in ejus ap-
 pendicem, ut intestinum rectum cum
 alijs musculis sustineatur.

CAPUT XVII.

DE COSTIS.

QVemadmodum ad latera ossis sacri
 est os innominatum, ita ad latera
 vertebrarum dorsi sunt c o s t æ. Itaq;
 a sceleto ascendendo hæc modò sunt

Gg 3 expli-

explicandæ, tanquam partes laterales thoracis.

Situs costarum est in lateribus, & Græcis dicuntur *πλευραι*, eò quod latera efforment.

Figurâ arcum referunt, vel circuli segmentum minus, ut thorax capacior sit.

In exortu sunt angustiores & rotundiores, quò verò pectus magis accedunt, tantò fiunt latiores. Parte superiore crassiores sunt. Et superiores costæ magis curvæ, atque etiam breviores sunt; mediæ longiores & latiores; inferiores rursus breviores,

Superficies externa aspera est, quâ vertebris alligantur, quia inde ligamenta prodeunt alligantia: Ibi verò duobus donantur tuberculis: 1. Articulatur sinui vertebræ. 2. Iungitur vertebræ processui transverso. Sed inferiores quinque simplici junguntur tuberculo.

Interna lævis est ob *πλευράν*.

In infimâ parte sunt *sinus* secundum longitudinem pro venâ, arteriâ & nervo, qui magis apparent, quò vertebris viciniore sunt.

Admonitio

Ubi notent Chirurghi in thoracis a-
pro Chirur- pertione, quæ fit inter quintam & sex-
tis. tam

costam, faciendam sectionem à
ommo ad imum, non è contrà, ne hac
lædantur.

Connexionem habent costæ: unam
vertebris dorsi, alteram cum sterni
cartilaginibus.

Substantia est partim ossea, partim
cartilaginea.

1. Ut facilius contrahatur & disten-
datur thorax

2. Ut difficilius contingat fractura.

Ossea est, parte propè dorsum, &
parte laterali:

Cartilaginea propè & equor, cui com-
muntur.

Nam omnes costæ parte anteriore
sunt cartilaginee, instar *ἰνὸς οὐραίου*, Cartilagi-
neae in mulieribus (non viris, nisi valde *nes costæ*
viris) successu temporis ossescunt, *ram.*
mammarum molem incumbentem
facilius sustineant.

Cartilaginee superiorum duriores
sunt, quia cum ossibus sterni copulan-
tur: inferiorum molliores, quia cum
cartilaginibus committuntur. Deinde
parte posteriore qualibet cartilagine
liber, quæ vertebræ articulatur.

Numero plures sunt, ut facilius
moveatur thorax.

Ut plurimum, *Costæ car*
Gg 4 utrinque plures.

utrinque; sunt duodecim, tam in viris
quàm mulieribus. Rarò tredecim; ra-
rius undecim utrinq;. Sæpius verò unica
Adam superest. Verisimile ergo est in Adam
quot costas uno latere fuisse tredecim costas, aut in
habuerit. uno 12. costas, in altero 11.

Dividuntur costæ, ut aliæ sint *vere*
genuinæ & legitimæ; aliæ *spuriæ* adulte-
ræ & illegitimæ.

Vere costæ *quid?* *Vere* sunt septem superiores, ita di-
ctæ, quia magis circulum perficiunt, &
εἰς πόντον attingunt, cum quo perfectam
habent articulationem, & cum verte-
bris duplici tuberculo, ut supra dictum

Duæ superiores dicuntur ἀντιστροφῆς
retortæ,

Duæ sequentes εἰς σπῆλαι solidæ;

Tres reliquæ εἰς στήθος pectorales

Spuriæ co- *stæ.* *Spuriæ* dicuntur quinque inferiores
quia sunt minores, molliores, brevio-
res, nec εἰς πόντον attingunt (ut melior illi
in initio imi ventris fiat dilatatio) nec
cum eo perfectam habent articulationem,
sed cum solis vertebis connexas
quasi mutilæ in cartilagine longiores
quàm verarum finiuntur: quæ sursum
reflexæ inter se quasi conglutinatæ co-
herent, exceptâ ultimâ, quæ minima est
& nulli adhæret, ideoq; verè spuria e-

plior locus sit jecori, lieni, & intestinis superioribus distentis. Undecima & duodecima septo transverso alligantur; aliquando ultima obliqua abdominis descendenti musculo exiliaphragma connascitur; aliquando pectorij musculi, ipsum detrahentis, circumscriptionem habet.

Vsus Costarum est.

I. Ad defensionem pectoris, viscerumq; , inibi contentorum, ut cordis.

II. Ad sustentationem musculorum inspirationis, & aliquot abdominis.

CAPVT XVIII.

DE OSSE PECTORIS
SEV STERNO.

OS PECTORIS quod in anteriore thoracis parte costis incumbit & internitur, unde *sternum* dici putant, Hippocrati *σῆθος* dicitur; quæ vox tamen aliquando significat.

1. totum anteriorem thoracem.
2. ejus dolorem.
3. Os pectoris, ut hoc loco.
4. Orificium ventriculi.

*σῆθος
quid si-
gnificet.*

Gg 1

s. Car.

V. Cartilagineum ensiformem.

Alijs hoc os gladioli dicitur & ensiforme, ob formam gladij, vel potius pugionis antiquorum: est enim *convexum, longum & latum.*

Figura
sterni.

Substantia est partim ossea, sed fungosa & rubens, partim cartilaginea.

Ex ossibus constat, non uno, ut ferè in senibus conspicitur; sed pluribus, uti apparet remotis ejus membranis. In infantibus totum cartilagineum est, præter os ipsius primum. Et deinde superiora ossa citius fiunt, quam inferiora, & mediæ partes, quam extremæ, ita ut tandem octo ossa reperiantur in sterno pueri, quæ post septennium coalescunt, & pauciora fiunt, adeo ut in adultis nunc tria, nunc quatuor, nunc plura sint ossa. Sed primum & ultimum manent in adultis, ut in pueris; medijs verò coalescentibus varius ibi ossium fit numerus.

Distinguuntur hæc ossa lineis transversis, & connectuntur per *συνχόνδρωσιν*; nam interjiciuntur cartilagines ligamentorum instar.

PRIMUM Os & supremum amplius est crassiusque, planum & inæquale, superius lunatum; referens pugionis nodum ad capulum. Alij vo-

cant

unt iugulum, alij superiorem furcu-

Sinum habet utrinq; in superiore
pro claviculæ capitibus exci-
piendis, quam copulationem cartila-
ges intercedunt.

Alium verò intrinsecus in medio
culprum, ut tracheæ descendenti ce-

Secundum angustius est, & multos si-
cus habet utrinq; pro costarum cartila-
gines excipiendis.

TERTIVM adhuc minus, sed se-
cundo latius, desinit in cartilaginem quæ *Cartilago*
nuncitur *Eufoeids ensiformis*, ensiculata *Ensisformis*.
mucronata, quia instar mucronis gladij
circâ finem, acuitur. Arabibus malum
unicum seu granatum; Avicennæ epi-
tœtalis, vulgo *scutiformis*.

Est triangula hæc cartilago & oblon-
ga, in fine aliquando rotunda aliquan-
do lata, nonnunquam bifida, unde qui-
dam *furcella*, rarius duplex.

Aliquando *perforata* est ob venas mam-
marias, quas comitatur nervus.

Hæc si nimium introrsum prematur
occurvetur, subjectæ partes læduntur, epar
vêtriculus, infantesq; *ἀλγοφία* pereunt
qui

qui affectus mulierculis quibusdam dicitur cordis compressio.

Cavitas hoc in loco extrinsecus apparens dicitur *fovea vel scrobiculus cordis*.

CAPVT XIX.

DE CLAVICVLIS ET SCAPVLIS.

CLAVICULÆ κλειδοες, quod thoracem claudant, & instar clavis firmant scapulam cum sterno: Celsus *ingula* vocat a jungendo, alij *ligulas*, os *furcale furculam superiorem*.

Sitæ sunt transversim sub imo collo in pectoris summo, utrinq; una.

Figura est oblongi S. Latini hoc est ex duobus semicirculis adverso modo conjunctis, ad jugulum foris convexa, extrinsecus leviter cava, ne vasa ibi latius comprimantur. In viris verò magis incurvantur, ut minus impediatur brachii motus: in mulieribus minus; pulchritudinis ergò, cum foveæ eo in loco non ita

Foveæ circa claviculas. conspicuæ sint in fœminis atq; in viris unde & minus agiles sunt ad proijciendos lapides &c.

SUBSTANTIA crassa est, sed fistulosa

mollosa & fungosa; unde sæpè frangi-
r.

Superficies aspera & inæqualis.

Connectuntur cum scapulæ processu
superiore per cartilaginem quæ tamen
non connascitur, ut cedat nonnihil in
motibus scapulæ atq; brachij, sed tan-
quam ligamentis detinetur articulum
(complexantibus) capite lato & oblongi-
culo, & cum sterno alio capitulo jun-
guntur, ut supra dictum.

Vsus est ad varios motus brachij, quod,
quia hoc osse tanquam palo stabilitur, i-
deo facilius sursum & retrorsum move-
tur. Hinc bruta claviculis carent; exce-
ptis, simia, sciuro, mure & echino.

SCAPULÆ Os, Græcis *ομοπλά-
τη*, quod humeri latitudinem constitu-
it, barbaris *spatula*, est os latum & te-
nue, præsertim in medio, sed in proces-
sibus crassum, utrinq; unum, incumbens
superioribus costis parte posticâ instar
cuti.

*Scapula
quid.*

Figura ferè est triangularis.

Partes ejus variæ sunt. Pars internâ ca-
va est, pars externa (quæ & angulû & co-
stam habet superiorem & inferiorem)
gibba, quæ *testudo* dicitur, item *dorsum*
scapulæ. Est etiam *spina* quædam pro-
ducta.

*Eius par-
tes.*

ducta, supra & infra cavitates respiciens
quæ dicuntur *intercapulia*.

Processus habet tres:

I. Est modò dictæ spinæ extremum
& dicitur *ἀγκύλιον*, *humeri mucro*, sum-
mus humerus, quo cum clavicula jun-
gitur.

II. Minor inferior & acutus à for-
mâ nempè rostri effigie dicitur *ροεικός*
ὄν; item *ἀγχιρροειδής*, à figurâ alterius
partis anchoræ, item *στυμοειδής*. Et hoc
processu humeri os in suâ sede conti-
netur.

III. Brevissimus dicitur *αὐχὴν* cer-
vix, in cuius extremo est cavitas superfi-
cialis, in quam inferitur caput humeri
quod nè facile excidat, augetur sinus pro-
funditas crassa cartilagine, labra cinger-
te. Et per hunc processum & cavitatem
jungitur scapula cum brachio.

Epiphyses habet quinque: tres ad latum
internum, & ad basin juxta spinæ du-
ctum. Duæ *ligamenta* procreant, quæ jun-
gunt caput ejus humero, & *ἀκρομιο*
claviculæ. Undique cingunt verò articu-
lum homoplatae & brachij communia *li-*
gamenta tenuia & membranosa.

Usus scapulae.

1. Ad costarum robur:

2. A

2. Ad humeri & clavium articulationem.

3. Ad musculorum implantationem.

CAPVT XX.

DE OSSIBVS TOTIVS MANVS.

OSSA MANVS dividuntur in brachium, cubitum & extremam manum.

BRACHII Os unicum est magnum & bilalidum, longum, teres & inæquale. Pars superiorem appendicem habet vel caput magnū rotundum, cartilagine obductum, adnatum, quod cum scapulā articulatur per *σύνδεσμον*.

Interior pars cubito & radio articulatur ubi duo processus sunt; *externus* minor, cartilagine incrustatus; & *internus*, aequalius finis habens, ut forma fiat trochææ vel rotulæ, ad quā volvuntur funes, unde cubitus ginglymo junctus in acutissimum angulum flecti potest, at ultra rectam lineam non extendi.

CUBITI OSSA sunt duo, humero breviora & appendices utrinque habentia, sibi mutuò incumbētia, atque ligamento membranaceo, invicem commissa.

Primum

Primum inferius, majus & longius dicitur *ulna, cubitus*, barbaris *Focile maius* alterum superius & minus dicitur *radius* vel *Focile minus*.

ULNA partē superiore cum humero per *γίγγυλον* articulatur ideo habet. i. bīdem processus & sinus.

Processus sunt duo oblongi, & quasi triangulāres, asperi, ut ligamenta articulum validē ambiant. Dicuntur *κροῶνα* id est rostra seu glandes. *Anterior* & superior minor, humeri sinum subit: *posterior* crassior & amplior in obtusum angulum desinit, & humeri sinum posteriorem subit. Vocat Galēnus *ὠλέκρانون*, Hippocrates *ἀγκῶνα*, Latini gibberum.

In medio horum est magnus *sinus* seu cavitās, instar semicirculi, unde dicitur *σιγμαειδής*. Habet adhuc alium sinum laevem externum, lateralem, pro radii capite.

Parte inferiore articulatur cum carpi tum per mediam *cartilaginē*, tum per processum acutum, ideoq; *styloidem* dictum: unde *ligamentum* oritur, cubitum cum carpi articulo firmans.

Alterum os, *RADIVS*, obliquius est & a priori in medio nonnihil distat, ubi tenue interest *ligamentum*: Supra

verc

ulna radium excipit; infrà hîc il-
lum.

Superior ejus *pars* cum externo bra-
chii processu articulatur per *διαρθρωσις*,
unde motus pronus & supinus.

Inferior per appendicem cum carpi
osse ad maximum digitum.

Huius *superior* pars *tenuior*, *inferi-*
or *crassior*; contra quàm in priori.

MANUS EXTREMA seu *parva*
quadruplicia habet ossa: *Carpi* seu brachia-
lis, *metacarpi* seu postbrachialis, *digito-*
rum & *sesamina*.

CARPUS Arabibus *Rafetta octo* ha-
bet ossa distincta, *ἀνόρμα*, inæqualia
modum figuræ & magnitudine differen-
tia.

Primo ortu sunt cartilagines, po-
stea sunt ossa spongiosa.

Obducuntur *ligamentis cartilagineis*
validissimis, & simul constringuntur, ac
si unum os essent.

Atq; hæc ligamenta ab inferioribus
processibus radii & cubiti orta articula-
tioni inserviunt.

Alia verò sunt *ligamenta*, quæ trans-
versa, & *annuli* formam habentia, pro fir-
mandis & tuto transmittendis tendini-
bus: *Internum*, continens musculorum

H h digitos

digitos flectentium tendines, & *externum*, extendentium. Quæ vincula licet unum videantur, in plura dirimi possunt.

Ordine aliquo disponuntur ossa Carpi: nam superne quatuor sunt, radio & cubito articulata: inferne rotidem, quatuor metacarpi ossibus connexa.

METACARPIMUM vel *palma*, quatuor habet ossa (aliis quinque, qui primum pollicis inter hæc numerant) oblonga & gracilia.

Cum carpo junguntur per connectionem, quæ est motus obscuri, & per *ligamenta cartilaginea*: cum digitis per *γίγγυλμον*.

Fistulosa sunt hæc ossa medullam continentia, intus cava, foris gibbosa.

Appendices habent utrinque, quæ proprie digitos sunt capita rotunda & oblonga, digitorum sinus subeuntia. In medio ab invicem dehiscunt, ubi latent musculi dicti *inrerosseii*.

DIGITORUM OSSA sunt quindecim, in quovis digito tria. Nam primum pollicis huc annumeratur, quia laxiorem habet articulationem, quam postbrachialia.

Seriem

Seriem digitorum vocant Græci
ἀγγας, quia velut in acie stare, vi-
suntur.

Habent singuli digiti ligamenta
internâ, secundum longitudinem
canalium, quib9 invicē alligantur.

Magnitudine differunt ossa digiti.
in quo vis digito primum majus est
obando, & secundum tertio: Omnia
ad articulationē crassiora sunt, ubi
tubercula eorū dicuntur κόνδυλοι nodi.

Foris gibba sunt, intus cava & plana
apprehensionem.

Processum habent suprâ & infrâ, præter
internodii ossa, quæ suprâ non ege-
nt, ubi ungvis junguntur.

CAPVT XXI.

DE OSSIBUS TO-
TIUS PEDIS.

Sicuti & manus dividitur in tres
partes: Femur, tibiam, & extremum
pedem.

FEMUR à ferendo dictum, cō
animal ferat & sustineat, unico
constat, sed maximo & longissimo
corporis, cujus pars antica & ex-
terna magis gibba, interna & postica ma-
xima,

Hh 2

Etenim

**Admonitio
Chirurgica,**

Etenim obliquè interiora versùs genu descendit; quod notandum Chirurgis, ne in ejus fractura hunc situ invertant.

Pars superior tres habet *processus*, quæ potius epiphyses sunt, & facillè in puerilis separantur.

I. Est caput maximum & rotundum, ab appendice factum, quod in coxendicis acetabulum inseritur, & duplici *ligamento* cum coxendice nequitur: uno communi, lato, membraneo, sed fragile, casso, orbiculatim articulum ambiens; *altero*, tereti, quasi cartilagineo (si nervus esset cartilagineus) inter os moris caput & profunditatem cavitatione femoris caput excidat.

Hujus *cervix processum* habet duplicem, appendice donatum, quæ appendices facillè in infantibus divelluntur, non in adultis.

II. Est externus, qui dicitur *rotator*, habens sinu impressiones & lineas.

III. Internus, *parvus rotator*.

Quorum *usus* ad musculorum quos motus fit ortum atq; insertionem. Unde dicuntur etiam *rotatores*.

Inferior pars cum tibia per γύγγλυ-
articulatur. Nam ad genua, capite
omnino, interno crassiore, & externo
extiore atq; depressiore tibiæ, sinûs intrat,
per quæ capita spacium amplum est
similitudine pollicis.

MOLA dicta à similitudine, os ro-
tundum & latum, hoc loco imponitur,
articulationi femoris & tibiæ, ubi genu
membraneo ligamento cingitur, exce-
ditur mola. Alii *rotulam* vocant, *patellam*,
aut *molam*, *scutum*, *os scutiforme*, &c,
quod genu constituit.

Substantia ejus aliquor mensibus in
foetibus est cartilaginea, in adultis fit
ossa.

Figura est umbonis circularis: nam
in medio ejus pars crassior reddita pro-
eminet.

Innascitur & firmatur tendinibus
crassioribus muscutorum aliquot femoris.

Mobilis est. & ad faciliorem motum
ad femur cartilagine obducitur lu-
bricâ.

Ufus est: I. Articulum ibi firmare,
ne femur ad anteriora labatur & lux-
etur, atq; ita homo cadat, præsertim per
declivia ambulans, & genu multum fle-
ctens.

Hh ; II. Ad

II. Ad tendines musculorū tuende

TIBIA, pars inter genu & talum
ossibus duobus constat, ut cubitus.

Unum interius & majus totius n-
mine donatur, & *tibia* dicitur, *ἄνωγαν*,
liis *Focile manus*, *canna maior*, &c.

Parte superiore processum habet in m-
dio à femoris cavitate exceptum, & *sin-*
binos oblongos, pro femoris capitibu-
quorum sinuum profunditatem aug-
annexa per *ligamenta cartilago*, mobili-
mollis, lubrica & humore unctuofo d-
libata, in ambitu crassa, centrā versu
attenuata, unde *lunata* dicitur.

Sinus duos separat *tuberculum* ibi n-
tum, ex cuius summitate *ligamentum* re-
bustum prodiens femoris sinui infigitur.

A regione verò anticā & asperā vo-
niunt *ligamenta*, quæ *cartilagines lun-*
res augment.

Anterior ejus pars acuta & longag-
spina dicitur, ubi ossis quasi figura trian-
gularis est, & ita acuta est, ut cultri ac-
em effingat. Unde hac parte anteriore
si tibiæ os alliditur, dolor fit insignis
quia cutis vicina & periostium acut-
osse quasi cultro scinditur.

Cur ma-
gnus dolor
in lesione
antice par-
ti tibiæ.

Inf-

Inferiore parte adest processus ex carnis
interno latere, gibbus & prominens,
iuxta pedem, diciturque *malleolus inter-*
us, sicuti processus fibulae *malleolus exter-*
us.

FIBULA *περόνη*, quia tibiae muscu-
los conjungere videtur, dicitur etiam
peronea, *os minus*, *os minus* &c. Estque
os minus & tenuius, tibiae extrinsecus
attensum, ut radius cubito.

Parte superiore caput ejus rotundum,
genu non attingit, sed infra subsistit:
at parte inferiore, infra tibiā pergīt,
ideoque aequē longum, os est atque
tibia.

In medio ab invicem dehiscunt ti-
bia & fibula, ob musculos pedis ibi
locatos, quo intervallo *ligamentum mem-*
branum tenue & latum, secundum lon-
gitudinem hæc ossa jungit. Committi-
tur etiam tibiae ligamento communi su-
perius & inferius.

Inferius caput in acutum tendens
appendicem habet, quæ crassescens, gi-
gnit processum, dictum *malleolum exte-*
rum, protuberantem, illum locum
externum, excarnem ad pedem; inter-
no humiliorem.

PEDIS EXTREMI OSSA diuiduntur ut ossa manus in tres partes : in tarsum seu pedium, *metatarsum* seu metapedium & *digitos*.

TARSI ossa *septem* sunt, quorum quatuor posteriora tantum nonnulli in tarso numerant, quia tria priora in manu non habent sibi ossa similia.

I. Dicitur *ἀστέγαλον*, Latinis *Talus*, vulgò *os balistæ*, dicitur & *quattro*, à quatuor lateribus.

Basis instar subjicitur ossibus tibiæ. Iungitur enim cum tibiæ appendice per *γίγγλυμον*; unde habent ex cervice oblonga *caput* elatius orbiculare & læve, *cartilagine* obductum; in cuius medio *sinus* lævis est: unde caput utrinque fit *superciliosum*, ut in rotulam ad quam funis reflectitur.

Ad latera utrinque suscipit malleolos: jungitur etiam cum osse naviculari: sed & inferius cum calce, duplici articulo, ubi pars ejus inferior inæqualis est, bis cavata, & ter gibbosa. Ossis calcis caput recipit.

Notanda in horum ariculorum medio *cavitas* (cui calcis sinus respondet) in quâ continetur, pinguedo & mu-

ostiosa substantia; ad humectanda li-
 gamenta cartilaginea, talum ossi necen-
 ter, præsertim ossa ipsa, ne in motu exsic-
 cantur. Hinc observavi, quoties humida *Sonus in-*
 pinguis hujus substantiæ inopia est aut *pede inter*
 ferentia, vel ex vulnere ibi facto, vel a- *ambulan-*
 causa quacunq; inter ambulandum *dum unde*
 in pede fieri, ex duorum ossium *Autoris ob-*
 illusione, absq; tamen dolore, cum in- *serv. & ras*
 sit pars nulla sensibilis, sed tantum *tio.*
 ista, cartilagines & ligamenta.

II. Maximum est & crassissimum in
 pede, quippe ad cujus firmationem facit
 (sicut talus ad motionem) ideo per liga-
 menta plurima jungitur talo, ossibusque
 alijs adjacentibus.

Dicitur *ῥέγουα*, *calx*, *calcaneum*, *pedis*
ῥέγουα: in quod os *Chorda* totius corporis
 maxima & robustissima inseritur, ex tri-
 bus musculorum pedis tendinibus con-
 stituta.

Pars ejus *inferior* latiuscula est, ut pes
 tutius firmetur; *superius* caput amplum
 habet, ingrediens sinum talis, & sinum
 superficiale excipientem tuberculum
 tali. Sed & ossi cubiformi jungitur capite
 depresso.

III. Dicitur *naviculare* *σκαφοειδές*, à sca-
 phæ vel cymbæ similitudine: *connectitur*

Hh s

cum

cum talo, & tribus ossibus posterioribus.

IV. A formâ cubi dicitur *cuboides*, item *astessare*, Arabibus *grandinosum*, alij *πολύμωρον*. Cæteris majus calci præponitur, cui inæquali superficie iungitur, altero latere committitur pedi ossi quarto & quinto; Interius vero septimo tarso ossi.

Reliquia tria, olim innominata, à Fallopio *Calcoidea* dicta, *Cuneiformia*, naviculari articulantur: suntq; majus, medium & minus.

OSSA METATARSiv sive plantarum, sunt, tarsi ossibus connexa; Digtorum *quatuordecim*, quia pollex tantum ex duobus ossibus conflatur, & inter nodia breviora sunt quàm in manu sed pollicis crassiora quàm in manu.

Cætera se habent uti ossa in manibus respondentia, sicut & ligamenta ferè respondent.

Verùm sub plantâ pedis, cute adipemque remotis, *ligamentum* laurum est valdè; ab imo calcis osse, in omnia primæ phalangis *sesamoidea* inserta, pro totius pedis meliori fir-

mitate.

CAPV

DE OSSIBVS SESAMOIDEIS.

IN internodijs manuum & pedum reperiuntur OSSICULA quædam minima, dicta sesaminis vel SESAMOIDEA quia sesami semini respondent, formâ & parvitate. *Situm.*

Rotunda sunt & nonnihil depressa. Minora sunt in pedibus, nisi in pollice pedis, quia hic major est quam manus pollex. In senibus majora & nonnihil plana. *Figura.* *Magnitudo.*

Innascuntur tendinibus, sub quibus latent in ligamentis inflexa, ut cum ijs auferantur in repurgandis ossibus, nisi accedat diligentia. *Situs.*

Modò cartilaginea sunt, ut in pueris, in quibus non benè conspicua, modò ossæ, cartilaginibus tectæ, atq; intus fungosa & porosa. *Substantia.*

Número communiter duodecim sunt in singulis manibus & pedibus, sed aliàs sedecim, 19. 20. & plura observantur: aliquando decem tantum. Numerosiora sunt, majora & duriora in internâ sede manus quàm externâ. Numerus ergò

ergò incertus est: Nam multa ita parva sunt, ut non observentur: & tanquam in minus necessarijs natura hic modò abundat, modò deficit.

Peculiariter verò notanda sunt ob magnitudinem *duo illa*, quæ primo pollicis articulo ad metatarsi ossis caput apposita sunt, quorum *unum maius* est, subiectum parti nervosæ musculi, primum os pollicis flectentis. Estq; *forma & magnitudo* dimidiæ partis pisi majoris decoricati: quod ossiculum Arabes appellant Albadaram. Ex hoc hominem tandem aliquando quasi ex semine rursus propagandum, antiqui nonnulli Philosophastri statuerunt. Aliud verò multominus secundo pollicis articulo substernitur.

*Fabule
veterum.*

Alii alibi ossicula, *ossicula,* Licet verò ut plurimum in internodijs digitorum reperiantur ossicula ejus, modi minima, tamen & alibi videre licet.

Ut aliquando in manus externo latere, ad connexum ossis carpi octavi, & ossis metacarpi parvum digitum sustententis, sedem ibi vacuam opplens: & eodem modo tale ossiculum in pedis tarso ad externum latus articulationis ossis quinti metatarsi digitum parvum sustententis cum cubi formi: Item bina ossicula in

poplite

IV. Epiphyse juxta os femoris, musculorum
 duorum priorum pedem moventium)
 non tendinibus, sed principijs innata,
 quæ in senibus reperiuntur, & animali-
 bus siccis, ut cervis, canibus & leporibus
 hic referunt osseam partem in senibus
 ossi cubiformi oppositam.


Vjus.

I. Tendines tueri, & retinere duricie
 suâ in motu, ne ab articulo extuberante
 decidant.

II. Firmare articulum, & à luxati-
 one præcavere.

III. Intervalla vacua replere. Et
 hæc dum fiunt, in manibus apprehen-
 sio fit firmior, in pedibus verò statio atq;
 ambulatio constantior, præsertim per
 loca aspera.

DEO CREATORI NOSTRO SIT
 LAUS HONOR & GLORIA,
 qui nos ex nihilo tam mira-
 bili structurâ for-
 mavit.







Excudebat Andreas Rü

*dinger, Impensis Bechtoldi
Raab Bibliopola.*

ANNO M. DC. XL







INDEX CAPITVM
LIBRI PRIMI

Qui est
DE INFIMO VENTRE.

CAPVT I.

De Cuticula.

CAPVT II.

De Cute.

CAPVT. III.

De Pinguedine.

CAPVT IV.

De Membranis in genere, de membrana car-
posa, & membrana muscutorum propria.

CAPVT V.

De Musculis in genere.

CAPVT VI.

De Musculis Abdominis.

CAPVT VII.

De Peritonæo.

CAPVT VIII.

De Omento.

CAPVT IX.

De Ventriculo.

CAPVT X.

De Intestinis in genere.

CAPVT XI.

De Intestinis in specie.

II

CAPVT

INDEX.

CAPVT XII.

De Mesenterio.

CAPVT XIII.

De Pancreate.

CAPVT XIV.

De Epate.

CAPVT XV.

De bilis receptaculis, nempe: Folliculo fellis & canali bilario.

CAPVT XVI.

De Liene.

CAPVT XVII.

De Renibus.

CAPVT XVIII.

De Capsulis atrabilarijs.

CAPVT XIX.

De Vreteribus.

CAPVT. XX.

De Vesica Vrinaria.

CAPVT XXI.

De vasis spermaticis virilibus præparantibus

CAPVT XXII.

De Testibus.

CAPVT XXIII.

De vasis deferentibus seu eiculatorijs, de Fastatis, Vesiculis seminarijs, & Prostati

CAPVT XXIV.

De Pene.

CAPVT XXV.

INDEX.

partibus muliebribus Generationi in service-
bus, & primo de vasis spermaticis prapa-
rationibus.

CAPVT XXVI.

testibus foemine.

CAPVT XXVII.

vasis deferentibus.

CAPVT XXVIII.

utero in genere.

CAPVT XXIX.

uteri fundo & ore.

CAPVT XXX.

uteri Collo maiore.

CAPVT XXXI.

Hymene, seu nota virginitatis.

CAPVT XXXII.

impudendo Muliebri externo in genere.

CAPVT XXXIII.

Carunculis myrtiformibus.

CAPVT XXXIV.

Clitoride.

CAPVT XXXV.

alis & labijs.

CAPVT XXXVI.

Membris foetum involventibus.

CAPVT XXXVII. & ult.

Vasis Umbilicalibus.

INDEX
LIBER II.
DE MEDIO VENTRE

seu Thorace,

CAPVT I.

De Mammis.

CAPVT II.

De Musculis intercostalibus.

CAPVT III.

De Diaphragmate.

CAPVT IV.

De Pleura Mediastino & Thymo.

CAPVT V.

De Pericardio, & humore in eo contento.

CAPVT VI.

De Corde in genere.

CAPVT VII.

De cordis partibus in specie; Auriculis, Cavitatibus cum septo, vasis & valvulis.

CAPVT VIII.

De Vascularum Cordis unione in foetu.

CAPVT IX.

De Pulmonibus.

CAPVT X.

De fistulâ pulmonum, seu aspera arteria.

CAPVT XI.

De Laringe.

CAPVT XII.

De Oesophago.

CAPVT

INDEX.

CAPVT XIII.

Collo.

LIB. III.

SVPREMA CAVI-
TATE SEV CAPITE.

CAPVT I.

Capillis & Capillis.

CAPVT II.

Membranis extra & intra Cranium.

CAPVT III.

Cerebro, eiusq; Medulla in genere.

CAPVT IV.

*Partibus cerebri in specie, & primò de me-
dulla oblongatâ & spinali, eiusq; ventriculo
cerebri.*

CAPVT V.

Cerebello.

CAPVT VI.

*Reliquis, quæ in cerebro observantur partibus,
mirabili, glandulâ pituitariâ, infundibulo,
ventriculis cerebri, corpore calloso, fornice, plexu
choroide, glandulâ pineali &c.*

CAPVT VII.

fronte.

CAPVT VIII.

oculis.

CAPVT IX.

Auribus.

Li 3

CAPVT

INDEX.

CAPVT X.

De Naso.

CAPVT XI.

De Ore, Buccis, & Labijs.

CAPVT XII.

De Partibus in ore contentis: Gingivâ, palato,
vulvâ, faucibus, & osse gutturis.

CAPVT XIII. & ULT.

De Lingua.

LIBELL. IV.

DE ARTVIBVS.

CAPVT I.

De Manu in genere, & de Unguibus.

CAPVT II.

De Musculis Humeri, seu brachij specialiter
cti.

CAPVT III.

De Musculis scapulae seu homoplate.

CAPVT IV.

De Musculis Thoracis seu respirationis.

CAPVT V.

De Musculis Capitis.

CAPVT VI.

De Musculis Cervicis seu Colli.

CAPVT VII.

De Musculis Do si.

CAPVT VIII.

De Musculis cubiti & radij.

CAPVT

INDEX.

CAPVT IX.

De Musculis carpi & digitorum

CAPVT X.

De Pede in genere.

CAPVT XI.

De Musculis femoris.

CAPVT XII.

De Musculis tibiae.

CAPVT XIII.

De Musculis pedis.

CAPVT XIV. & ULT.

De Musculis digitorum pedis.

LIBELL. I.

DE VENIS.

Respond.

LIBRO I.

DE INFIMO VENTRE.

CAPVT I.

De Vena in genere.

CAPVT II.

De Venarum substantia & Valvulis.

CAPVT III.

De Venarum corporis divisione, & de vena porta.

CAPVT IV.

De Venis hemorrhoidalibus.

INDEX.

CAPVT V.

De Venæ cavæ trunco ascendente, eiusq³ ramis, præsertim venâ sine pari.

CAPVT VI.

De Venâ subclavia eiusq³ ramis, ut iugularibus &c.

CAPVT VII.

De Venis Brachiorum & manuum.

CAPVT VIII.

De Trunco venæ Cavæ descendente usque ad crura.

CAPVT IX & ULT.

De venis cruralibus.

LIBELL. II.

DE ARTERIIS.

Respond.

LIBRO II.

De Media cavitate seu THORACE.

CAPVT I.

De Arterijs in genere.

CAPVT II.

De Arteriam agnæ trunco ascendente.

CAPVT III.

De Arterijs Carotidibus.

CAPVT IV.

De Arterijs totius manus.

CAPVT

INDEX.

CAPVT V.

Arteriæ magnæ trunco descendente, usq; ad
urina.

CAPVT VI.

Arterijs cruralibus.

LIBELL. III.

DE NERVIS.

Respond.

LIBRO III.

DE CAPITIB.

CAPVT I.

De Nervis in genere.

CAPVT II.

De Decem paribus nervorum intra cranium &
Medullâ oblongatâ ortis eorumq; progressu.

CAPVT III.

De Nervis ex spinali medulla prodeuntibus, &
primò de nervis ex cervice, adeoq; totius ma-
nus nervis.

CAPVT IV.

De nervis thoracis vel dorsi, & lumborum.

CAPVT V.

De Nervis ex ossis sacri medullâ prodeuntibus,
& de nervis totius Pedis.

Ii s

LIBELL

INDEX.

LIBELL. IV. & VLT.

DE OSSIBVS

Vbi simul

DE CARTILAGINIBVS &
LIGAMENTIS.

CAPVT I.

De Ossibus in genere.

CAPVT II.

De Cartilaginibus in genere.

CAPVT III.

De Ligamentis in genere.

CAPVT IV.

De Cranio in genere.

CAPVT V.

De Sutura Cranij.

CAPVT VI.

De Ossibus Cranij proprijs in specie.

CAPVT VII.

De Ossiculis auditus.

CAPVT VIII.

*De Ossibus Capiti & maxilla superiori com-
munibus, Cuneiformi & spongioso.*

CAPVT IX.

De Ossibus maxilla in genere.

CAPVT X.

De Ossibus maxilla superioris proprijs.

CAPVT XI.

De Maxilla inferiori.

CAPVT XII.

De Dentibus in genere.

INDEX.

CAPVT XIII.

De Dentibus in specie.

CAPVT XIV.

De Spina, eiusq; vertebris in genere.

CAPVT XV.

De Spinae vertebris in specie.

CAPVT XVI.

De Osse innominato.

CAPVT XVII.

De Costis.

CAPVT XVIII.

De Osse pectoris seu sterno.

CAPVT XIX.

De Claviculis & scapulis.

CAPVT XX.

De ossibus totius manus.


CAPVT XXI.

De ossibus totius pedis.

CAPVT XXII. & ULT.

De Ossibus sesamoideis.

F I N I S.



INDEX.

Verborum & rerum

IN HISCE INSTITVTI- onibus Anatom. Content. Co- piosissimus.

A.	Alvearium	288.
ABDOMEN. pag. 11	Ambidextri unde	318.
Abdominis histo- ria. 13. & sequent.	Ambulatio quomodo fiat.	338
Acerabula 154.	Amigdale	293
Acuta figura capitis unde 434	Amnion membrana. 181.	
Actio partis. 3.	eius humor. ib.	
quotuplex ibid.	ANATOMIA quid. 1.	
Aer congenitus. 294.	eius subiectum. ib.	
Aerem non quemvis spiritui hominis es- se amicum. 228	humanum corpus cur potissimum co- sideret. ib. Eius u- sus ib.	
Ala auri. 288	Anatomie divisio. 11	
Alae nasi. 295	Anatomie piscium no- negligenda. 265	
ALÆ in valva 177	Anastomoses vena- rum. 350. Vaso- rum epatis, 90. & usus ibidem.	
magnitudo earum & excisio apud Ægyptios. ib.	Vasorum in liene. 99.	
Album oculi. 284	Vasorum spermati- corum in viro 129.	
Albus humor cur ex putredine fiat. 252	in foemina. 142.	
Allantoides membra- na & eius usus. 182.	Vasorum	

INDEX.

- Vasorum in utero*
 154. *Vasorum umbilicalium.* 184.
vasorum cordis fetus, 221. *vasorum intercostalium.* 367.
venarum Mammariarum cum epigastricis. 369.
Angina ex dentis luxatione. 474
Anthropologia. 1.
Antiades. 239
ANVS. eius historia. 81. *eius muscoli* 16.
sphincter ib.
Anus in cerebro quid. 276.
Ani lasio & procidentia. 82.
Apophysis ossis 425.
quid & ubi reperitur. ib.
eius usus. 426.
Apoplectica vena. 371.
Apprehensio. 317. 319
Aqualiculus. 13
Aquapendentis de structurâ Musculi
sententia post Vasorum. 35
Eiusdem de vena ventriculi. 60. *Eiusdem de usu pyramidalium musculorum.* 46.
Archangeli error. 7.
 8. 16. 18. 80. 114.
 141.
Areola. 191.
Aristoteles defenditur. 22. 87. 209.
Aristotelis error. 19.
 113. 125. 144.
 214. 227. 260. 262.
 347. 382. 393. 436.
ARTERIARVM historia. 381.
Arteria. 229
Arteria aspera historia. 229
Arteria magna. 229.
 385.
Eius ortus. 220.
Eius usus & valvula. 221.
Arteria significationes. 381.
Arte-

INDEX.

Verborum & rerum

IN HISCE INSTITVTI- onibus Anatom. Content. Co- piosissimus.

A.	Alvearium	288.
ABDOMEN. pag. 11	Ambidextri unde	318.
Abdominis histo-	Ambulatio quomodo	
ria. 13. & sequent.	fiat.	338
Acetabula 154.	Amigdale.	293
Acuta figura capitis	Amnion mēbrana. 181.	
unde 434	eius humor. ib.	
Actio partis. 3.	ANATOMIA quid. 1.	
quotuplex ibid.	eius subiectum. ib.	
Aer congenitus. 294.	humanum corpus	
Aerem non quemvis	cur potissimum cō-	
spiritui hominis es-	sideret. ib. Eius u-	
se amicū. 228	sus ib.	
Ala auris. 288	Anatomie divisio. 11	
Ala nasi. 295	Anatomie piscium nō-	
ALÆ in vulva 177	negligenda. 265	
magnitudo earum	Anastomoses vena-	
& excisio apud	rum. 350. vaso-	
Ægyptios. ib.	rum epatis, 90. &	
Album oculi. 284	usus ibidem.	
Albus humor cur ex	Vasorū in liene. 99.	
putredine fiat. 252	Vasorum spermati-	
Allantoides membra-	corum in viro 129.	
na & eius usus. 182.	in foemina. 142.	
	Vasorum	

INDEX.

<i>Vasorum in utero</i>	<i>sententia post V-</i>
<i>154. Vasorum umbilicalium. 184.</i>	<i>salium. 35</i>
<i>vasorum cordis fetus, 221. vasorum intercostalium. 367.</i>	<i>Eiusdem de ventriculi 60. Eiusdem de usu piramidaliū musculorum. 46.</i>
<i>venarum Mammariarum cum epigastricis. 369.</i>	<i>Archangeli error. 7.</i>
<i>Angina ex dentis luxatione. 474</i>	<i>8. 16. 18. 80. 114. 141.</i>
<i>Anthropologia. 1.</i>	<i>Areola. 191.</i>
<i>Antiatides. 239</i>	<i>Aristoteles defenditur. 22. 87. 209.</i>
<i>ANVS. eius historia. 81. eius muscoli 16.</i>	<i>Aristotelis error. 19.</i>
<i>sphincter ib.</i>	<i>113. 125. 144. 214. 227. 260. 262.</i>
<i>Anus in cerebro quid. 276.</i>	<i>347. 382. 393. 436.</i>
<i>Ani latio & procidentia. 82.</i>	<i>ARTERIARVM historia. 381.</i>
<i>Apophysis ossis 425. quid & ubi reperitur. ib.</i>	<i>Arteria. 229</i>
<i>eius usus. 426.</i>	<i>Arteria aspera historia. 229</i>
<i>Apoplecta vena. 371.</i>	<i>Arteria magna. 220. 385.</i>
<i>Apprehensio. 317. 319</i>	<i>Eius ortus. 220.</i>
<i>Aqualiculus. 13</i>	<i>Eius usus & valvula. 221.</i>
<i>Aquapendentis de structurâ Musculi</i>	<i>Arterie significationes 381.</i>
	<i>Arte-</i>

INDEX.

- Arteria* quid. 382. *vule eius ibidem.*
Arterie Materia ex *Arthrodia.* 422.
qua ibid. princi- *Artus.* 11.
pium est Cor. ib. *Artus quid.* 316.
Arteriarum usus ibid. *ARTIVM histo ia.*
earum membra- 316.
na. 384. *Atlas.* 473.
Arteria dilatantur *Atrophie Caussa* 84.
dilatato corde 383. 485.
Arteria non est pars *Averrois error.* 227.
similaris. 9. 211. 393.
Arteria an sentiant. *Auditus exactior quo-*
384. *modo fiat.* 292.
Arteria sextuplo cras- *Auditus gravis caussa.*
sior est venâ. 385. 293.
Arterie magnæ trun- *Auditus medium* 294.
cus ascendens. 385. *ossa* 447. *orga-*
descendens. 388. *num externum,*
Arteria coronariæ. 291. *internum* 294.
385. *Caliaca.* 389. *Auditus quomodo fiat.*
Arterie carotides seu 450.
seporales. 386. *AVRICVLÆ COR-*
mammariæ. *ibid.* *D I S.* 213. *earum*
Crurales. 391. *historia ib.* *Cur ita*
manus totius. 387. *dictæ.* *ibid.* *earum*
mesaraicæ. 390. *motus.* 214.
umbilicales. 184. *AVRIVM historia.*
Arteria venosa. 219. 287.
Cur vena & arte- *Aures externæ seu au-*
ria simul dicatur. *ricula.* 288. *earum*
ib. usus. 220. *val-* *partes*

INDEX.

- partes ib. usus. 291. De sono in pede inter
 auricula infima. 288. ambulandum. 499
 Cur eius lobus faci- &c.
 le perforetur. 289. AVTORIS opinio no-
 res cur moveantur va. De principijs
 paucis. 289. materialibus par-
 tium humani cor-
 poris. 4.
 aurium Cartilago. De loco generationis
 290. glandula ib. Cuticula. 16.
 musculi. 289. De materia Cutis. 19.
 aurium affectibus De partibus, pro qui-
 Cur iuvent masti- bus Lien sangui-
 catori. 295. nem conficit. 113.
 aurium purgatio- De usu capsularum a-
 ne profunda cur si- trabilariarum 115.
 at tussicula. 405. De materia membra-
 turis interna. 292. e. narum foetus. 180.
 ius partes ibid. duo De loco generationis
 ctus ad palatum. animalis spiritus
 294. musculi. ibi. 259.
 tympanum. 292. De usu cerebri eiusq;
 valvula. 294. medulla. 263.
 AVTORIS observatio. De principio cerebri.
 de epatis magnitu- 265.
 dine in tabidis. 88. De numero ventriculo
 De capsulis atrabila- rum cerebri 275.
 riy. 114. De 8 differentijs ve-
 De magnitudine Vre- narum hemorrhoi-
 terum in calculosis lium externarum &
 117. De sincipite internarum. 363.
 membranoso in ad-
 ultis. 444.

INDEX

- De nervorum numero. 395.
De numero figurarum capitis. 433.
Etc.
B.
B Albutiei causse. 311.
Barba pars ornatus. 5.
Basilica vena. 373.
Bauhinus valvula in colo primus inventor. 89.
Bilis receptacula. 93.
Bilis vomitus. 95.
Blesi unde. 311.
Brachiale quid. 317.
Brachium. ibid.
Broncus. 229.
Bucca. 300.
Buccula. ibid.
Buccarum musculi. 301.
C.
C Alamus scriptorius. 268.
Callicreas. 85.
Calculorum extractio quo loco fiat. 140.
Callus. 42.
Calorem nostrum in digere frigido. 22.
CALVA. 24.
eius partes. ib. 245. 433.
Calvitiei causse. 24.
Calvitices cur tantum insinipit. 24.
Calx pedis. 499.
CANALIS BILARIS historia. 95. 93.
Canalis in vasis cordis foetus. 222.
Canini dentes. 46.
Canitiei causse. 251.
252.
Canities cur citius circa tempora. 25.
Canescant citius capite tecto incedentes. ibid.
Canthi oculorum. 28.
CAPSVLÆ A TRABILARIÆ earum historia. 114.
earum cavitas, magnitudo, numerus, situ.

INDEX.

- Situs ib. connexio,*
figura, substantia,
 114. *Cur alij Ana-*
tomici non obser-
vent. 115. Earum
usus secundum Au-
torem. 115.
 APSVLA CORDIS.
 203.
Capilli cur homini co-
piosiores 249. eo-
rum abscissio. ib.
Capreolus 288.
Caput 11.
 CAPITIS historia.
 244. *figura 12.*
nova auctoris opinio
 433.
Cap. Cutis in quibus-
dam mobilis 279.
musculi 329. sutu-
ra, 438. partes eius
quo ordine in se-
ctione nova mon-
strantur. 278. quo
in antiqua. ibid.
Capitis sectio nova &
vera ab inferiore
parte inchoanda.
 264.
Caput homini cur ma-
gnum. 244. Cur
osseum, ib. Cur in
summo positum, ib.
Caput absque suturis.
 438.
Caro quatuorplex. 8.
Caruncula cuticula-
res in vulva. 177.
Caruncula in cantho
oculorum. 281.
Caruncula myrtifor-
mes in vulva. 173.
earum historia ib.
 & 174.
Caruncula papillares
in renibus. 110.
Carpus 317. eius mu-
sculi. 338.
 CARTILAGINVM
historia in genere
 427. *earum ex-*
tremitates cur pin-
gues 29.
Cartilaginee ut diffe-
rant ab ossibus &
ligamentis. 427. si-
mililitudo cum os-
dem 417. earum
connexio. 429.
 K k ma-

INDEX.

- materia. 428. si-
 tus, substantia.
 429. usus 428. &
 429.
 Cartil. non sentiunt.
 430.
 Cartilago nesiiformis.
 485.
 Cartil. Aurium. 290.
 Laringis. 236. &
 seq. narium. 297.
 trachea. 231.
 Casserij sententia de
 usu rectorum
 musculorum 41.
 44.
 Castrati, instar mu-
 lierum sunt. 129.
 Cauda puero Danico
 excrevit. 476.
 Cavitates in Cor-
 pore quid & quot.
 11.
 Cavitas iuxta ven-
 triculum & dia-
 phragma. 58.
 Cauterium in sinci-
 pite. 444.
 Cellula in Colo. 79.
 Cephalica vena. 373.
 375.
 Cervix. 243.
 CEREBRI Historia.
 257. Eius con-
 sensus cum dia-
 phragmate. 197.
 Cum utero. 155.
 Cerebrum proprie
 quid. 257. eius
 partes. ibid.
 264. 272. &
 sequent. usus.
 262.
 Cerebrum moveri.
 254. 262.
 Cerebri motus usus.
 262.
 Cerebri medulla quid
 250. à Cerebro
 ipso differt. ibid.
 Cerebri medullae di-
 visio. 258. 259
 eiusdem Capu-
 & Cauda quid
 ibid.
 Cerebrum maius qui-
 bus datum
 259
 Cere

INDEX.

Cerebri tubera 260.	Vnicum esse, Auctore
anfractus cur	sententia 275.
habeat. ibid.	tertius quid.
Cur modice	273. duo ante-
mollis substantie	riores quid. 275.
fit. 261.	Cerebri ventriculo-
Cerebrum habere ve-	rum usus, 277.
nas. 261.	quod excremen-
Cerebri eiusque	ta recipiant.
medulla usu, no-	ibid.
va auctoris opinio	Cerebri emunctoria.
263.	290. expurgatio.
Cerebri principium	453.
esse medullam no-	CEREBELLI
va Auctoris opinio	historia. 271. Eius
265.	usus ibid. ventri-
Cerebri excrementa	culus. 268.
copiosa sunt. 273.	Charta virginea.
277.	181.
Cerebri medulla ob-	Chimus quid. 92.
longatae partes &	Chorda. 62.
divisio. 266.	Chorda. 342.
Cerebri medulla ven-	Chorion membrana.
tricus nobilis	181.
267. Eius usus	Cicatrix quid 20. cur
secundum Au-	pulum non produ-
ctorem. 268.	cat. 247.
Cerebri ventriculi.	Cilia. 281.
274. & sequent.	Clavicula. 486.
	Kk 2 CLI-

INDEX

CLITORIDIS histo-	Colis.	134
ria, 174. eius cum	COLLVM eiusq; hi-	134
pene similitudo;	storia, 243. cur ob-	134
175. magnitudo	longum ibid. qua-	209
stupenda, 176.	animalia careant.	209
caput ib. substantia,	ibid.	209
ib. usus, 176. 177.	Colli partes. ib. mu-	209
Cochlea. 447-449.	sculi. 331.	331
Coctio ventriculi, 62.	Collum uteri brevia-	158
quomodo fiat, ib.	& longius 158.	162
fit calore & vi pro-	Columbi error. 45	101. 168. 282. 361
pria ibid. duvarur	Columbus falso taxat	445
omento 53. pan-	Aristotelem, 445.	falso citat Aristot-
create 62. pingue-	dine. 28. 53.	telem. 22. falso ci-
Cockionum excremen-	ta quot.	tat Fallopium 46.
Coitus. 140.	Columna nasi. 295.	in ore. 308.
Ex coitu nimio Calvi-	Coma pars ornatus. 5.	Conch. 288. 447.
ties. 248.	Conceptus. 140. 156.	Confricatrices. 175.
Coitu primo an virgi-	Contentus virorum.	ibid.
nibus semper debe-	CORDIS historia.	207.
at sanguis egredi.		
170.		
In Coitu voluptas ma-		
gna mulieribus		
unde. 145.		
Post Colicam rauce-		
dinis causa. 407.		

INDEX

207. eius basis vel
caput. 208. mucro
vel apex ibid. &
209. Substantia
cur adeo crassa,
209. usus 212.
ordis capsula 203.
fovea vel scrobicu-
lus. 486.
Cor non esse principi-
um venarum. 347.
In Corde non fieri san-
guificationem ib.
Cor de orificio ventri-
culi sinistro dici-
tur. 55.
Ex cordis lesione cur
animal moveatur.
207. Cur in me-
dio situm ib. mo-
tus eius cur in sini-
stro latere sentia-
tur. 208.
Cur eius mucro fini-
strorsum inclinet.
ibid. Cor esse in si-
nistro latere Error
vulgi. ibid.
Cor maius quibus. ib.
Circa cor pinguedo. Kk 3
209. Cur circa cor
dis conum nulla ib.
Cor an musculus. 210.
211.
Cordis temperamen-
tum. 211. 212.
Cor birutum. 211.
Cordis partes. 313 au-
ricula ibid. ven-
triculi. 214.
Dexter ventriculus
cur non tam cras-
sus ut sinister. 215.
cur sinistro maior.
ibid. Eius usus. 215.
ventriculum uni-
cum cordis cur ha-
beant pisces. 215.
ventriculus sinister
216.
Cordis septum. 216.
per septum hoc an
sanguis pertranse-
at. 216. 217. Septi
usus. 217.
Cordis vasa magna,
217. Cordis vaso-
rum animo in fœta
221.
Cori-

INDEX

Coriza. 453.

Cornua uteri. 159.

Corpora nervosa penis
137.

Corpus callosum in ce-
rebro. 275.

Corpus humanum ab
Anatomico cur
magis considere-
tur quàm alio-
rum animalium

I.

Corporis humani di-
visio. 2. II. 12.

COSTÆ, earumq;
historia. 479. usus
483. Cartilagines.

481.

Costæ cur plures.
ibid.

Costas quot habuerit
dAam. 482.

Costæ veræ quid. ib.
spuriæ quid. ibid.

Cotila. 425.

Cotyledones, 154. 181.
425.

CRANII historia.
433. usus 437. f.

gura. ibid. sub-Corua.

stantia. 435.

ossa in specie quot.
442. 437.

ossa triangularia.
440.

Sutura. 438. Su-
turarum usus.

441.

foraminula & ve-
na. 437. duplex

tabulatum vel la-
mina. 435.

meditullium eiusq;
vene. 436.

Superficies. ibid.
inscriptiones. ibid.

Sinus. ibid.

Cranium sine suturis
435. Cur pluribu

ossibus constet
437.

Cremafteres. 128.

Cribrum benedictum
antiquorum. 112.

Crista galli. 452.

Crus. 338.

Cubitus. 317.

Cubiti musculi. 333.

Cunnus

INDEX.

Cunus.	171.	Cur densa. ib.	18.
CUTICULA quid.		Cur non nimis den-	
15. eius historia.		sa.	ibid.
ibid.		CUTIS historia.	
Cuticule materia.			18.
15. 16. De eadem		Cutis quid.	ibid.
opiniones varie.		Cutis quomodo dici	
ibid.		possit membrana.	
efficiens.	17.		ibid.
usus.	ibid.	Cutim non esse pro-	
Cur non tota in ute-		prie membranam.	
ro generetur. ib.			19.
Cur aliquando callo-		De Cutis materia va-	
sa.	ibid.	ria opinioniones cum	
Curricula facile de-		refutationibus.	
perditur.	15.		ibid.
est absq; sanguine.		Cutis vera materia	
ibid.		qua. nova Auto-	
generari eam par-		ris opinio.	
tim intra partim			ibid.
extra uterum, no-		Cutis Actio privata	
va auctoris opinio.			
	16.	3. publica. 3.	20.
Cuticule Color.	18.	usus.	21.
Connexio, & nume-		Connexio.	22.
rus.	ibid.	Crassities.	21.
Cuticula cur dura.		mollities.	ib.
17. cur tenuis.		motus.	22.
ibid.			

Kk 4

figr.

INDEX.

- figura. 21. fora. Deglutitio quomodo
 mina. ibid. pori in fiat 242. an acti
 quem usum ibid. sit naturalis an a
 vasa. 22. nimalis bid. Cu
 Cutis efficiens causa deglutiantur fa
 20. cilius aliquando
 Cutis capitis in qui solida quam liqui
 busdam tur mobi da. 243.
 lis. 279. Dens vertebrae, 474.
 Cutis est pars mista. eius luxatio, & in
 9. 19. de angina. ibid.
 Cutim esse ex carne DENTIVM historia
 & nervo non vo 459. ab alijs ossibus
 luit Galenus. 19. quomodo differant
 Cutis color varius un ibid.
 de. 20. Dentium casus inio
 Cutis cur temperata. nibus cur & quan
 20. 21. do 462. Color. 463
 Cutis vulnerata cur connexio, 465. fi
 non vere coeat. 20. gura, 463. nume
 Cutis cur sita forinse rus, 464. multi
 cus, 21. cur alicubi cur longevitatem
 difficulter separe notent. ib. sensus.
 tur. 22. 421. 460.
 Cutis cur locus gene Dentis quæ pars sen
 rationis pilorum. tiat. ibid. periosteo
 247. cur careant. 460.
 D. Dentium membranu.
 D Artos 176. 463. le 460. 465. ner
 Deformitas in ve vuli 466. Substan
 tibus unde 29. tia.

INDEX.

- tia. 465. affectus
 & dolores, ibid.
 Vasa. ibid. 469.
 Vena. 466. Dentes sapientiae vel
 arterie. ibid. genuini. ibid.
 Dentium; durities, Dextra manus cur a-
 460. usus. 466. giliior sinistra. 318.
 Dentes semper cresce-
 re probatur. 419.
 461. eorum gene-
 rationem esse in u-
 tero. 461.
 Dentes qui & in qui-
 bus citius erum-
 pant 461. & 462.
 anteriores cur pri-
 us erumpant. ibid.
 Post Dentium casum
 in pueris an novi
 nascantur extra
 uterum. 463.
 Dentientes cur agre-
 scant. 462.
 Dentes primores seu
 incisores, & eorum
 descriptio. 467.
 Canini. 468. Ca-
 ninos paucos cur
 homo habeat. ibid.
 Dentes molares. 468.

- Superiores cur plu-
 res habeant radices
 469.
 Dentes sapientiae vel
 genuini. ibid.
 Dextra manus cur a-
 giliior sinistra. 318.
 DIAPHRAGMATIS
 historia. 196. eius
 cum cerebro con-
 sensus. 197. usus.
 199. & sequent.
 eius motus quomo-
 do fiat. ibid.
 Diaphragma quid.
 197. quod sit mu-
 sculus ibid. & 198.
 eius caput & finis.
 ibid. foramina. ib.
 In eius percussione
 cur oriatur risus.
 199.
 Diarthrosis. 422.
 Diastole quid. 212.
 Didymi. 124.
 Digiti cur plures dati.
 217.
 Digitorum musculi
 335. nomina. 318.
 numerus. ibid.

Kk 5 Di.

INDEX.

- Digitorum pedis mu-
 sculi. 343.
 Diploa. 435.
 Dispnae causae. 58.
 86. 224.
 Dolores epatis sunt
 obtusi. 91.
 Dolor nephriticus
 qualis 112. partu-
 rientium magnus
 unde. 162.
 Dorsum. 187. eius mu-
 sculi. 332.
 Dorsum manus. 317.
 Dorsum nasi. 295.
 Dorsum penis. 134.
 Dulcedo amoris. 174.
 Dura mater. 253.

E.
E Munctoria. 8. ce-
 rebri. 290.
 Enarthrosis. 422.
 Epar uterinum quid.
 181. 182.
 EPAR, eiusq; historia.
 86.
 Epar quid. ibid. Cur
 venarum principi-
 um, ibid. eius nu-
 merus. ibid.
 Eius situs in homi-
 ne, avibus &c. 86.
 situm eius non
 ignorarunt Hippo-
 crates & Aristote-
 les. 86. 87.
 Epatis figura. 87.
 fissura. ibid.
 lobi vel pinnae. 88.
 Epar in homine non
 dividit in lobos.
 ibid.
 Epatis magnitudo
 naturalis & prae-
 ternaturalis. ibid.
 Epar cur homini ma-
 gnum. ibid.
 Epatis divisio 87. in
 homine & brutis.
 ibid.
 Connexio & liga-
 menta. 88. 89.
 Epatis Color, substan-
 tia, vasa. 89.
 parenchima. ibid.
 Epatis vasa ad follicu-
 lum

INDEX.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| lum' fellis. 89. | guinis triplex. 106. |
| Epatis vasorum ana- | Expultrix vis non |
| stomoses. 90. | sufficit ad expellen- |
| Epatis substantia ner- | dum in partibus |
| vis caret. 91. | cavi. 47. |
| dolores habet ob- | |
| tusos. ibid. | |
| Epatis actio sanguifi- | F. |
| catio. 91. | F acies, 245. 278. |
| Epigastrium. 13. | humana cur |
| Epiglottis. 238. | depilis. 278. |
| Epiphysis quid & ubi | Faciei circulus, po- |
| reperiatur. 426. | mum, 299. |
| usus. ibid. | Fœmina an monstrum |
| Eugion. 164. | natura & per acci- |
| Excrementa trium | dens generetur. 125. |
| coctionum. 16. | Fœminarum genera- |
| Excrementa quandoq; | tio ubi & ex quo |
| per pudendum mu- | testiculo. ibid. |
| liebre cur rejiciantur. 81. | Fœminarum genera- |
| Excrementa cerebri | tionem magis à na- |
| copiosa sunt. 273. | turâ intendi quàm |
| In ventriculis ce- | marium. ib. |
| rebri colliguntur. 277. | Falx in capite. 255. |
| quò eijciuntur. 296. | Fallopj error. 141. |
| Excrementum san- | 147. 210. 253. |
| | Fames animalis ubi. |
| | 61. |
| | Fauces. |

INDEX.

- Fauces.** 308. 278. cutis & mu.
Fellis folliculus. 93. sculi. 279.
Femoris musculi. 339. **Funiculus.** 183.
Fernelij error. 50. G.
Fibra auris, 288. **Galenij error.** 36.
Fibra in quem usum. 37. 88. 141.
 57. 150. 271.
Fistula pulmonis. 229 **Galenij regula de mu-**
Focile maius 496. mo- **sculi principio.** 36.
mus. 497. **Gargareon.** 308.
Fodina. 448. **Gaza error in Aristo-**
Fœtus humanus per **tele vertendo.** 23.
penem urinam ex- **Gemelli.** 124.
cernit. 185. **Generationi inservi-**
Fœtus membrana. **entes partes mulie-**
 179. **bres.** 140.
Folliculus fellis. 93. **Genitale.** 134.
Fontanella. 444. **Genitalia muliebria**
Fontanelle locus in **à virilibus penitus**
brachio. 323. **differre.** 140. 141.
Fornix. 275. 276. **Ginglimos.** 423.
Fossa magna. 172. **Gingiva quid.** 307.
Foveæ circa claviculas **Glandula.** 8.
 486. **Glandularum ususib.**
Frenum glandis penis & 84.
 137. **Glandule aurium.**
Frenulum linguae. 290. **sub maxilla**
 312. **cuius sectio. ib.** **inferiori.** ib.
FRONTIS historia. **Glandula pinealis.**
 277.

INDEX

277. usus. ibid.	quomodo ab exter-
Glandula pituitaria.	nis differant. 363.
273. usus ibid.	Harmonia. 423.
Glandulosum assistens.	Helix. 288.
133.	Hernia caussa. 50. 51.
Glandulosum corpus. ib.	78.
Glandulosum corpus	Hircus. 288.
œsophagi. 241.	Hemieplata. 487.
Glandule laringis.	Humeri musculi. 321.
239.	Humor biliosus in au-
Glandulae mamma-	ribus. 292.
rum. 192.	Humor in thoracis
Glans penis. 137. eius	cavitate. 207.
figura ib. substan-	Humores oculorum.
tia, involucrium	286.
seu præputium, &	Humor aqueus an
frænum. ibid.	pars animata ib.
Globulus nasi. 295.	Humores non sunt
Glottis. 237.	partes corporis. 2.
Gomphosis. 424.	Humor oleaginosus in
Gula. 240.	prostatibus, & eius u-
Gurgulio. 308.	sus. 133.
Gutturis os. 309.	Humor in amnio. 181
H.	eius usus. ibid.
Hæmorrhagie na-	Humor in pericardio.
rium magne	205. vide pericar-
causæ quedam	dium.
255.	Hymenii historia. 164
Hæmorrhoides 362.	Hymen quid, Opinio-
interna. 99. 362.	nes variae. 166. &
	sequent.

INDEX.

- sequent. An semper
 inveniatur. 168.
 Eius foramen medi-
 um varium. 169.
 Hymen aliquando
 absq; foramine.
 169.
 Hymenis, connexio,
 magnitudo sub-
 stantia. 169. vasa.
 170.
 Hypochondria. 13.
 Hypogastrium. ibid.
 Inanitor ventriculi.
 56.
 Iecur, eiusq; historia.
 86.
 Iliac. 13.
 Iliaca passio. ubi. 78.
 Incisorij dentes. 467.
 Incus. 450.
 Indusium. 181.
 Infimus venter quid
 11. 13. cur pinguis-
 finus. 189. Cur o-
 mnium primo sece-
 tur & explicetur.
 13. partes & ha-
 rum appellationes.
 ibid. eius partes
 communes & pro-
 pria omnes. 14.
 Infundibulum. 274.
 usus. ibid.
 Inguina. 13.
 Insecta splene carent.
 96.
 Intestinulum. 183.
 INTESTINA quid.
 62. unde dicta ib.
 magnitudo Eo-
 rum. 63. Gyri in
 quem usum. ibid.
 situs, connexio,
 substantia, ibid.
 Intestin. tunica. 64.
 crusta unde. ibid.
 fibrae omnis gene-
 ris. ibid.
 pinguedo. ibid.
 mucus. ibid.
 vasa. ibid.
 usus. 76.
 Cur

INDEX.

Cur plura esse dicantur, licet unum sint. 75.	Intestini D V O D E NI historia. 76.
Intestinorum divisio. 75.	I E I V N I historia. 77.
Intestina tenuia, quid & quot. ibid. tenuia an recte dicantur superiora. ibid. Cur circa umbilicum sita ibid. Tenuium usus. 75. 76. Crassa quid & quot. 76. situs & usus. ibid.	Cur vacuum ibid. Eius longitudo. ibid.
Intestini COLI historia. 78. eius situs varius & cur talis. 78. 79. cellula & earum usus 79. ligamenta 80. valvula. 80.	I L E I intestini historia. 77. eius longitudo. ib. eius descensus herniam causat. 78.
Intestini C A E C I historia. 78. Cecum cur ita dictum. ibid. Cecum antiquorum quid. ibid.	Intestin. R E C T I historia. 81. eius consensus cum pene in viris. 81. Cum utero. ibid. Eius finis vel anus. 81.
	Involuntaria excretio alvi unde. 82.
	Involuntaria mictio. 82. 121.
	Iris in oculo. 28.
	Isthmus. 308.
	Iugula. 486.

Tablx.

INDEX.

L.

LABIA. 302.

Labirintus. 448

Labiorum musculi.

301. 302. & se-

quent.

Labia vulvæ cur qua-

dam mulieres mo-

veant. 153.

Labia vulvæ eorumq;

historia. 178.

Lactes. 83. 203.

Lac post natum infan-

tem cur generetur.

193.

Lactis efficiens. 193.

Lac per uterum flu-

xit. ibid.

Lachrycerum. 194.

Lac generari posse

virginibus, viris &

foeminis non gra-

vidis. 193.

Lacrimale punctum.

282.

Laqueus. 183.

LARINGIS historia.

233. partes. 234.

musculi. ibid. &

sequent. Cartila-

gines. 236. & se-

quent. inter carti-

lagines sinus. 237

vasa. 238. glandu-

la. 239. usus ibid.

Lateræ. 187.

Latere salvatoris a-

perto cur sanguis

& aqua effluxer-

int. 207.

Laurentij error. 16.

42. 80. 134. 135.

168. 184. 186.

199. 253.

Libido cur non sem-

per adsit. 130.

Libri & libelli huius

operis quot. II.

LIENIS historia. 96.

eius situs ibid. tactu

non deprehendi-

tur. ibid. numerus

ibid.

Lien an ex corpore

eximi possit. 96.

97.

Lienis actio. 99. 100.

anastomoses. 99.

Color. 98. cur in

factu rubeat. 16.

Connexio.

INDEX.

Connexio.	ibid.	sensu & motu.	432.
tunica.	ibid.	Ligamentorum varie-	
vasa.	ibid.	tas.	ibid.
substantia.	ibid.	Ligamentum ciliare	
figura.	97.	oculi.	285.
magnitudo.	ibid.	Ligamenta coli.	80.
enem melancholi-		Ligamenta epatis.	88.
cum excrementum		89. uteri.	151. 152.
non recipere proba-		Ligamenta ex vasis	
tur.	100. 101.	umbilicalibus facta	
enem sanguinem			184.
conficere, ut epar,		Ligamenti similitudo	
probatur.	101. 102.	cum osse & cartili-	
en in quem usum		gine.	417.
sanguinem confici-		Linea alba quid.	42.
at, Autoris nova		Cur alba.	ibid.
sententia & pro-		LINGVÆ historia.	
bationes.	103. 104.		311.
	105. 106.	frænulum.	312.
LIGAMENTI		vasa.	313.
in genere historia.		linea candida.	ib.
	430.	musculi.	ibid.
Eius significatio-		os.	309.
nes.	36. 430.	usus.	315.
materia & usus.		Lingua an musculus.	
	431.		312.
ortus & insertio.		Lingue amaritudo	
	ibid.	unde.	57.
Ligamenta carent		flavedo unde.	ibid.
		Ll	Lo.

INDEX.

Lobi epatis.	88.	Per mammas sangui-	
auris.	288.	nem aliquando exi-	
Loci.	148.	re.	193.
Longanon.	81.	Mammariæ venæ	45.
Lambi.	14.		192.
		Mammarum cum u-	
		tero consensus unde.	
M.			45.
Malleus.	450.	Mammillares proces-	
Malleoli vena.		sus.	399.
	378.	MANVS historia.	316.
Malleolus externus.		usus.	ibid.
	497.	Manus quid.	317. eius
internus.	ibid.	divisio in partes.	
MAMMÆ, Earumq;			ibid.
historia.	129.	Manus extrema quid.	
homini cur in pe-		ibid. eius actio.	
ctore sita.	190.		317.
Mammarum virilium		Manus compositio cur	
à mulcibribus diffe-		talit.	319.
rentia.	190.	musculi.	320.
Divisio.	ibid.	Marium generatio u-	
figura.	ibid.	bi & ex quo testi-	
magnitudo.	ibid.	culo.	125.
numerus.	ibid.	Masticatoria in au-	
glandula.	192.	rium affectibus iu-	
vasa. ib. & 193. usus		vant.	295.
ib. 193. & 194.		Matrix.	148. 162.
Mammis abscessis cur			
morbi multi.	194.		

Maxilla

INDEX.

- maxilla inferioris mu-*
sculi. 304. *visio & accidentia*
maxilla superior & 266. *eius regu-*
inferior. 454. *menta quinque.*
457. *267. ventriculus*
mediana. 160. 313. *nobilis. ibid.*
mediana vena. 374. *Medulla ossium.* 419.
medius venter. 11. *Membrum quid.* 10.
quid. 187. *virile.* 134.
mediocriter pin- *muliebre.* 140.
guis. 189. *&c.*
Meditullium cranij, *MEMBRANA*
eiusq; vena. 436. *in genere.* 29. 30.
MEDIASTINI *eius historia.* 30.
historia. 202. *Membrana quoduplex*
eius duplicitas. ib. *ibid;*
usus. 203. *eius nomina.* 30.
Medulla cerebri quid. *differt à tunica &*
258. *est principiu* *meninge. ibid.*
um & origo cere-
bri, nova auctoris
opinio. 265. *Membrana quid pro-*
Medullæ oblongatæ *prie.* 30.
& spinalis usus. *eius efficiens, for-*
270. *ma, materia finis*
Medullæ oblongatæ in *vel usus.* 30. 31.
cerebro principium *Membrana est instru-*
265. 266. *mentum tactus.*
eius in partes di- *Membrantarum ne-*
cessitas. 31.

INDEX.

- M E M B R A N Æ**
C A R N O S Æ hi-
 storia. 29.30.
 sita in animalibus
 quo loco. *ibid.*
 eius nomina. 31.
 Cur ita dicta. *ib.*
 eius motus. *ibid.*
 videtur esse muscu-
 lus. 32. eius color
 varius in modo na-
 tis & adultis. 32.
 Constat ex 4 mem-
 branis distinctis.
 32. 33.
 Memb. carnosæ usus
 32. Connexio. 32.
 33.
 Memb. Carnosa pal-
 pebrarum tenuior.
 281.
M E M B R A N A M V-
S C V L O R V M
 33.
 Eius ortus, conne-
 xio, usus. 33.
M E M B R A N Æ
 fœtus. 179.
 quando generen-
 tur. *ibid.* Efficiens
 an solus uteri ca-
 lor sit. 180. De ma-
 teria opinionones va-
 rie. 180. quot. *ibid.*
 & sequent.
 Membrane intra &
 extra cranium. 253.
M E N I N X pro-
 prie quid. 30.
 Meningum cerebri
 usus. 253.
 Meninx crassa quid
ibid. eius duplica-
 tio & quadruplica-
 tio. 254. 255. sinus
 255. usus. 256.
 Meninx tenuis. 257.
 Menstrua per quas vi-
 as expurgentur.
 142. 154 155.
 Mentum. 300.
 Mesaraeon. 83. duplex.
 Eius pars Galeno.
 84. eius vasa, glan-
 ula, adeps. *ibid.*
 Cur circa mesen-
 terij centrum ma-
 iores glandule.
 84. Earum

INDEX.

84. Earum schirrus nere historia. 33.
facit maciem totius nomina 33. figura.
corporis. ibid. 33. 34.
M E S E N T E R I I Musculus quid. 34.
historia. 83. usus. eius partes. 34. 35.
31. 83. 36.
Metacarpum. 317. Musculi caput quale.
Metapedium. 338. 36.
Mirach. 13. Musculus movet prin-
Mistax. 300. cipium versus. ib.
Molares dentes 468. In Musculo motus
Monticuli veneris. quotuplex. 38.
178. Musculi initium est
Muli. bres partes. 140. ubi nervus ingre-
Muliebre pudendum ditur. 36.
externum. 171. Musculi caput esse
Mulieribus quibus- sensibile & mobile
dam cur bene olen- probatur. 37.
tia noceant. 157. Musculi medium vel
Mulier gravida per venter. 36. 39.
quam viam semen Musculi finis vel cau-
emittat. 147. da qualis 47. quid.
Mulier cur nates ha- 35. 37. aliquando.
beat ampliores. crassior est capite
148. aliquando non.
Musculosa caro. 8. 37. non est mollior
Musculus non est pars capite, sed durior.
similaris. 9. 37. 38.
MUSCVLI in ge- Musculi actio vel mo-
ll 3 tus

INDEX

- eius quotuplex. 38. Musculus oblique as-
 39. 46. cendens. 43.
 Cur voluntarius. eius principium.
 39. ibid.
 Musculi partium u- finis & tendo du-
 sus. 39. plex. ibid.
 MUSCULORVM Musculi recti. 44.
 ABDOMINIS Initium. ibid.
 historia. 40. Eius inscriptiones.
 actio. 47. quot. ibid.
 abusus. ibid. Musculos rectos esse
 usus. 48. plures probatur.
 Musculi abdominis 44.
 cur plures. 47. Eorum vene &
 Eorum numerus, arteria. 45.
 maximus, mini- Musculi piramidales.
 mus & medius. ibid.
 40. 41. esse peculiares mu-
 Musculus oblique de- sculos probatur.
 scendens quid. 41. ibid.
 Eius finis & nervi. Eorum ortus. ibid.
 ibid. insertio. 46. usus.
 perforationes. ibid.
 42. Musculi transversi.
 eius initium ve- 46.
 rum. 41. ortus. ibid.
 probatur. 43. insertio & usus.
 falsum iuxta alios. 47.
 42.

MUSCV

INDEX.

MVSCVLI IN-	MVSCVLI	osia
TERCOSTA-	hyoidis.	309.
LES Eorumque	humeri	quat.
historia.		321.
numerus & ortus.	pectoralis.	322.
	Deltoid.	ibid.
fibra.	aniscalptor.	323.
ut se mutuo inter-	rotundus maior	
secent.	&c. ibid.	
usus.	scapula.	326.
	thoracis seu respi-	
	rationis.	327.
	capitis.	329.
	cervicis seu colli.	
		331.
	dorsi.	332.
	cubiti & radij.	
		333.
	carpi & digito-	
	rum.	335.
	femoris.	339.
	tibiae.	340.
	pedum.	342.
	digitorum pedis.	
		343.
	penis.	139.
	testium.	127. 128.

Musculi	laringis.
	234.
& sequent.	
oesophagi.	242.
oculorum.	282.
aurium.	289.
narium.	297.
buccarum.	301.
labiorum.	ibid.
maxillae inferioris.	
	304.
temporalis.	ibid.
eius lesio cur peri-	
culosa.	305.
eius munimenta.	
	ibid.

El. 4. Na.

INDEX.

- N. Nervorum omnium
 Ares. 296. principium, 259
 Narium septum. 270. 393.
 ibid. & 298. Unde oriantur o-
 Narium cum abdomi- piniones varie.
 ne consensus unde. 393.
 45. Nervorum usus. 394.
 NASI historia. 295. Nervus non est pars si-
 Nasi divisio. ibid. & mularis. 9.
 296. Nervi motorij an a
 dorsum. ibid. sensorijs differant.
 spina. ibid. 394.
 globulus. ibid. Nervi qui magni.
 muscoli, 297. 395.
 Cartilagines. ibid. Nervi optici cur ma-
 & 298. gni. ibid.
 vasa. 298. De Nervorum numero
 tunica. ibid. autoris nova opi-
 Nasi externi usus. ib. nio. 395.
 ad ornatum con- Nervorum paria vel
 ferre probatur. coniugationes.
 299. 396.
 Nates in cerebro. Nervorum origine. &
 276. distinctiones Me-
 NERVORVM hi- dico scire est ne-
 storia. 392. cessarium. 396.
 Nervi significationes. Nervus sine pari. 396.
 ibid. & 430. & 414.
 Nervus quid. ib. Ma Nervus inseritur in
 teria. 393. musculi

INDEX.

- musculi caput, vel non infra medium.* 36.
Nervus nullus ingreditur tendinem. 38.
Nervi cur absq³ cavit³ate. 397.
optici an cavi. ib.
Nervorum triplex substantia. 397.
Nervi cur duriores vel molliores. 398.
Nervorum decem paria intra cranium orta. 399.
Nervorum par olfactorium. *ibid.*
An olfactorij sint nervi. *ibid.*
Nervi optici. 400. *de ortu illorum aliorum error.* *ibid.*
opticorum unio & eius vera caussa. *ibid.*
Nervi motorij oculorum. 401. *de eorum ortu aliorum error.*
Nervi recurrentes seu vocales. 406.
Nervi cordis Aristotelis. 218.
Nervi oculorum optici & motorij. 284.
Nervi spinalis medullae. 408.
Cervicij. *ibid.*
totius manus. *ibid.*
thoracis. 411.
dorsi. 411.
lumborum. 412.
totius pedis. 413.
Crurales *ibid.* & 414.
Nephriticus dolor 112.
Nephriticis cur vomitus. 407.
Nephritis cur flatuum & excrementorum copia exacerbetur. 108.
Nictitatio oculorum in brutis unde. 282. 283.
Nuptiae quando instituendae. 165.
Nympha. 174. 177.
I s *Oci.*

INDEX.

- O. aqueus humo
an sit pars ani
mata. 286
- O**CCIPUT quid. 245. Oculo uno
cur moveatur
alter. 401
- O**CVLI Historia. 280. eius anguli
& canthi, ibid. Oculi partes. ibid.
aliquando, le
so temporal
palpebrae, 280. musculo. 401.
cilia. 281. Oculares dentes
supercilia. ibid. 468.
carunculae. ibid. Ocularia vena.
Adeps. 282. 375.
Musculi. ibid. Oculi orbita, cur
vasa. 283. pinguis. 29.
nervi optici. Odor. 299.
284. Cur saepe in sum-
motorij. ibid. mis naribus
tunica. ibid. diu fervetur.
& sequent. 443.
pupilla. ibid. Odoratus lesio.
Iris. ibid. ibid.
- Interstitium **OESOPHAGI**
ciliare. ibid. historia. 240.
humores. 286.

INDEX.

- in eius affecti-*
bus dorso appli-
canda Topica.
 241.
eius vasa.
 241.
glandulosum
corpus. *ibid.*
tunica. *ibid.*
musculi. 242.
actio. *ibid.*
usus. 243.
olfactus, 299.
eius organum.
 400.
 O M E N T I
historia. 52.
eius nomina.
ibid.
Omenti amplitu-
do, origo du-
plex & substan-
tia. *ibid.*
Omentum unde
pingue. 26.
Omentum quomo-
do caussa hernie
& sterilitatis.
 52.
Inter Omenti
membranas ca-
vitas. 53.
Omenti vasa mul-
ta, adeps, glan-
dula. 53.
Omentum coctio-
nem iuvat.
ibid.
quando aufe-
rendum. *ibid.*
Omenti situs. 52.
figura, magni-
tudo, usus. 53.
Ophthalmia sedes.
 285.
Orbiculus *nasi.*
 295.
 Orga-

INDEX.

- Organice partes quæ species. 422.
 IO. quotuplices. II. Ossa fracta quæ meli-
 In Organo quovis quæ us coalescant. 424.
 consideranda. ibid. Ossium cavitates. 425.
 Os. 425. Ossis apophysis seu pro-
 OSSIVM historia. cessus. 425.
 417. Epiphysis seu ap-
 De Ossibus cur ultimo pendix. 426.
 agat autor. ibid. Supercilia & la-
 Ossium similitudo cum bra. 427.
 cartilaginibus & Ossa cranij quot. 437.
 ligamentis. 417. Ossa cranij triangula-
 & vicinitas. 418. ria. 440.
 Ossium materia. 418. Ossa cranij in specie
 Ossium medulla an a- quot. 442.
 limentum sit, an Ossa frontis vel puppis.
 excrementum. ibid.
 419. Eius descriptio. ib.
 Ossium usus. 420. eius cavitates vel
 Ossa magna vel parva sinus notabiles. ib.
 quæ. 420. Ossa spinæ. 470. eo-
 Ossa cur plura in ani- rum usus. 443.
 mali. ibid. colli. 473.
 Ossium numerus 421. dorsi vertebræ.
 eorum periosteum 47. sincipitis vel
 ibid. verticis. 444. occi-
 Ossa non sentiunt. ib. pitis vel memoria.
 Ossium connexio vel 445. occipitis os
 Coarticulatio quo- triangulare in ca-
 duplex, & quot eius nibus

INDEX.

- nibus. 446. rem-
 porum seu petrosi.
 446. Os iugale.
 447.
 Osibus petrosis ca-
 vitates. 447.
 icula auditus 449.
 eorum inventores.
 ibid. usus. 450.
 cuneiforme vel
 sphenoides. 451.
 spongiosum vel cri-
 brosum. 452.
 maxillæ. 454.
 sacrum 475. & e-
 ius partes. ib. Gale-
 no quot. ibid.
 s coccygis. 476. la-
 xari potest. 477.
 s innominatum vel
 coxæ. 477.
 silium. ibid. eius spi-
 na, costa, dorsum.
 ibid. Cur in mulie-
 ribus amplius hoc
 os. 478.
 ossa pubis. 478. In
 partu laxantur. ib.
 eorum magna fo-
 ramina ad quid.
 ibid. in mulieribus
 ossa pubis ampliora
 sunt. 479.
 Os Ischion vel coxen-
 dicis. ibid.
 Ossa costarum. ibid.
 Os pectoris seu ster-
 non. 483. eius ossa.
 485.
 Claviculæ. 486.
 usus. 487.
 Os scapulæ vel homo-
 platæ. 487.
 brachij. 489.
 Cubiti. ibid.
 ulnæ, radij. 490.
 manus parvæ. 491.
 Carpi. ibid.
 metacarpi. 492.
 digitorum. ibid.
 femoris. 493.
 molæ. 495.
 tibiæ. 496.
 fibulæ. 497.
 pedis extremi.
 498. tarsi. ibid.
 naviculare. 499.
 cuboides. 600.
 metatarsi.

INDEX.

- metatarsi. *ibid.*
 sesamoidea. 601.
 usus. 603.
 Os hyoides vel lingua. 309.
 eius musculi. *ibid.*
 usus. 311.
 Os ventriculi. 55.
 uteri. 160. 161.
 Oris partes externa. 300.
 tunica, usus. *ibid.*
 In Ore contentae partes. 307.
 P.
P Alatum, quid. 307.
 Palma. 307.
 Palpebrae oculorum. 280.
 Palpebrarum musculi. 281.
 PANCREAS. Eius historia & usus. 85.
 PAPILLÆ historia. 191.
 Papillarum sensus insignis unde. 191.
 Papillarum color, circulus, perforatio, usus. 85.
 Paracelsi error. 118.
 Paralysis. 243.
 Parenchima quid. 8.
 hepatis. 89.
 eius usus. 91.
 pancreatis. 85.
 Paristhmia. 239.
 Parotides. 290.
 PARASTATAE. 130.
 133. eorum ortus substantia & usus. *ib.* sæpè semine referta. 131.
 Pars quid. 2. in lata significatione. *ib.* propriè. *ib.* Galeno *ibid.* Fernelio. *ibid.*
 Pars corporis quæ prius generetur. 4. quæ prius perficiatur. *ibid.*
 Partis actio. 3. usus. *ibid.* temperies. *ibid.* temperiem consequentia. *ibid.* necessario accidentia. *ibid.*
 Partes

INDEX

Partes muliebres. 140	Patella. 498.
Partium corporis prin-	Pectus. 187.
cipia. 4. 10.	Pedium. 338.
Partium corporis va-	Pedis historia. ibid.
riae divisiones. 5.	Pes quid. ibid. eius
Partes in quovis orga-	in partes divisio.
no. 10.	ibid. musculi. 342.
Partes imi ventris. 13.	Pelvis. 148. 274. 447.
Partes necessitatis. 6.	PENIS historia.
commoditatis. ib.	134.
ornatus. ibid.	animal est Plato-
principales. ibid.	ni. ibid.
ministrae. ibid.	eius situs, numerus,
similares. ibid.	figura. ibid.
dissimilares seu or-	Penis consensus cum
ganica. 10. 11.	intestino recto. 81.
Partium similari-	Penis dorsum. 135.
um numero varia	magnitudo. ibid.
sententiae. 6. 7.	Cur homini non
Partes similes quot	tam magnus ut
revera. 9.	brutis. ibid. quibus
ad sensum. ibid.	hominibus maior.
simpliciter. ibid.	ibid. quomodo
Part sanguinea quid.	maior fieri possit.
ibid.	ibid.
Spermatica. ibid.	Penis cur careat pin-
Partes ad nutritio-	guedine, opiniones
nem facientes. 14.	variae & vera. 135.
ad generationem.	136.
ibid.	Penis

INDEX.

Penis substantia. 136.

partes ibid. Glans

vel caput. 137.

Penis in quibus ossens.

136.

Penis corpora nervosa.

137.

eorum ortus & du-

ctus. 138. septun-

pellucidum. 138.

vasa. ibid. & 139.

musculi. ibid.

usus. 140.

Penis substantia varia

137. 138.

Penis induratio & eo

rectio unde, &

cur fieri debeat.

138.

Penis cum utero simi-

litudo inepta. 141.

Penis muliebris. 175.

in cerebro. 277.

PERICARDII

historia. 203.

eius foramina &

usus. 204. humor

in eo serosus. 205.

an in omnium pe-

ricardijs reperia-

tur. ibid. Cur in

mortuis copiosior.

ibid. unde oriatur,

opiniones varia.

205. 206. usus.

206.

Periosteum. 421. 253.

exquisi e sentit. ib.

Pericranium quid.

253.

PERITONÆI hi-

storia. 48.

Peritoneum quid. 48.

unde dicatur. 48.

eius affectiones. ib.

Cur varietatem

habeat in crassitie

ratione sexus. 48.

Peritonæi substantia.

ibid. figura p. 49.

magnitudo. ibid.

superficies. ibid.

ortus. ibid.

connexio. ibid.

duplicitas. ibid.

foramina & pro-

cessus. 50. vasa; u-

sus. 51.

Peritona-

INDEX.

tritonaum sensu est	Pili pubis muliebris.
præditum. 51.	172.
tritonaum est mater	Pili subalares. 188.
tunicarum in imo	usus. ibid.
ventre.	Pilorum efficiens 247.
barinx. 308.	divisio. 248.
hrenes. 13.	usus. 249.
thiseos causa qua-	Pili capitis vide capili.
dam, & inde mor-	Pili crassi, tennes, du-
sis repentina. 226.	ri, molles. &c. 250.
hiltrum. 300.	Pilorum figura & va-
τινόςκολοι άνω	rius color, huiusque
16.95.	caussa. ibid. & 251.
καίτω. 95.	PINGVEDINIS
ia mater. 275.	historia. 23.
PILI. 245.	Pinguedo quid. ibid.
earum historia. ib.	Pinguedo non est pars
in quibus animali-	corporis. 2.3.23.
bus. ibid.	Pinguedo ab adipe
Pilorum materia.	differt. 23.209.
286.	Pinguedo quo loco sit
an bono alimento	in homine & bru-
nutriantur. ibid.	ti. 23.
Pili quo loco generen-	Pinguedo an circa cor
tur. 246.	reperiatur. 209.
locus qualis esse de-	Pinguedine quæ par-
beat. ibid.	tes careant & qua-
Pilis cur careant cru-	re. 23.
stata animalia.	Pinguedo in cordis
247.	Mm ven-

INDEX.

- ventriculo. 210. *Pinguedo in fame fit*
alimentum. 29.
Pinguedo in qui us-
dam partibus copio-
sior & cur. 24. 26.
 29.
Pinguedinis materia.
 24.
Pinguedo sanguine fi-
gidior. 24.
quod calida sit mo-
derate, probatur.
 24.
Pinguedinem esse fi-
gidam Opinio, e-
ius refutatio. 25.
Pinguedinis efficiens
causa. 25.
quomodo fiat. 25.
 26.
quod fiat à frigidi-
ditate, probatur. 25.
 26. 28.
quod fiat à calidita-
te, opinio & eius re-
futatio. 27.
quod fiat à densita-
te, opinio & eius
refutatio. *ibid.*
Pinguedinis usus. 28.
 29.
- Pinguedo alia purior*
in partibus muscu-
losis, alia cœnosa &
pūrescibilis in imo
vent. e. 105.
Pinnae auris. 288.
epatis. 88.
navium. 295.
Placenta uteri. 181.
 182.
 PLEVRÆ historia. 200.
origo. 201.
Crassities in sanis
& pleuriticis. *ibid.*
vasa. *ibid.*
usus. 202.
Pleuritici quomodo
per urinas expur-
gari queant. 367.
Pleuritica materia
locus. 201.
In Pleuritide non sem-
per dextri lateris
vena secanda. 367.
In Pleuritide vena po-
plitis sectio cur utilis.
 367.
 Plexus

INDEX.

lexus choroid seu re-	PROSTATÆ quid.
titata u. i. cerebro.	133.
277.	situs. 121. 133.
INDEX; eius histo-	figura. ibid.
ria. 81.	substantia. ibid.
musculi. ibid.	usus. ibid.
omum Adami. 237.	Cur membranam
gri cutis in quem u-	densam habeant.
sum. 21.	ibid.
radices pilosas ha-	An semen contine-
bent. 247.	ant. 132.
Potus bilarius. 93. 95.	An ad seminis ge-
Porum bilarium Gale-	nerationem faci-
nus agnovit. 93.	ant. 134.
Potus aliquid in tra-	Prolabia. 300.
cheam & pulmo-	Pubes. 13.
nes descendere.	Pudoris sedes. 299.
229. 239.	Pudendum muliebre
Præcordia. 13. 196.	externum. 171.
Præputium. 137.	quodnam proprie
Primoris dentes. 487.	sit. 178.
Principium raditatio-	PULMONIS his
nis seu originis. 5.	toria. 223.
dispensationis &	Pulmo cur divisus.
distributionis. 6.	224.
Processus mamilla-	eius lobi. ibid.
res vel papillares.	vasa. 225.
399.	Pulmo re omnibus
usus. 400.	partibus sanguine
	abundat. 226.
	M m 2 Pul.

INDEX.

Pulmo peculiari modo nutritur. <i>ibid.</i>	RENVM historia. 106.
Pulmonum ulcera cur in doloifica. 226.	Renes unde pinguedinem habeant. 26.
Pulmonis actio. 227.	Renes cur bini. 107.
motus eius à thora- ce. <i>ibid.</i>	Ren quinam altior in homine & brutis. <i>ibid.</i>
usus. 228.	Renum connexio. 108.
Pulmone cur caveant piscis. 228.	color. <i>ibid.</i>
Pulmonis fistula. 229.	figura. <i>ibid.</i>
Pulsus quid & ex qui- bus constet. 212.	magnitudo. <i>ibid.</i>
Pulsus unde. 383.	superficies. <i>ibid.</i>
ubi exploretur. 388.	membrana. 109.
Punctum lacrimale. 282.	vasa. III.
Pupilla. 285.	adeps. 109.
Putredo cui pinguedi- ni & cui sanguini magis competat. 105.	Renum adiposa vena. 109. III.
R.	emulgentes vena. III.
R Adij musculi. 333.	Renes scrutari quid. 109.
Raucedinis post colicam caussa. 407.	Renum substantia. 109.
Regiones in corpore. 11. 12.	ventres vel cavi- tes. 110.
	caruncula papilla- res. <i>ibid.</i>
	Renis structura in ca- ne. 112.
	fistula

INDEX.

fictitia veterum.	112.	tum & coctionem	60.
Renum usus.	113.	faciat.	60.
Renēs succenturiati.	114.	Sanguificationis locus,	
		materia ex qua &	
		efficiens.	91.
Reptilia cur serpent.	420.	Sanguificatio quomo-	
		do fiat.	91.92.
RETE MIRABILE.	272.	Sanguinis excremen-	
		tum triplex.	106.
usus.	273.	Sanguificationem non	
Rigoris caussa.	33.	fieri in corde.	347.
Rima magna mulie-		Scapha.	288.
ris.	172.	Scapula.	487.
Cur amplior. ibid.		Scapulae muscoli.	326.
Resus sardonij caussa.	199.	Schirrus glandularum	
		mesenterij.	84.
Rotatores.	494.	Scutiformis cartilago.	
Ruga in collo uteri.			237.
	163.	Skeleton.	421.
S.		eius divisio secun-	
Saliva.	239.	dum autorem.	433.
Salvatella vena &		Scrophularum sedes.	
eius sectio.	373.		291.
	375.	Scrotum quid.	126.
Sanguineae partes.	9.	Cur careat pin-	
habeant fibras sper-		guedine.	ibid.
maticas.	51.	Secundina quid &	
Sanguis ex liene reie-		cur ita dicta.	180.
ctus an ad appeti-		Sella sphenoidis.	452.
		M m 3	Sk-

INDEX.

- Semen* quid partibus conferat. 10.
Semen in coitu quo effundatur. 147.
Seminis preparatio ubi & quomodo fiat. 129.
Seminis causa efficiens 128. locus ubi generetur. ibid. locus ubi reseruetur pro futuro coitu. 132.
Sensus organa qualia. 20.
Septum narium. 296. 298.
Septum in corde. 216.
Septum transversum. 197.
Serum cur inter alia excrementa sit copiosissimum. 107.
Sero abundant spleneticus & melancholicus. 106.
Serum sanguinis in quem usum. 92.
Sesamoidis ossa. 601.
Siele Arabum. 373. 375.
Sin ipur quid. 244.
Sinapitis vulnera cur lethalia. 444.
Sinciput membranum in pueris. ib.
Sinus durae matris in capite. 255. usus. 256.
Sinus pudoris. 162.
Somnus a quo latere in ipiendus. 54.
Spatula. 487.
Spasmus cynicus. 301.
Speculum lucidum in cerebro. 275.
Spermatice partes. 9.
Sphincter ani. 81. eius usus. 82. eius lesio involuntariam excretionem facit.
Sphincter oesophagi. 242.
Sphincter vesicae. 121. eius lesio involuntariam mictionem facit. 1-1.
Spina quid. 470.
Spina vertebrae. ibid. cur plures. ibid. *Spina*

INDEX.

- Spina figura. 470. &
 471. processus. 471.
 appendices. 472.
 foramina. ibid.
 substantia. ibid.
 connexio. ibid.
 ligamenta. ibid.
 vertebra in sp. cie.
 473.
 Spiritus non sunt par-
 tes corporis. 2.
 Spiritui hominis non
 quæritur aerem esse
 amicum. 228.
 Spiritus animalis ubi
 generetur nova Au-
 toris opinio. 268.
 259. 270.
 Spir. animalis materia
 263.
 De loco opiniones
 aliorum & refuta-
 tio. 269.
 preparatio ubi.
 269. 270.
 conservatio. 270.
 Spiritus naturalis se-
 cundum nonnullos
 generatur in dex-
 tro cordis ventricu-
 lo. 269.
- SPLENIS historia.
 96.
 Splenicus ramus. 98.
 eius situs. 102.
 Splen ridere facit.
 quomodo intelli-
 gendum. 106.
 Stapes. 450.
 Sternum. 187 483.
 Stomachus. 55. 240.
 Sterilitatis causa.
 159. 161.
 Sternutationis causa.
 298.
 Striloides. appendix.
 Sudoris copia in quar-
 tanarijs. 106.
 Suffusionis sedes. 236.
 Supercilia. 281.
 Suspirium. 240.
 Surditatis causa. 223.
 Surdi a nativitate tur-
 muti. ibid.
 Sutura. 423.
 SVTVRÆ cranij.
 historia. 438. earum
 obliteratio. ib. ca-
 rentia. ib. numerus.
 ib. situs. ibid.
- Mm 4 Sa-

INDEX.

- Sutura vera.* 439. unde dicatur. 35.
Coronalis. ibid. eius principium &
eius usus. ibid. insertio. 35.
lambdoidis. ibid. Tendo dici potest de
usus. 440. initio & fine my-
sagittalis. ibid. sculi. 36.
Sutura mendose & Tendo paucis musculis
squammose. 440. est in medio. 36.
cur tales. ibid. Tendinem non recipe-
Suturarum usus. 441. re nervos probatur
Earum numerus 38.
magnus bonus. ib. Tentigo. 175. 176.
Symphysis. 423. Testudo. 275. 276.
Synarthrosis. 422. Testes in cerebro. 276.
Synchondrosis. 424. TESTES viriles &
Synnevrosis. ibid. Eorum historia.
Syssarcosis. ibid. 124.
Systole quid. 212. Testium figura. ibid.
T. magnitudo. ibid.
TARSI oculorum. Situs. ibid.
 281. usus. 129. 129.
Temperies partium. In viro cur foris siti-
 3. 124.
Temperiem conse- Testis dexter cur vari-
quentia. ibid. cofior, calidior &
Tempora quid. 242. marem generans.
TENDO. 34. 124.
Tendo quid. 35. & 37. Testium integumenta
 & tunica. 126.
 127.
 musculi.

INDEX.

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| musculi. 127. | neus. ibid. |
| substantia. ibid. | cur non totus osse- |
| vasa. ibid. | us. ibid. |
| Testes in nonnullis | cur ex parte osseus. |
| spontè moventur. | Thoracis partes. ibid. |
| 128. | & 189. |
| Sine Testibus non fieri | Thorax hispidus quid |
| generationem. ib. | significet. 211. |
| Testium consensus cum | Thoracis musculi. 327. |
| partibus superiori- | In Thorace cur pin- |
| bis præsertim cor- | guedo pauca. 189. |
| de. 129. | Thymus quid. 203. |
| Testibus ex sectis gene- | Tibiæ musculi. 340. |
| rare taurus paulo | Tonsillæ. 239. |
| post potui. 132. | Torcular. 256. |
| TESTIS MULIE- | TRACHEÆ hi- |
| BRES, eorumq; | storia. 229. |
| historia. 142. | In Tracheam & pul- |
| quomodo differant | pones aliquid de- |
| à viriibus. ibid. | scendere. 229. |
| Cur intus siti. ibid. | 238. |
| eorum membrana | Trachea pinguis hu- |
| 144. | mor. 230. |
| usus. ibid. | cur cartilaginea, |
| THORAX. II. | & cur ex parte |
| Thorax quid. 187. | ligamentosa. 231. |
| cur non totus car- | Trachea usus. 232. |
| neus. 188. | Trachanteres. 494. |
| cur ex parte car- | TVNICA quid & |
| | M m s ⁱ ab ⁱ |

INDEX.

- ubi proprie. 30. Valvula cordis. 217.
 Tussicula cur oriatur 218, 219, 220, 221.
 in aurium purga- 222.
 tione profunda. Valvula in ductu ab
 405. aure ad palatum.
 Tympanum. 292. 294.
 eius membrana. Valvula coli. 89.
 447. quomodo invenia-
 tur. ibid.
 V. eius figura, nume-
 rus, usus. ibid.
VALVULARVM
 in venis histo- Valvula vesiculae felle.
 ria. 353. 94.
 quid, & quomodo Valvula circa insertio-
 inveniantur. 353. nem ureterum. 117.
 & 354. Valvula in emulgen-
 ear in exortibus ve- tibus. III.
 narum non reperi- Valvula vene corona-
 antur. ibid. ria cordis. 210.
 ubi potissimum si- 366.
 ta. 355. Varicosum corpus. 123.
 in quibus plures 130.
 sint. 356. Varicum causa. 354.
 usus. 357. Vas breve. 59, 99.
 Valvula vene sine pa- Vasa ante viscera ge-
 ri sunt fictitia. 368. nerari. 4.
 Valvula mesaraica. Vasa cordis. 217.
 rum sunt figmen- eorum unio in sem.
 ta Columbi. 361. 221.

VASA

INDEX.

VASA DEFERENTIA IN VIRIS	192. usus.	ibid.
seu circulatoria.		
129.	VASA SPERMATICA	
eorum principium	CA. MULLEBRIA	
seu parastata. 130.	preparantia. 141.	
cavitas. 131.	quomodo à virilibus differant. 142.	
connexia. ib.	eorum anastomoses	
figura. ib.	142.	
situs. ibid.	VASA UMBILICA	
substantia. ibid.	LIA eorumq; histo-	
usus. ibid.	ria. 182.	
eorum medium.	eorum anastomoses	
131. finis vel vesiculae seminae. ib.	184.	
VASA DEFERENTIA IN MULIERIBVS.	VENARVM historia.	
144.	345.	
eorum membranae	Vena quid. ibid.	
& ductus. 145. 146.	Venarum materia.	
Vasa & usus. ibid.	347. usus. 349.	
& 147.	Vena alba quid. 118.	
VASA SPERMATICA VIRILIA	Vena cava. 217.	
preparantia. 122.	Vena quae magna.	
eorum anastomoses.	350.	
129.	Venarum anastomoses.	
magnitudo. 122.	350.	
numerus. ib. ortus.	Venarum principium.	
ibid. situs. ib. v. sa.	Epar. 86. 91.	
	Venarum principium	
	non esse cor contra	
	Aristotelem probatur.	
	347.	
	Vena-	

INDEX.

<i>Venarum substantia.</i>		<i>eius radices per e-</i>	
	353.	<i>par.</i>	90.
<i>tunica.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vena lactea.</i>	1.
<i>valvula.</i>	354.	<i>eius divisio & ra-</i>	
<i>Vena an fibras habe-</i>		<i>mi.</i>	359.
<i>ant.</i>	353.	<i>Vena non est pars fio-</i>	
<i>Vene non sentiunt.</i>		<i>milaris.</i>	9.
	351.	<i>Vene emulgentes.</i>	
<i>Vene alicubi vestiun-</i>			III.
<i>tur tunica, alicubi</i>		<i>in ijs valvula.</i>	<i>ib.</i>
<i>non.</i>	353.	<i>Vene mammarie.</i>	
<i>Vena arteriosa.</i>	218.		45.
<i>cur dicatur & ve-</i>		<i>Vene adipose.</i>	III.
<i>na & arteria.</i>	<i>ib.</i>	<i>Vena ranine.</i>	312.
<i>eius ortus & pro-</i>		<i>Vena umbilicalis in</i>	
<i>gressus.</i>	219.	<i>hydropicis resera-</i>	
<i>usus.</i>	<i>ibid.</i>	<i>tur.</i>	186.
<i>Vene cava radices per</i>		<i>Vena umbilicalis pri-</i>	
<i>Epar.</i>	90.	<i>mo in generatione</i>	
<i>Vena coronalis cordis.</i>		<i>perficitur.</i>	4. 183.
	366.	<i>quotuplex.</i>	183.
<i>cur pinguedine</i>		<i>eius usus & nodi.</i>	
<i>munita.</i>	29.		184.
<i>eius valvula.</i>	210.	<i>Venarum uteri ma-</i>	
	& 366.	<i>gnitudo in gravi-</i>	
<i>Venarum totius corpo-</i>		<i>dis.</i>	155.
<i>ris divisio.</i>	308.	<i>Vene lienis.</i>	360.
<i>Vena portae quid.</i>		<i>ventriculi.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>ibid.</i>	<i>omenti.</i>	<i>ibid.</i>
		<i>pancreatis.</i>	

INDEX.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| pancreatis. <i>ibid.</i> | Vene intercostales. |
| intestinorum. 361. | 367. |
| mesenterij. <i>ibid.</i> | earum anastomo- |
| mesaraica. <i>ibid.</i> | ses. <i>ibid.</i> & 370. |
| earum usus. 361. | Vena sine pari caret |
| valvulis carent. | valvulis. 368. |
| <i>ibid.</i> | Vena subclavia <i>ibid.</i> |
| na hemorrhoida- | eius divisio vera. |
| les. 362. | <i>ibid.</i> |
| internae. <i>ibid.</i> | Vena mammariae & |
| ab externis quo- | earum anastomo- |
| modo differant. | ses. 369. |
| 363. | Vene iugulares. 371. |
| Differentiae octo | brachiorum & |
| secundum auto- | manuum. 372. |
| rem. <i>ibid.</i> | cephalica seu hu- |
| | meraria. <i>ibid.</i> |
| Vena cava quid. 365. | salvatella & eius |
| eius divisio in | sectio. 373. |
| truncos magnos. | mediana. 374. |
| <i>ibid.</i> | Venarum manus va- |
| truncus ascendens. | riatio. 375. |
| 365. | Vena adiposa. 376. |
| descendens. 375. | emulgentes. <i>ibid.</i> |
| Vene diaphragmatis. | lumbares. <i>ibid.</i> |
| 365. | spermatice. <i>ibid.</i> |
| pericardij. <i>ibid.</i> | Vene rami iliaci. |
| mediastini. <i>ibid.</i> | 376. |
| Vena sine pari. 366. | Epigastrica. 377. |
| | hypoga- |

INDEX.

- hypogastrica. *ibid.*
 Venae crurales. 377.
 Saphena. *ibid.*
 eius sectio. *ibid.*
 Vena poplitica quae 379.
 Venoris aestum. 174.
 monticuli. 178.
 In Venesectione pra-
 ctitorum error. 368.
 369. 370.
 Ventres in corpore
 quid & quot. II.
 Venter supremus. *ibid.*
 medius. *ibid.*
 inferius. *ibid.*
 Ventris torsio. 95.
 Venter musculi. 36.
VENTRICULVS
 eiusq; historia. 54.
 eius definitio. *ibid.*
 situs. *ibid.*
 numerus. *ib.*
 Ventriculi pars fini-
 stra cur maior; &
 dextra cur minor.
 ibid.
 Ventriculi quot in
 pennatis & rumi-
 nantibus. 55.
 Eius orificia duri-
 ibid.
 sinistri orificij no-
 mina. *ibid.*
 cur dicatur cor-
 ibid.
 Eius symptomata
 cardiacis similia.
 ibid.
 orificij sinistri clau-
 sura, fibrae, situs.
 ibid. & 56.
 Ventriculi orificium
 sinistrum cur clau-
 datur. *ibid.*
 nervus implicatur.
 61. usus. 56.
 in eius affectu dor-
 so applicanda re-
 pica orificium dex-
 trum. 56.
 quando aperitur.
 ibid.
 eius fibrae circulus
 seu sphincter. *ibid.*
 Ventriculi fibrae &
 earum usus. 57.
 membranae. *ibid.*
 tunica interna cur
 oris

INDEX

- oris tunica conti-
 nua. *ibid.* ruga.
 57. crusta *ibid.*
 & 58. unde. *ibid.*
 Ventriculi calorem ad-
 iuvantes partes
 varia. 58.
 Ventriculi substantia.
 58.
 connexio. *ib.*
 figura. 58.
 magnitudo. 59.
 unde cognoscatur.
ibid. vasa. 59. 61.
 Juxta Ventriculum
 cavitas insignis no-
 tanda. 58.
 Ventriculi imbecillitas
 diuturna unde. 59.
 Ventriculus an nutria-
 tur sanguine an
 chilo. 60.
 Ventriculi vena an ex
 chilo aliquid su-
 gant. 60.
 Ventriculi & cerebri
 consensu. 61. 62.
 cum corde consen-
 sis. 55. cum color
 cum renibus.
 Ventriculi actio & u-
 sus. 62.
 Ventriculi cordis. 214.
 Ventriculus nobilis in
 cerebri medulla.
 267. 268.
 Ventriculus cerebri
 quartus. *ibid.*
 Ventriculi cerebellus.
ibid.
 Ventriculi cerebri
 quot. 274. & se-
 quent. unicum esse
 auctoris sententia.
 275. anteriores di-
 citur quid. *ib.* tertius
 quid. 276.
 Ventriculorum cerebri
 usus. 277.
 Vertex quid. 245.
 Verticilli. 155. 181.
 Vermiformes processus.
 271.
 Vertebrae spinæ 470.
 prima collicur spi-
 nâ careat. 473.
 Vesalii error. 45. 96.
 112. 113. 150. 196.
 272. 367.
 VESICÆ

INDEX.

VE'SICÆ BILAE,
R I Æ, historia.

93.

[eius] membrana.

ibid.

crusta. ibid.

fundus. ibid.

cervix. 94.

sinus. ibid.

valvula. ibid.

rami & vasa. ibid.

non nutritur bile.

94.

usus. ibid.

VE'SICULÆ SEMINARIÆ,
earumq; historia.

131.

earum situs. 132.

usus. ibid.

quod semen refer-

vent & contine-

ant, probatur. 132.

VE'SICULÆ URINARIÆ historia. 118.

usus. 121.

situs. 118.

connexio. 119.

figura. ibid.

magnitudo. ibid.

substantia. ibid.

vasa. 131.

partes duæ. 119.

fundi & cervicis

connexio. ibid.

membrana. 119.

120.

crusta. 120.

foramina. ibid.

cervix vel collum

quid. ibid.

musculus constri-

ctivus vel sphincter

quid. 121.

Vesicæ musculus urinæ

excretivus & cir-

cum volvens vesti-

cam. 119. 120.

Vesica inter duas pe-

ritonai tunicas la-

ter. 50.

Vesica impleta flatum

non emittit. 117.

Viris lac gigni potest.

193.

Virga. 134.

Virginita-

INDEX

ginitatis nota.	summa signa à Me-
164.	dico. 320.
& seq. de eadem	ligamenta. ibid.
opinionibus varia.	sensus. ibid.
earumq; refutatio-	Vngues partes commo-
nes. ib. an detur.	ditatis. 5.
165.	Vngues an bono nu-
virginale claustrum.	triantur alimen-
164.	to. 246.
virginibus omnibus	Vomitus biliosus. 95.
an primo coitu de-	Vomituriensibus un-
beat sanguis egre-	de labij tremor.
di. 170. cur primo	302.
coitu dolor & hæ-	Vox quomodo fiat.
morrhagia. 165.	240.
virginibus lac gigni	Vox quid. ibid.
potest. 193.	Vocis instrument.
viscerum caro. 8.	228. 232. 239. &
visus organum. 287.	240. 299. 406.
Umbilicus quid. 182.	466.
Umbilicalia vasa. ib.	Vocis latio. 230. 466.
Umbilici non adeo ma-	443.
gna est dignitas.	Vox gravis, acuta,
184.	magna, parva &c.
VNGUIVM historia.	unde. 233.
319.	Vocis magna causa.
caussa. ibid.	234.
usus. 320.	Vocis mutatio. 234.
color & inde de-	
	Nn

INDEX

- Ad Vocem non facit
uvula. 308.
Vocis plectrum. 308.
Vola manus. 317.
Volvulus. 77.78.
VRACHI historia.
125.
Brachus in homine
non est pervius. ib.
in homine non pro-
dit extra umbili-
cum. ibid.
VRETHRA quid.
136.
Eius cavernula. ib.
figura. ibid.
membrana, usus.
136. 137.
VRETERVM histo-
ria. 116.
connexio. 117.
numerus. 116.
fitus. ibid.
eorum principium
quale. 116.
Medium. 117.
finis vel insertio
qualis. ibid.
Valvula, circa in-
sertionem. 117.
Vreterum magnitudo
ibid.
in calculosis, stu-
penda ex observa-
tionibus auctori. ib.
Vreterum figura. 117.
membrana. ibid.
vasa. 118.
usus. ibid.
Vrinarum fistula. 136.
Urina quomodo fiat.
113.
cur flavescat. ibid.
quomodo feratur
in vesicam. 118.
cur egredi neque-
at in emulgentes.
117.
Urinae transudatio-
nem falso statuere
Asclepiades & Pa-
racelsus.
Urina foetus humani
ubi contineatur
ante partum, opi-
niones varie &
vera. 185.
Urina copia in quat-
tana.

INDEX.

tanarijs. 106.

rina cur nigra in
affectibus splenis.

106. 116.

sus partium corporis
unde desumatur.

3.

TERI historia.

148.

terus cur in hypoga-
strio situs. ibid.

teri magnitudo.
149. 150.

substantia. 150.

divisio. 158.

an attenuetur

gravidis. 150.

figura. 151.

connexio. ibid.

ligamenta. 151. &
152.

Procidentia ab-
scissio, &c. 152.

156.

Membrana & va-
sa. 153. 154. &

155.

actio & usus. 155.
156.

Motus. 156. 157.

fundus. 158. 159.

Collum breve. 158.

eius cavitas. 159.

cornua. 159.

os interius. 160.

Vteri oris usus.

161.

collum maius. 162.

ostium. ibid.

Vteri figura. 162.

magnitudo. 163.

substantia. 164.

placenta vel epar.

182.

eius usus. ibid.

Vteri colli ruga. 163.

Vtero humano cur tri-

buantur cornua

ut in brutis. 159.

160.

Vteri humani cavita-

tes nulla. 159.

Vterus an odores sen-

tiat & cur odora-

tu moveatur. 157.

Vteri vasorum ana-

stomoses. 154.

Tene

INDEX.

Vene dextrae cum	Vultus.	279.
sinistris iungantur.	Vulva.	148. 171.
ibid.	eius partes.	171.
Uteri cum pene simi-	Vulva labia cur que-	
lirudo inepta. 141.	dam mulieres mo-	
Uteri consensus cum	veant.	153.
cerebro 155.	Vulvae consuunt non-	
cum intestino re-	nulli.	170.
cto. 81.	Vvula in cerebro. 277.	
Uteri os an exacte	Vvula quid.	307.
claudatur post con-	eius casus.	308.
ceptum. 147. 161.	Vvula an ad vocem	
Vulnera sincipitis cur	faciat.	308.
lethalia. 444.		

FINIS.

EXERRATIONES OPERA- rum restituantur.

Pag. 33. lin. 1. lege; adhæret. p. 34.
7. recipere. 38. l. hujus p. 42. l. 30. obge-
runt, p. 46. 22. premantur. p. 48. 15.
diaphragma. & l. 25. umbilicum. p. 49.
l. 20. & 21. lineæ albæ. p. 62. 27. intima.
p. 64. 13. interior. p. 146. 22. sed in cer-
vicem abit, adeo ut cujusque vasis
&c. p. 239. 6. Uvulæ. 426.
l. ult. dele, inferior.

